

VEGETII

RENATI ARTIS VETERINARIÆ,
SIVE MVLOMEDICINÆ

libri quatuor, iam primum

in lucem editi. Opus sancti in rebus

medicis minime afferendum.



BASILEÆ

152



*Bibliotheca Salub. Caesariensis
Medicae Vindobensis d.d. J.B. Winkl.*



ILLVSTRISSIMO PRINCIPI FER.
dinando Regi Hūgaria, Bohemia &c.

Transuexerat olim, Ferdinande Regum serenissime, ad nos D. Heremannus Inclytus à Neuenare Comes, Vegetij Renati artem Veterinariam, ut eam doctissimorum uirorum auxilio, à mendis, quibus scatebat, expurgarem, & ipsis excussam ederemus in publicū. Sed cū exemplaris infinita deprauatione desperantes ab incepto negotio deterriti fuissetus, codicemq; illum peruetustum rursus ablegassetus, instigauit ad desperatū munus redeundū, q. tuæ Serenitatis nomini opus hoc dedicādū afferebat, nimirū ut cui nō ingloriosum esset, et egregios, et ualidos equos habere etiā p multos, quos hic author & à peste præseruari, & iam agrotantes sanari nō incommode perdocuit. Verū etsi non integre natiuo nitore me redditurū considerē, sperabam tamē me & Cels. tuæ rē gratā, & posteris ansam id studij diligentius pquirendi præbitorū. Habeant itaq; p Serenitatē tuā et ceteri, Vegetiū hūc, nostro labore à uitijis pmodū infinitis expurgatū. quāq; sint pleraq; quæ absq; αὐτοῦ πρᾶξι restituui posse nō credere, quæ, ubi uisum fuerat, uel obelo, uel asterisco, uel alia quadā notula cōsignauimus. Nonnulla, licet immutatis uel uerbis uel uerborum ordine, sententias tamen plenas, & intellectu faciles insinuare comperimus, quæ lectoris iudicio immutanda uel corrigenda reliquimus. mei enim candoris non esse censebam si mea alienis ingererē. Quædam etiam morborum, simul & herbarū, remediōrum uel uocabula licet immutanda cognosceremus, constās tamen exemplariorum consensus, ne quicquid immutarem prohibuit, nā ita fortassis scriptū ab authore nō uulgares neque inruditi persuadebant amici. quod eo facilius effecerant, & q. nō ignorem Antoni Codri de hoc authore iudiciū, & q. sciam apud plerosq; medicos permulta esse uel corruptissima. Quædam etiam cū uel uariarent exemplaria, uel abundare uiderentur, aut etiam uel parum, uel nihil ad sententiā facerent, parenthesi interdum cinximus. De his Serenitatem tuam admonendam duximus. Precantes nostrum hunc laborem (qui certe quantus fuerit, nemo facile crediderit) hilari fronte suscipere nō dedignetur. Vale felix.

S.

M.

T.

Obsequentiſſimus Ioannes Faber
Emmeus Iuliacenſis Typogra
phus. Basileæ.

SERENISSIMO

AC ILLVSTRISSIMO PRINCIPI D. FER-
dinando, Regi Hungariæ, Bohemiæq; Archiduci Aus-
triæ, Duci Burgundiæ, &c. Domino suo Cle-
mentissimo.



Nter tot, tamq; uarios & ancipites fortu-
næ casus, quos infracto huc usq; animo
superasti, Ferdinande Rex Sereniss illud
merito in te miramur omnes, quod in ea
ætate cōstitutus, ita animum institueris,
ut neq; in rebus prosperis audaciæ, neq;
in aduersis timiditatē unquam indulseris.

Nam tot iam partis abste triumphis, nihil immoderate, ni-
hil arroganter egisse uisus es. Sed ne in ipso quidem bellico
furore mentē tuā passus es à recta ratione dimoueri, quod
heu nimis multis contigit, alioqui laudatissimis uiris, ma-
gno suo, suorumq; malo. Alios non paucos bellum ipsum
exitialis rerū humanarū pestis, inhumanitatē, feritatem, et
crudelitatem docet. Tu contra in ipsis bellorū tumultibus
mansuetior, in militia reddi cultior uideris. Quā rem maio-
re etiam admiratione dignā facit Celsitudinis atq; dignita-
tis tuæ cōsideratio. Tu quippe citra omnē controuersia
post Cæsareū numē secūcū in rebus humanis obtines lo-
cū. Quē qdē ita & magnanimitate & gratia tueris, ut nes-
mo uideri possit eo obtinēdō dignior. Intellexerūt hoc Bo-
hemi & Hūgari, qbus nec uisus antea, nec plene cognitus
inter tot undiq; cōpetitores dignissimus es iudicatus, q
triusq; regni gubernacula suscipies. Mirātur multi Cn. Pō-
peius, q Mithridatē regem. 70. regnorū cū tota ferē Asia, na-
tura imbelli; Mariū, q Cymbriorū colluise; Cæsare, q Gal-
los agrestes tunc hoies bello superarint. Te adhuc puero Sue-
uorū gens, quorū uires ipsis aliqñ Romanis formidabiles
erāt, tuo. i. Austriæ Imperio accessit, idq; felicissimo quodā

auspicio, uidelicet ut ex tam auspicato exordio Regni tui, homines intelligerent, ipsos aliquando, ditionis tuæ termini nos longe lateq; propagandos esse. Venetos gentem totius Italiae florentissimam, ad conditiones acceptandas sola nominis tui auctoritate compulisti, receptis oppidis aliis quot, quæ Maximiliano Cæsari, iniuste ablata, iure debebantur. Accesserunt etiam finibus tuis pars lacus Benaci, nec non alpium, ac florisulij loca quædã per Venetos iam dudum uiolenter occupata. Heluetios multo iam tempore graues illis, quos eo in tractu tibi habes subditos, facile cõtines tua auctoritate, Satius iudicantes, quietem agere, quàm quicquam quod tu uiolari nolis, attingere. Vnagaricum bellum, quod prædonis illius Reguli inuidia exarserat restrinxisti, ut prius quàm copiae tuæ, ditionis illius fines attigisse crederentur, ille iam toto regno pulsus exularet. Sunt hæc quidẽ argumẽta summæ fortitudinis & prudentiæ, maioris etiam felicitatis tuæ. An nõ uidemus hoc agere deum? ut Cæsarea maiestas ac tua Celsitudo tãtum emineant potestate, quantum modestia & bonitate excelsitas. Amisit nuper Germania decus et ornamentũ suum Diuum Maximilianum Auum uestrũ, Cuius in re bellis ca non inferior Scipione, uirtus atq; industria habebatur: Amiserat ante Philippum patrem, adeo amabilem & charum omnibus mortalibus, ut pulcherrimum Titi & Vespasiani elogium illi iure competierit, Deliciæ generis humani; sed deus qui nunquam deest rebus humanis, quanto cum scœnore, quod periisse uidebatur, refarciuit, excitans nimirũ duo ornamenta, duo humani generis præsidia, quorum auspicio, boni ad excolendas uirtutes accendantur, mali uero benefacere discant. Sed hæc epistolaris non cõprehendit angustia: celebrabunt ea, quibus & plus otij & ingenij erit. Aperuisti tu uel solus campum patentiſſimum, ubi & ingenium & eloquentiam exercean omnes

DEDICATORIA.

nes eruditi. Sane iniquum fuerit, nos ita suspicere antiquitatem, ut nostra, cum non sint inferiora, contemnamus. Ego, ne inter aulicos tuos, solus nihil agere uidear, chartas ceum munusculum tuæ offero Serenitati, Vegetij inquam Renati, eius qui de re militari libellum cōscripsit, artis Veterinariæ siue Mulomedicinæ opus, multis seculis absconditū. quandoquidē equos habere & multos & bonos regij decoris esse uidetur, quos non tam ad pompam, quam ad res gerēdas alere cordati homines solent. Quam in re Mulomedicorum opera minime contemni debet. Hoc itaq; opusculum Beato Rhenano, necnon Ioanni Emmeo, conterraneo meo, uiris cum eruditis, tum mihi amicissimis, primum commisimus, ut illorum opera castigatum exiret in uulgus. Nam erat propemodū infinitis locis corruptum. Verū cum Beatus ille uarijs obstrictus negotijs munerī obeūdo adesse nō posset, solus Emmeus, nō absq; summis laboribus, operi castigando manum applicuit. Huius igitur industriæ debetur, quod ab infinitis uindicatum mendis nūc podit in lucē. Tu uero Serenissime Rex Ferdinande, ut illos tui gratia potissimum susceptos labores recōpenles, bonas literas, quicq; illas sincere colunt, pro regia indole tua, quemadmodū hactenus fecisti, ornare & tueri non desinas. id enim tuis pulcherrimis factis, non parum splendoris adiiciet. Interim Deum Opt. Max. precor, ut imperium tuum, perpetua felicitate decoretur ad honorem dei, & utilitatem Reip. Christianæ. Meq; tibi obsequiosissime commendo Ferdinande Regum Illustrissime. Ex arce nostra Bedburtina, quarto Nonas Iulij Anno domini

M. D. XXVIII.

E. R. Maiestatis Tuæ
deditissimus, & obsequentissimus Here
mānus Comes à Nuenare, Præpositus
primariæ adis Colonienfis.

ELENCHVS TI=

TVLORVM CAPITVM LIBRI PRIMI.

Quibus signis ægritudo animalium cognoscatur. 1

Quot sint genera morborum. 2

Signa morbi humidi. Cap. 3

Signa morbi aridi. 4

Signa morbi subtercutanei. 5

Signa morbi articularis. 6

Signa morbi farciminosi. 7

Signa morbi subrenalís. 8

Signa morbi elephantiasis. 9

Cura morbi humidi. 10

Cura morbi aridi. 11

Cura morbi subtercutanei. 12

Cura morbi articularis. 13

Cura morbi farciminosi. 14

Cura morbi subrenalís. 15

Cura morbi elephantiasis. 16

Causæ & curæ generales morbi malei. 17

Potio anniuersaria Physica. Cap. 18 lib. primi.

Compositio suffimentorum contra morbum maleum. 19

Alia compositio suffimentorum uehementior, ad lustranda animalia, quæ & fascinum tollit. 20

Deratione flebotomi. 21

Quæ diligentia adhibeat in sanguinis detractiōe. 22

Castrata animalia non deplenda. 23

Admissum facientes non deplendos. 24

In quibus passioibus & ex quibus locis sanguis sit auferendus. 25

De his quibus sanguis in ungulam tollitur. Alias. Qui ungulam cogunt, uel ciecerint, quomodo sanguis tollatur. 26

De Epist

INDEX.

De epistomicis, uulsis, colicis, strophosis, & q morbo sub- renali tenentur, unde sanguis tollendus sit.	27.
De ratione foci atq; cauterij.	28.
De passione & curis februm.	29.
De lassitudine, quæ uidetur febribus similis.	30.
De febribus internis.	31.
Si in Autumno febrerit.	32.
Si æstate febrat.	33.
Si hyeme febrat.	34.
Si ab indigestione febrat uel pletura.	35.
Si ex uulnere oris aut faucium febrat.	36.
De coactionibus. i. de nimia lassitudine.	37.
Quæ genera ægritudinum ex coactione nascantur.	38.
De diuersis passionibus uentris	39.
De aqualiculo. i. stomacho.	40.
De colo & coli dolore.	41.
Cura longanoniæ & ilei.	42.
Causæ & curæ strophæ.	43.
De lumbricis, coxis, tineis & pediculis.	44.
De clysterijs ad curam lumbricorum & tinearum.	45.
De calculosis iumentis.	46.
De emphragma.	47.
De ileo.	48.
De dolore uentris.	49.
De dolore coli.	50.
De dolore uesicæ.	51.
Coxi & lumbrici qua cura tollantur ad manum.	52.
De syncopatis & confixis.	53.
De his qui sanguinem per nares emittunt.	54.
De infestatione sanguinis.	55.
Quæ adhibenda est diligētia ut animalia sana per- durent.	56.
Potio æstiuæ.	57.

Potio hy

I N D E X .

Potio hyemalis.	58
Potio in autumnno & uere præbenda.	59
Potio omni tempore necessaria.	60
De difficultate urinæ.	61
De Stropho.	62
De dorso curando.	63
De potione probatissima Diapente.	64

CAPITA LIBRI SECVNDI.

De ualitudinibus capitis.	1
De Appioſo.	2
De Frenetico.	3
De Cardiacis.	4
De Rabioſo.	5
Qua obſeruatione curentur cyclo animalia, at unũ exemplariorum habebat, cibo.	6
De cerebro commoto.	7
De capitis dolore.	8
De Diſtenſionibus.	9
De Appioſo.	10
De Rabioſo.	11
De Inſania capitis.	12
De Chirurgia.	13
De Auribus.	14
De pilis qui naſcuntur in oculis.	17
De Suffuſione oculorum.	19
De paracentheſi oculi.	17
De Lunatico oculo.	18
De Staphylomate oculi.	19
Ad album de oculo tollendum.	20
De ſuffuſione curanda per nares.	21
De diuerſis paſſionibus oculorum.	22

De strumis iumentorum.	23
De glandulis	24
De pullaribus	25
De fistula maxillæ, uel de conficiendo collyrio fistulari.	26
De expositione fistulæ.	27
De tumore faucium uel capitis.	28
Si ex plethora sanguinis fauces tument.	29
De intomatibus. i. tuberibus.	30
De lingua incisa.	31
De gingiuis & dentibus.	32
De osse fracto.	33
De cartilagine narium si sanguis fluat.	34
De palato si uena se non clauferit.	35
De genere & qualitate mûcorum qui per nares fluunt.	36
De cuserino. i. cû post cursum sanguis de naribus fluit.	37
De polypo	38
De siderato.	39
De obseruatione flebotomi.	40
De ceruicibus	41
De malandria. i. de uulneribus ceruicis.	42
De distillatione ceruicis.	43
De distillatione scapularum.	44
De armislæsis.	45
De genu commoto uel basi.	46
De fractura articuli, uel cruris, uel coxæ.	47
De flegmone, marmore, siue mallonibus.	48
De aquatilibus & ozœnis.	49
De pedibus reumaticis, siue uentosis.	50
De impetiginibus.	51
De uligine.	52
De podagra iumentorum.	53
De orthocolis siue stillosis.	54
De pedibus & ungulis.	55

- Si pulmunculum ad aperturam fecerit. 56
 Si exungulauerit iumentū, & si suffusione pedū patiat. 57
 De pedibus attritis siue mollibus. 58
 De dorso confirmando. 59
 De dorso curando iam læso. 60
 Si pulmunculus nascitur in dorso animalis. 61
 Si uulnus fecerit. 62
 Ut pilī renascantur. 63
 De denigrandis pilis albis. 64
 Ut pilī nigri albelcant. 65

CAPITA LIBRI TERTII.

- De obseruanda boum sanitate, Rubricæ cap. 1.
 De morbis boū, & primo de maleo. 2. cap. Rub.
 De cruditate. cap. 3. Rub.
 De febre. cap. 4. Rub.
 Si uermes animal fecerit. cap. 2. lib. 3.
 De cura lumborum. 3.
 Quibus signis dolor renū indicetur. 4.
 De internis musculis renū. 5.
 Si talus exeat animalī. 6.
 De dolore renū. 7.
 De tumore testium. 8.
 Si natura reuocari non possit. 9.
 Si iumentum sanguinem minxerit. 10.
 De dysenteria. 11.
 Si ociosum animal sanguinem mingat. 12.
 Si animal sanguinem euomat. 13.
 Si percussa uena claudī non possit. 14.
 De indignatione uesicæ. 15.
 De fluxu uentris. 16.
 De uerrucis. 17.

De uitijis coxarum.	18
De laccis gambarum.	19
De gamboſo,	20
De his quæ læduntur à rotis.	21
De ſyrmatico. i. quod coxam ſubito trahit.	22
De morbo alienato.	23
De roborofiſis.	24
De hydropiciſis.	25
De ſarcoſtiſis.	26
De tympanitiſis.	27
De lienofiſis.	28
De implectico.	29
De phragmatico.	30
De eo qui aquam timet.	31
De ſpaſmo.	32
De epilepſia.	33
De eo qui aquam reuomit.	34
De ſideratiſio.	35
De percuffo à ſole.	36
De cruditate.	37
De bulimo.	38
De anhelitu.	39
De æſtu,	40
De paralytico.	41
De intrinſecus rupto.	42
De infania.	43
Depletura ex hordeo.	44
De paſſione pulmonis.	45
De eieronica, uel orthotonico, uel ortholiſtophico.	46
De opiſthotonico, & empithotonico.	47
De lethargico.	48
De morbo regio.	49
De bili, i. coleribus.	50

De biliarida.	11
De colí passione.	12
De uomica.	13
De coriagine.	14
De stomachico.	15
De icterico.	16
De stropho.	17
De dolore iecoris.	18
De inflatione uentris.	19
De intestini uexatione.	60
De tussi.	61
De tussi quæ uenit si quid faucibus haferit.	62
De tussi ex perfrictione.	63
De tussi à colibus.	64
De tussi ab interioribus.	65
De uulsis.	66
De tussi quæ ex humorum acerbitate generatur.	67
Ad tussim siccam, uel ad suspirium, & arteriam exasperatam.	68
Ad uomicas & tussim.	69
De diuersis potionibus uulforum & tussientium.	70
De scabie.	71
Si animal fœno malo lædatur.	72
Si hordeo malo lædatur.	73
Ad fascinum.	74
Remedium contra omnes morbos.	75
Si animal lædatur dum accipit potum.	76
Si animal à uenenatis bestiolis mordeatur.	77
Si bustrepem comederit animal in fœno.	78
Si uipera percusserit animal.	79
Si araneum comederit.	80
Si sphalangius percusserit animal.	81
De mure araneo.	82

I N D E X.

Ad ictum scorpionis.	83
De canis rabidi morfu.	84
Si animal comederit sterminus gallinarum.	85

CAPITA LIBRI QVARTI.

De numero & positione ossium	1
De numero & qualitate membrorum.	2
De numero & qualitate neruorum.	3
De qualitate uenarum.	4
De indicijis & ætate equorum.	5
De signis quibus agnoscitur patria.	6
De temporibus uitæ.	7
Potio ad reficiendum iumenta, & diapente.	8
Ad tussim & uulsos.	9
Ad collos, uermes, uel tineas.	10
Aduersum omnia genera morborum.	11
Confectio suffimentorum salutaris.	12
Confectio pulueris quadrigarij.	13
Compositio caustici.	Ca. 14
Compositio malagmæ.	15
Compositio collyrij fistularis.	16
Compositio malagmæ crudæ.	17
Compositio syncrismæ.	18
Compositio traumatici.	19
Compositio malagmæ basilicæ.	20
Alia compositio malagmæ.	21
Compositio prima anacollimatis.	22
Compositio alia malagmæ crudæ.	23
Compositio malagmæ ad uligines.	24
Compositio malagmæ ad neruos.	25
Compositio traumatici.	26
Compositio collyriorum.	27

I N D E X.

Sequuntur medicamentorum genera quædam, ad finē
quartilibrī adiecta. Folio .70.

- Cephalicum emplastrum ad claudenda uulnera.
- Medicamentum consuetum.
- Chlora medicamentum ad uulnera lymphidanda.
- De tetrapharmaco, ad uulnera claudenda.
- Glicium, ad uulnera sordida & cancrofa.
- De osolocari, ad omnia ossicula.
- De styptico, ad uulnera humecta.
- Medicamentum ad omnia uulnera claudenda.
- Implectoricum, ad caua supplenda.
- Ad oculorum rupturas, & glaucomata.
- De syncrisma, aliud.
- De lipparijs.
- Traumatici compositiones uariæ, ad uaria.
- Cauistici compositiones aliæ ad diuersa.
- De malagmatis quibusdam.
- Emplastrum quoddam.
- De ceroto.
- Fomentum ad tumores, uel quamlibet duriciam.
- Potio hyemalis.
- Potio æstiuallis.

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE, SIVE
MULOMEDICINAE, PRAEFATIO.



*M*ulomedicinae apud Græcos Latinosq; authores non fuit cura postrema. Sicut enim aīalia post hoīem, ita ars Veterina post Medicinā secunda est. In equis enī ac mulis & adiumenta belli, & pacis ornamenta consistūt. Sed quoniā minus dignitatis uidebatur habere professio quæ pecudū promittebat medelā, ideo minus splendidis exercitata, minus eloquentibus collata doce

tur in libros, Licet proxima ætate et Pelagonio non defuerit, & Columellæ abūdauit dicendi facultas: uerū alter eorū cū rusticæ rei præcepta conscriberet, curas aīaliū leui admonitione perstrinxit: alter omīsis signis causisq; morborū, quasi ad doctissimos scriberet, tam magnæ rei fundamenta neglexit. Chiron uero & Absirtus diligentius cuncta rimati, eloquētiæ inopia, ac sermonis ipsius uilitate sordescūt. Præterea indigesta & confusa sunt oīa, ut partem aliquā curationis quærenti necesse sit errare p̄ titulos, cū eisdē passionibus alia remedia in capite, alia inueniantur in fine. Additur etiā q̄ studio luctucri quædam ita sunt compositæ potiones, ut pretium enorme contineant, & curæ taxatio, animalis æstimationem propē uideatur æquare: ut plerūq; aut parci homines, aut certe prudentes, aīalia sua canibus dedant, aut à dānosa curatione dissimulent. His & talibus rationibus inuitatus, cum ab initio ætatis alendorum equorum studio flagrarem, hanc operam nō inuitus arripui, ut conductis in unū Latinis duntaxat authoribus uniuersis, adhibitis etiam Mulomedicis, & Medicis non omīsis (nam Mulomedicinæ doctrina ab arte Medicinæ non adeo in multis discrepat, sed in multis plurimisq; cōsentit) inquantum mediocritas ingenij patitur, plene ac breuiter omnia epitome congererem, causasq; & signa morborum omnium declararem. Nam si laus prima medicorum est genus ægritudinis in homine reperire, qui passionem suam & manu potest, & uoce signare, quāto magis in Mulomedicina necessariū creditur genus ægritudinis nosse, cum mutum sit aīal, & non possit propriū indicare

P R A E F A T I O .

indicare languorem, & ab imperitis ad opus aliquod laboremque cogatur. Sic geminū subeat ex morbo & fātigatione discriminē. Aut certe neglectū, inueterata egritudine nequeat sero curari. Sicut Mantuanus poeta diuino ore testatur: Morborūq; & causas, et signa docebo. Absq; dubio aut oīs cura uacabit, si genus passionis ignoretur. Ex inani p̄suatione illud generatur incōmodū, ut honestissimus qsq; erubescendū ac uile credat iumentorū nosse medicinā. Primū, nullius rei scientia uilis est. Nā cum humanæ uitæ conuersatiōe aliud fugendū, aliud uero sequēdum, nō est p̄fecta peritia, nisi quæ utraq; cognouerit. Deinde, quis aestimet erubescendū talem peritiā quæ damna submo-ueat? Nā sicut incolumitas iumentorum habet lucrū, ita eorū interitus asferre uidetur incommodū. Præsertim cū mancipia, quorum plebeia curatio nō putatur, sepe uilioribus pretijs, quā equi uendantur aut muli. Postremo siue ad uehendōs locupletes aptos, siue in circi cōtentione uictores, siue in prælijs (ut ita dixerim) probatissimos bellatores, acerrimū studiū amoremq; constat alīs (aut salutē) habere dominorū. Nec immerito uoluptati natū animal (salutis) gratiam meretur ab hoīe. Quis aut nosse curas iumentorum erubescendum putet, cum optima iumenta habere gloriosum sit? Quis uitupationi det id posse curare, quod laudi ducitur possidere? Forsan ipsa opera Mulomedicorū uidetur abiectior, notitia aut curationis nō solum honestissimis, sed etiā disertissimis conuenit: ut prouisione & ordinatione sollerti curatis animalibus, & damnis careant, & uoluptatibus perfruantur. Sed alij morbi sunt, qui ea tantū aīaliā, quæ occupauerunt, uexant; Alij etiam ab uno uel paucioribus quæ percūt, in plura, quæ pariter stabulātur uel aluntur, in totos sepius græges seuisima contagione transmigrant, ut quamuis sanū aīal intra breue tempus, alienæ egritudinis afflante uicinia, repente de pereat. Rectius est ergo eorum prius morborū & signa & causas prædicere, curasq; mōstrare, qui quodā trāsitu pluribus nocēt. Nam aduersus maiora dispēdia, maiorem sollicitudinē oportet impendi. Prima igitur iumentorum utilitas est domini, uel procuratoris, uel pastoris ipsius amor atq; diligentia. Comes enim semp est affectionis, industria; & incolumia cupimus quæcunq; diligimus. Domita aīaliā aut præsepibus aluntur, aut pascu. Indomita latioribus nutriuntur in salabus. Quot die ergo, uel frequentissime speculari conuenit habitum iumentorum. Nam diligentibus morbus ipse se prodit.

FINIS.

VEGETII RE=

NATI ARTIS VETERINARIAE,

SIVE MVLOMEDICINAE LI

BER. PRIMVS.

QVIBVS SIGNIS AEGRITVDO
animalium cognoscatur. Caput. I.



CONTINVO ANIMAL QVOD
ualetudo tentauerit, tristius inuenitur, aut pi-
grius, nec consueto utitur somno, nec solito se mo-
re transuoluit, nec requiem ut assumat accūbit,
nec deputatum cibum assumit ex integro, & po-
tum aut intemperantius accipit, aut omnino fasti-
dit, stupētibz oculis, auribus flaccidis, erecto ui-
lu, turpi pilo, exhausta sunt illa, fit spina rigidior, anhelitus crebrior aut
grauior, incessus ipse, quo maxime notatur, segnis ac nutās. Cum huius-
modi signa in iumento unum uel plura conspexeris, statim illud separabis
à ceteris, ut contagionem non inferat proximis, et facilius in solo iam cau-
sa morbi possit agnosci. Si diligenter habitum, post unam, secundam, uel
tertiā diem ab illa mœstitia fuerit absolutū, nihilq; resederit in corpore
ipsius quod putatur ambiguum, scito ex leuioribus causis illam uenisse tri-
stitiam, & animal consuetudini pristinae esse reddendum. Nec exploran-
di omittatur intentio, nam frequentius inspicere debet & cautius, quod se-
mel cœpit esse suspectum.

Quot sint genera morborum. Caput .II.

MORBORUM quidem diuersæ sunt passionēs, sed uno generali uoca-
bulo continentur, quod ab antiquis Malleus nominatū est, ipsa
appellatione uim cladis periculumq; testantes. Sunt autem spe-
cies Mallei numero septem: Humidus, Aridus, Subtercutaneus, articula-
ris, ele

ris, Elephantiasis, Subrenalis, Farciniosus. Signa omnium dicamus.

Signa morbi humidī. Caput .III.

Humidus morbus est, cui de naribus pro mucis humor defluit male olens, & spissus, colore pallido. Huius grauatur caput, oculi lachrymantur, & stridet pectus, sit gracilis horrentibus pilis, tristis aspectu. quem profluvium atticum uetres uocauerunt. Quando-
cunque autem sanguinolentus humor uel croco similis per nares fluere coeperit, iam insanabilis est & uicinus morti.

Signa morbi aridi. Caput .IIII.

Aridus autem morbus his agnoscitur signis: Nullus ei per nares supra solitum humor emanat, suspirat tamen grauitate, & nares habet extensas, ilia curuabit intrinsecus, et contractionem spinæ duriciamq; patietur, testiculi eius ita substringuntur, ut apparere uix possint, cibi parcior, bibendi appetentior ultra morem. Propter quod pulmone siccato, internum patitur ardorem, tensis oculis in obliquum respicit, nec facile cubet. Hūc suspirium uocant & insanabilem, nisi ab initio festina curatione subueneris.

Signa morbi subtercutanei. Caput .V.

Subtercutaneus morbus autem his proditur signis: Vulnere in corpore eius scabiei similia nascuntur, ex quibus humor effluit liquidus & uiridis, qui pruriginem mouet, ut scalpere parietibus uel cornu animalia sepe fricare compellat, quo ulcera corticem ducent. Huic nec humor per nares emanat, nec anhelat, nec cibum recusat, nec respuit potum. Propter quod diu bibet. Et ideo si cura non desit, ex hoc plurima iumenta liberantur. Quidam uero scabiem subtercutaneum morbum dicere tentauerunt, quod similia supradictis signis uideatur ostendere, & contagionem transferre per proximos, & tardius sanari. Sed quia nec necem, nec gregi infert facile periculum, à pestiferi illius mallei societate discretus.

discretus est, & seorsum ab illa dicitur.

Signa morbi articularis. Caput .VI.

Articularis autem morbus, quem ἀρθρίδης Græci uocant, per hæc monstratur indicia; Interdum paucis, interdum plurimis diebus ab articulis claudicabit, ut aut ictu calcis animalis alterius percussus, aut negligentia impactus, aut saxo uel fuste uideatur elusus. Sed hæc solet esse distantia, ut illa quælibet læsio loco figatur, hæc autem passio, quia erratica est, subito ad pedem alterum migrat. Præterea ossibus astringitur cutis, & ad tractum tractanti dura resistit, Rigescit spina, corpusq; contrahitur, pilus erectus & horridus, ac deformis aspectus, macie corpus affectum. Et quamuis non recusset alimenta, nec curat si desint, indies tamen deterior fit & tristior, difficulterq; curatur.

Signa morbi farciminosi. Caput .VII.

Farciminosum uocabulum ex genere passionis euenit. Huiusmodi deprehenditur argumento: In lateribus & in coxis, & in uerendis quoque partibus, & præcipue in iuncturis membrorum, uel in toto corpore collectiones instantur: rursumq; his uelut sedatis, aliæ renascuntur: cibum potumq; ex more recipiunt, macrescunt tamen. quia digestio eis plena non prouenit, hilares aspectu, sanisq; similes creduntur ab indolis artis mulomedicinae, quia exterius agitur causa; quibus imperitia artificum sanguinem festinat auferre. Sed contraria ista curatio est. Nam affectis farcimino, quicquid superest uirium, tollit. In initio tamen ne morbus increseat, uel in fine cum iam uires redire coeperint, emissio sanguinis iuuat.

Signa morbi subrenalis. Caput .VIII.

Subrenalis morbus nõ minus noie, quàm ipsa passione monstratur.

A 2 Nam

ARTIS VETERINARIAE

Nam animal uelut renibus laesis, à posteriori parte deficiens, prodit mortiferae necessitatis indicium, tuſſiet grauius, horrebit aspectu, cutis duritia ex spinæ rigore proditur, partius potum, partius adpetit cibum. Huic quia tota uis morbi possidet lumbos, à femoribus incipit prima curatio.

Signa morbi Elephantiasis.

Caput. IX.

Elephantiasis autem dicitur ex similitudine elephantis, cuius naturaliter pellis dura & aspera, morbo nomen & in hominibus, & in animalibus dedit. Cuius signa hæc sunt: In toto corpore uredo nascitur, præcipue in dorso, squamas similes corticibus facit. In naribus, in pedibus etiam, & in capite, papularum feruor emergit, uel ozæne asperiores frequenter oriuntur. Priusquam hæc ostendantur indicia, uentre soluto erit, & marcescit, et aspere tuſſiet. Cuius os totum cum lingua asperum & simile creditur esse combusto. Quæ passio pullis à matre depulſis plærung; perniciem consuevit inferre. Hunc diligenter curare cupientes, non ante deforis aliquo medicamento fouere contendunt, nisi prius portionibus datis, pestis eleuetur interior. Nā extrinsecus cepta medicamenta morbum non eximunt, sed ad interiora compellunt, & hac ratione periculum generant. In animalibus eiusmodi morbo laborantibus generalia ista sunt uitia: tuſſis aspera & crebra suspiria, spina contracta & rigida, macies semper increſcens cum studium & alimenta non desinant, demissior ceruix, stupentes oculi, tardior incessus. Nunc signis omnibus generaliter singulariterq; digestis, singulorum morborū speciales, propriasq; curas oportet adiungere. Post hæc de generali minutione singulorum, et adustione docens, concludam librum primum.

DE MORBORVM CVRATIONIBVS.

Cura morbi humidī.

Caput .X.

Malleus morbus si humidus fuerit, ita ut per utranq; uarem uiriles defluant muci, inter exordia caput eius adhibita curatione purgandum est ita; Olei optimi uncias. 3. liquamini floris uncia .1. uini.

1. uini ueteris cyathos. 3. sereno tranquilloq; die pariter commisceas, & cum tepesceris infundes in naribus, caput religabis ad pedes, sensumq; iumentum impeditum compelles incedere, ut omnis humor emanet. († ad siphonem autem paulatim infundes non semel à cornu) Quod si sanguis postmodum coeperit fluere, nihil timendum, sed potius sciendum est, animal legitime fuisse purgatum. Post quod seuum caprinum resolutum oleo miscebis, sic infusus naribus exulcerationis illius mitigatur asperitas. Radicem quoq; laseris tonsam, & per fistulam uento naribus insitam, ut steruturum prouocet, adhibere commodum est. Caput etiam extrinsecus auricularq; oleo calente diligenter perūges, & lana cerebro indita, ab omni perfrictionis necessitate munibis. Nasturtij quoq; semen bibendum dabis ex aqua. Præterea potionem dabis, qui diapenton uocatur, et hac ratione conficitur: Murra, gentiana, aristologia longæ, baccis lauri, rasuras eboris bene tritas et cribratas æquis miscebis pōderibus, seruabisq;. Exinde prima die unum coclearium cumulatam cū sextario uini ueteris, secūda die unum & semis, tertia autem die duo coclearia tepescito mero aspersa, & diligenti agitatione permista dabis ad cornu. Postea ex ceruice de maxillari uena sanguinem detrahes, permixtūq; acerrimo aceto, omne equi corpus perunges, & contra pilum diligenter fricabis, ut ad similitudinem glutinis adhæreat. Iumentum quoq; in loco calido cōstitues. Si cibum fastidit, † estate dūtaxat farinæ hordeacæ sextarium unum quinq; sextarijs aquæ permixtum equo dabis in potu. Triticeam quoq; farinā simili mensura & ratione offeres ad bibendum. Si autem fastidit, nō ideo aliud dabis, quousq; hoc ex ista necessitate sanitatem percipiat. De palato quoq; postea sanguinem detrahes, ut omni ex parte, si qua morbus prægrauare coeperit, releuetur. Scito nisi diligenter occurras, hūc esse periculosissimū morbum. Nam cito in suspirium, hoc est, anhelitum transit, & spem omnem salutis excludit.

Potio diapente.

† al. statim.

Cura morbi aridi.

Caput .XI.

Aridus uero morbus, qui & suspiriosus præcipue dicitur: & hic negatur à quibusdam posse curari, propterea, quod phibiti, quæ homini

hominibus mortifera est, similis inuenitur. Quotidie enim macie crescent, exilior redditur, penitusque siccatur. In omni autem ratione medicine, facilius est quæ abundauerint diminuerere, quam quæ uidentur deesse supplere. Salus tamen iumentis etiam in hac passione præstatur, si inter principia possit occurri. Sanguinem siccis detrahare contrarium est, Sed uino & oleo sufficienter admixto & tepefacto, perungendum toto corpore animal est, Ita ut caput & maxilla, & extrinsecus fauces eidem largius infundantur, & contra pilum usque ad sudorem diutissime confricentur. Intrinsecus autem à prima die hac potione curandum est: Succum ptisanæ, adipem suillum remissum, & amilum ex melle passum, que decoctum per cornu in potione dabis, ut canalis gutturis eidem, maxillarumque compago laxetur, quam siccitas astrinxerat morbi. Quo facto, in loco calido stabit. Infusum hordeum herbarumque uiridem, si inuenta fuerit, debet accipere, ut omni ex parte periculosa ariditas temperetur. Consequenter talis eidem potio præparetur; Passi optimi sextarium unum, iridisillyricæ unciam unam, piperis nigri semiunciam, croci scrupulum, mirrhæ († trigonitis) semiunciam, pollinis thuris unciam unam, oua cruda quinque, pariter mixta prima die dabis ex integro, ita ut per triduum ipsam misceas semper & offeras, ut tam grauis morbi asperitas, potionis dulcedine mitigetur. Post hæc, melle, butyro, axungia, salibus, et († pauulcaophis) pro æqua omnium portione confectis, succo ptisanæ ac passo inuolutis, aditinctum animal replebis, & die prima quinque pillulas, sequenti septem, tertia die nouem daturus ex more. Expensis autem his, nec ungere cum uino & oleo tepefacto desit industria, nam amarissimus morbus cum sit, aliter non potest, nisi amaris potionibus solui. Contraria enim non nisi contrariis medicinis curantur. Potionem diapenten, sicut superius monstratum est, non solum per triduum cum uino, sed per dies plurimos dabis, ut tantum discrimen possit euinci. Quod si grauior tussis & strangulatio urgebit, accipe sabæ fractæ sextarium unum, seu caprini uncias tres, alij capita maiora tria, permixta decoques, & cum passo, uel succo ptisanæ hordeaceæ tepidum dabis ad cornu. Quod si tardius profecerit ista curatio, sicut sicca pondera duo diligentissime tondis in pila, foenugraci sextarium

tarium decoques, quousq; aqua ad medietatem ueniat, post colabis, et scœnugræcum in mortario cum sicu conteres, alij quoq; uncias tres contundes similiter in mortario, et tam rutæ quàm apij fasciculos ternos: quibus oibus pariter mixtis diligenter tritis, addis dracontij uncias duas. Aqua in qua scœnugræcum coctum fuerit, superfundis, potionemq; facias quæ per cornu possit effluere: quam etiam tussientibus uel uulsis aut ruptis animalibus per triduum dabis. Sequens remedium ad aridum morbum; Inter nares iumenta scalpello secabis, et aquam frigidam per fistulam latam eius ori suppones, naresq; ipsius assidue diebus plurimis merges, ut suspirium distabescat in aqua. Potionem quoq; ei quotidie dabis huiusmodi: Succum ptisanæ cum seuo caprino decoctum, sextarium unum, sulphur, uinum, thus quoq; masculum æquis ponderibus deteris atq; commisces; ex eo coclearea singula diebus singulis cum ptisana permixta defundis ad cornu. Cum autem coeperit esse ualidior, de ceruice sanguinem detrahes, additoq; aceto animal perfricabis.

Cura morbi subtercutanei. Caput .XII.

Subtercutaneus morbus, cum humor pestifer intra corium et uiscera com meat, hac ratione curandus est; Fistulam ei facies uel cauterrum, inter armos eius et uentrem loco consueto ad mensuram incisa cute, die sereno, et si spacium est, luna minuyente, indis ut mos est, per quã ois e uisceribus humor educitur, coloris aurei uel crocei, languoris tæbe corruptus. Quæ si minus traxerit, radicem herbæ tytimali eodem uulnere inferes septem diebus, quæ residuũ uirus educat. Est et aliud remediũ. Radiculã quã qdam cõsiliqnẽ uocant, quã pulmonaceã, quã mulo medici frequẽter et bubulci utuntur, in pectore aialis hac ægritudine laborãtis eatenus pones, ut acuto cuprino circines locum. Postea corio pforato radiculam interferis, quæ ibidem spõte tam diu permanebit, quousq; cutis quatenus cuprino signata, in putredinem sit uersa, et à toto corpore ad illum locum humor trahatur, et per uulnus emittatur. Hinc potionem diapenten superius designatam, cum uino ueteri optimo, per triduum, uel si necessitas erit, per dies plurimos dabis. Apium quoq; uiride, et baccas.

ARTIS VETERINARIAE.

Et baccas lauri. uel istae res si non inuenirentur, lauri et cucumeris syluatici folia, per partes minutissimas concides, hordeoq; miscebis, ut animal sicut e potione diapenton, ita ex cibo sentiat medicinam. Huic tamen aqua tepidam cum farina hordeacea uel triticea dare te conuenit, et in loco tepido stabulare. Nam frigus humoris augmentum est, et reumatis. Cibus quoq; magis siccum quam uiridem in hac passione debet accipere, et exacerari uehementer, ut sudore siccetur humor infestus.

Cura morbi articularis. Caput XIII.

Articularis morbus his declaratur signis: Claudicabit alternis pedibus, modo prioribus, modo posterioribus, et quasi tumor eidem in articulis circa coronas, uel certe in genibus apparebit. propterea quod pestilentia morbi corruptus sanguis, neruos et uenas implet, et laedit atq; debilitat. Huic sanguinem primo de ceruice, hoc est, de matricali uena detrahes: quem aceto acerrimo permixtum, per totum animalis corpus induces, ita, ut illa loca, quae uexata sunt, diligentius ungas. quia creditur sanguis emissus e corpore, et corpori rursus cum aceto impositus, uitia morbose siccare. Quod si uel in genibus, uel articulis se morbus ostenderit, de eisdem locis sanguinem detrahes, cui adijcies cretam cimoliam, id est, albam, urticae libram, tres sextarios aceti, cimini tritici libram, resinae fraxinae libram, picis liquidae libram, salis communis pugillum, steracus bubulinum recens quantum creditur posse sufficere: ex hoc ubicumq; tumor apparuerit diligenter saepius illinies. De palato specialiter sanguinem detrahes, ne contagio caput occupet. Ab armis quoq; deplendum est, si in prioribus pedibus claudicatio apparuerit. Vel certe de coxis auferendus est sanguis si a posterioribus coeperit claudicare. Dabis quoq; ei potionem aduersus omnes morbos probatissimam: Centauream, absinthium, Potio probatissima
contra oēs morbos. peucedanum, serpillum, sagapinum, betonicam, saxifragam, aristologiam rotundam. haec omnia aequis ponderibus tondes diligenter et cernes: si febrit animal, cum aqua: si uero non febrit, cum uino optimo dabis, ut singulis diebus per sextarium uini uel aquae tepidae cocti praedicti medicamentis singula maiora coclearia plena et cumulata commisceas, et per fauces dige

ces digeratur, ut amaritudinem morbi herbarum amaritudo compugnans possit expellere.

Cura morbi farciminosi. Caput .XIIII.

Farcimosus autem morbus à similitudine farciminis appellatus est: quia uelut per fistulas quasdam inter cutem & carnem corruptus humor emanat, & per totum corpus collectiones plurimas facit, et alijs uelut minuentibus alijs rursus nascitur. Sed passio licet contagiosa sit, facilius tamen inter principia curabitur. quia interna eorum adhuc sana sunt, sed corruptus humor ex morbo, inter cutem & carnem uersatur. Huic tamen in initio tantummodo, antequam incipiat marcescere, aut in fine, cum iam bene fuerit reparatum, detrahendus est sanguis. Nam in media passione si flebotomia uti uolueris, egrotum animal nequaquam curabis. Sed collectiones quas cumque fecerit, iniuri rectis cauterijs conuenit: & ut efficacius prosint, cuprinis cauterijs est utendum. quæ uulnera pice liquida, admixto oleo & melle, curantur. Potiones catharticas, uel nimis amaras debet accipere, id est, diapenten cum uino, sicut superius dictum est, quæ ad omnia genera morborum animalium efficaciter prodesse consuevit. Præterea radices ebuli lib. i. infundis per triduum sextarijs tribus uini optimi. Post semiunciam optimi aloes, cetauræ unciam. i. opopanax unciam. i. diligentissime teres, & de illo uino, in quo ebuli radices infuse fuerint, sextarium. i. mittes, & tepidum per cornu dabis. Quam mensuram triduo custodire te conuenit, ut etiam per uentrem huiusmodi cathartica potione digeratur humor infestus. Quæ exercere in cursu, quousque ad plenum sudorem ueniat, sæpius conuenit: & curatum obseruatione prædicta, in pascua mittes, ut diu nocturnum; æstiuo tempore sub diuo & libero aëre pascatur, quatinus & uarietate herbarum oblectatus, & solis calore siccatus, rursumque noctis aura & rore contactus, facilius digerat morbum.

Cura morbi subrenal. Caput .XV.

Subrenal. morbus, ut periculis plenus est, ita ad intelligendum aptissimus inuenitur. Nam renes iumentis occupat atque dissoluit. Propter quod animal in primis partibus alacre, posteriora trahere consuevit. Huic hac ratione succurratur: De utroque latere, uel de femore incisis competenti loco uenis, copiosus sanguis emittatur, qui acri aceto permixtus, per omne cor-

pus, & præcipue super renes animalis inducitur. Potionē notissimā diapente ad cornu per os debet frequenter accipere. Sed & per anū calidissimis speciebus clysterij ingestioe curandū est. aloes uncia 1. pyretri uncia 1. euphorbij uncia semis, pulegij bene triti uncia 1. baccarū lauri uncia 1. castorij semis uncia, seminis sinapis uncias 3. salis triti hemina; hæc oīa diligenter cōtusa in tres diuides partes, & diebus singulis cum aqua, in qua fursures tritici decocti fuerint, tepida, sicut curæ exigat ratio, quasi singulos semisextarios clystere per intestinum aīalis infundis, ut calefactis intrinsecus renibus, resolutus humor possit per uentrē cū stercore emitti. Præterea lumbi ipsius oleo laurino uino calido permixto confricandi sunt uehementer & sæpe, ut de foris & intrinsecus acerbissima passio possit euinci. Cauteria quoq; renibus imponuntur, ut uis morbi ignis ardore siccetur. Danda quoq; est potio octo specierū decocta, cuius in articulari morbo fecimus mentionem, quia in omnibus efficaciter prodest.

Cura morbi Elephantiosis. Caput .XVI.

Elephantiosis morbi causa superius est indicata, cui talis est adhibenda medicina, ut non extrinsecus uredinem uel uulnuscūla ipsius curare tentemus. Nam morbus refugiet intus, & penetrabit uiscera, ac periculum gignet. Sed primū de matrice tollendus est sanguis, & acri aceto cōmiscendus; ac toto inducendus est corpori. Postea de palato, & si uires permiserint, de cæteris locis quæ morbus infestat, pro modo & tempore minuendus est sanguis, & cum aceto rursus imponendus. Pulli autem à matre depulsi, & ad stabula religati, præcipue solent hūc morbum incurrere, quia digestio cibi, qua in pascuis utebantur, primæ exercitationis aufertur, & nondū ad residendū robusti, ad præsepia stare coguntur. Elephantiosi morbo, & omnibus mallei passionibus non solū diapente, cuius experimētis indubitate sunt uires, & sine quo Mulomedicus muhilus est, sed hæc quoq; potio præparanda atq; seruanda: Mirre trigonitis librā 1. thuris masculi lib. 1. corij malipunicis lib. 1. piperis uncia 1. croci uncias 6. acacie ruse lib. 1. absinthij pontici lib. 1. serp. illi libram 1. betonicæ lib. 1. centaureæ libram 1. sagapini uncias 3. saxifragæ uncias 5. thesedoni uncias 6. hæc omnia tusa & bene cribrata cū melle optimo decoques, et in uase uitreo uel stagnæo recondita serua

bis. nam

his. nam per uetustatem magis ualet. Ex quo medicamēto singula cochlearia cumulata singulis animalibus morbidis cum sextario aquæ calidæ & tribus uncijis olei optimi permixta per triduum dabis. Vbi proficere cœperit, cum uino optimo & oleo dabis (sicut dictum iam est) cochlearia singula cōtinuis diebus. Ex qua potione nō minus q̄ diapēte quolibet morbo correpta aīalia liberātur. Pulli tamē beneficio ætatis euadūt facilius: sæpe incurati moriūtur.

Causæ & curæ generales morbi mallei. Ca. XVII.

EA quæ ad morbi mallei execrabilis curationem pertinebant, abundanter constat exposita, sed tanta uis ipsius morbi est, ut nihil expediat omitti. Nam gregum in pascuis funestus interitus, animalum quoq; in stabulis mortes innumere ex ipsius contagione proueniūt, & ab imperitiis uel negligentiis curam, aut diuinæ iracundiæ imputatur aut fato. Deniq; sicut supra declaratū est, ab uno animali incipit ipsa perniciēs, & festināter ad ceterorū transit exitiū. Propterea semper sunt separāda in qbus suspitio tantæ pestis cœperit apparere, usq; eo, ut etiā corpora mortuorū aīaliū quæ ab illo morbo interēpta fuerint, exportāda sint ad ea loca, p quæ aliorū aīaliū transitus non sit, & profunde obruēda sub terra. Nā & uiuorū, quæ corrupta fuerint, & mortuorū foetidissimo odore, sana primo iumenta corrumpūtur ac pereūt. Cuius morbi causas plurimi Mulomedicinæ auctores reddere tentauerunt; asserentes ex nimia lassitudine cursus uel saltus uiolenter extorti, aut ex calore æstatis, uel frigiditate hyemis, aut si uolētes emittere lotium, non sinantur, uel si hordeum sudantes acceperint, et si post cursum calidi biberint, et si plena uestica uel post potum cogantur ad cursum, aut foenum comederint, hordeumq; corruptum. Ex his uel huiusmodi causis malleus morbus consuevit generari. Vitanda qdem sunt ista omnia, nā ex his periculose ægitudines iumentis sæpe proueniūt. Malleus autē morbus ex acris corruptione præcipue descendit. Nā Austro & Africo uento flant bus, interpositis annorum spacijs, recursu (ut asserunt) catasti matris, sicut certo tpe hoēs pestilentia corrumpuntur, sic aīalia ille aer corrumpit & perimit. Vnde probatissime & plures necessarie sunt portiones, quæ aduersum tantā uim præstare ualeāt salutis auxiliū. Quarū p̄e supiori iā pagina cōprehendimus. p̄e ex oibus autoribus collectas cōsequēter adiūximus. Remediū p̄i

ARTIS VETERINARIAE

ad omnes generales morbos. Semen cucurbitae ægyptiacæ. i. coloquintidem
 quantum acetabulum capiet, frangas & conteris, addita uini optimi hemina
 una, quod diligenti agitatione permixtū linteolo colabis, & per dextrā iu
 menti nares infundes, ut peruenire possit ad uiscera. Quæ compositio ad dy
 senteriam plurimum prodest. Alia quoq; uilior, sed non minus apta cura
 tio est; Radices cucumeris syluatici uirides contundes, et in aqua nocte una
 macerabis, deinde sublatas cōtundes & colabis, ex quo succo tria cochlearia
 cum nitro trito permixta, cū uino, si animal sine febre fuerit, tepefacto quotti
 die faucibus ingeres, ita ut septem diebus continuus curare non desinas. Ni
 trum quoq; bene tritū, & cucumeris syluatici radices minutatim concisas,
 addita hemina uini tepidi, in hordeū bene purgatum animali languētī ad pa
 bulum infundas, ut non solum potum, uerū etiā pabulum medicamentū tem
 peratum faciat ad salutem. Item aliud. Radicem ebuli, & radicem urticæ
 æquis ponderibus minutim incisas, & infusas in liquamine optimo macera
 bis, colabisq; per linteū. ex quo mensura unius oui tepefactum per nares ani
 malis triduo digeres. Consequenter ita factururus, ut iumentū quod morbu pat
 titur, hordeū cū apio & cucumere syluatico minutatim inciso, semper acci
 piat, cōsummqs ipsum agrestem cucumerē, & aquæ sufficienter admixtum,
 bibere cogatur. Laudatur etiam hæc potio. Herbe sauinæ librā. i. trixa
 gnis uncias tres, centaureæ uncias 2. aristologiæ uncias 4. baccarū lauri un
 cias 4. murræ uncias 4. omnia contundes & cernes, & in puluerem minu
 tißimum rediges, & cū necesse fuerit cochleariū magnum plenū cum sexta
 rio. i. uini tepefacto faucibus tedeantis infundes. Hæc quoq; aduersus oēs
 morbos medicina succurrit, si quatinus uires patiuntur, interpositis diebus,
 cū præscriptis minutionis obseruantijs, primo de ceruice, post de palato, &
 in quibuscunq; locis se († humor) ostendit, ut si in facie de capite, si in primis
 partibus de armis, si in posterioribus de coxis sanguis est auferendus, & cū
 aceto miscendus, ex quo animal perfricetur. Cui hæc per tridū potio dabi
 tur: Pannaces radicum uncias tres, yringij radices pōderis tanti (yringion
 autem herba melior est, quæ in littore uicina marinis fluctibus nascitur, car
 do syluestri penē similis, flore galbino, cuius eruendæ sunt radices, nā lon
 gus penetrare dicūtur) feniculi quoq; seminis uncias 3. aloes uncia una semis
 contusa & cribrata in tres particulas diuidentur, & cū fracti & moliti tri
 tici far

ap. † morbus.

fici farina sextario candenti aqua miscetur, & ad cornu per fauces triduo animali infundantur. Pelagonus aduersus omnes morbos efficacissimū puluerem credit esse, si pullū ciconie nondum adhuc stantē, sed iam plumas habentem uiuum in cacabū mittas, & gipses, perustumq; uapore furni, in puluerem redigas, & tritum uitrio uase custodias, grāde, cumulatūq; cochlearium cū uini sextario animalis faucibus infundas, donec recipiat sanitatem. Chiron uero Centaurus præter alias cōpositiones quæ iam relatæ sunt, asserit catulum lactantem uiuū in aqua feruenti missum ac depilatū ita decoqui ut ossa separentur à carne: quibus diligenter ablatis, eius caro cum aqua in qua decocta fuerit liquamine optimo uino ueteri & oleo & pipere cū melle condita usq; ad sextariū debere seruari, ac singulis animalibus binas cotylas tepesctas, donec ad sanitatē perueniant, diebus singulis dari dēdere per fauces. Caput quoq; hedinū, omne s̄q; pedes depilatos ad caldarium eadē ratione, qua catulū, excoqui, ablatisq; ossibus condiri, & binis cotylis per diē in potione per cornu sæpius datis, animal morbidū liberari. De gallo quoq; gallinaceo albo, eadem quæ de catulo obseruanda demonstrat. Radicem quoq; herbe tithymali decoctam cum uino dulci dare morbidis animalibus suadet. Ei quoq; animali, quod profluuiō attico cœperit laborare, ita ut uiridis ei uel pallidus per nares humor erumpat, ex lotio humano aut aricino duas cotylas cum uino, & cyatho olei rosacii putat esse miscendas, & pnares, quæ humorem funestum egerunt, digerendas. Quam curationē & pulmoni sanitatem, & naribus siccitatem præstare confirmat.

Potio anniuersaria physica. Caput .XVIII.

Pro physico autem & anniuersario remedio tradidit ulpicum beticiū uel allium maius, quod quidam gallicum uocāt, capitella singula cū singulis semiuncijs sagapini, & singulis cyathis olei optimi diligenter trita, singulis aquæ heminis oportere misceri, et heminas singulas per caput animalium dari octauo Kalendas Iulias, hoc est in initio caniculariū dierū, septimo & sexto: quo factō, trinis potionibus stagnata, ut dicuntur animalia armentina uel domita integro anno à morbo intacta seruari.

A Compositio suffumētorū cōtra malleū. C. XIX.

Aduersus morbū malleū, cuius diuersæ sunt species, quæ in potiōibus

B 3 tam per

tam per os quàm nares dirigendis, uel clistere, quaq; in cauterijs uel flebotomia faciēda sunt declaratū est, sed restat alia nō minus necessaria efficaciorq; curatio, quæ suffimentorum genere & odore præstat. Nā cū ipsa tabes ex corrupti aëris foetore nascatur, et usq; in pulmonē & uiscera penetrādo descendat, nō minus austeritate odoris, q̃ potionū amaritudine cōsuevit expelli. Pro numero itaq; aialū eliges locū humilē ex omni parte clausum, in quo induces aialia iā egrotātia quæ curare desideras; uel adhuc sana & separatim quæ nō uis morbi contagione perfundi. Origanū asium, mentam, asphaltum, peucedanum, castoreum, & opopanax, æquis ponderibus permisceas, & exinde quantum tribus digitis eleuare poteris in carbonēs uiuos mittas, animaliumq; os & caput super fumum tenebis, ut austeritas odoris per os & nares intrinsecus ingressa, omnia compleat, & ad pulmonē usq; penetrādo perueniat, & præstet animalibus medicinam.

Alia compositio uehementior ad lustranda animalia,
quæ & fascinum tollit. Caput .xx.

Est & alia compositio suffimentorū ad morbos prohibendos, sumptuosior quidem, sed putatur utilior. Sulpharis uiui libras 2. bituminis iudaici lib. 1. opopanax uncias 6. achanti uncias sex, galbani & castorei, yreos crudi aī uncias 6. salis armoniaci uncias 2. salis capadoces uncias 2. cornu ceruinū, lapidis gagatis masculi, lapidis gagatis foeminae, aī uncias 2. lapidis ematitidis, lapidis sideritis, lapidis argeritis aī uncia 1. equuleos, id est caballiones marinos numero septē, caudas marinas, ungues marinos aī numero septem, uue marinae uncias tres, medullæ ceruinæ, cedrei, picis liquidæ aī pondera tria, ossa sepiæ numero vij. auri semiuncia, ballucæ siliquæ: hæc uniuersa cōmixta atq; succesa, odore suo morbis tā hoīm q̃ aialū resistūt, et dæmones fugāt, grādines prohibere, et aērē defecare dicūtur. Sed si memoratos lapides aut inuenire nequiueris, aut enormitate pretij ab empiriōe cessaueris, reliquæ efficaciter prosunt.

De ratione flebotomi. Ca. xxi.

Medicina oīs aialū, uel si uerū querimus, etiā hoīm, nisi rationē curationis ante cognouerit atq; prædixerit languētib; piculū, errabit frequenter. Exposita enim curandi ratio, & cum genere congruēs passionis

passionis, indubitater prestat auxiliū. Ideoq; pluribus mēbris ac morbis generale remediū diligenter oportet exponi, qđ pręcipue in sanguis detractiōe consistit, si rationabiliter pro tempore & uiribus animalū, et pro equitate pfecti mulomedici adhibeatur industria. Qui si ignarus fuerit huius ratiois, nō solū p detractiōē sanguinis nō curabit, uerū etiā piculū iumentis frequētiſſime generabit. Nā cum uita uirtusq; aiantū consistat in sanguine, rursus tēpestiue detractus sanguis corpori prestare adſolet sanitatē. Cuius rei talis redditur ratio. Sanguis enim ciborū humorūq; indigestiōe corruptus, p mēbra discurrit, et languorē dolorēq; aut uniuerso corpori, aut certis qbusdā partibus consueuit inferre. Nam per cōstrictionem neruorū, uenarūq; tensionem, inflatio, indigestiōq; generatur: quę tensura (ut ita dixerim) corporis aliter laxari, nisi p detractiōē sanguis nō potest. Vnicū enim cōpendiū atq; remediū est, corruptionē illā quę nocet, et quasi insista tabe egritudine uel periculū gignit, cum sanguinis ipsius uitiosa parte detrahere.

Quę diligentia adhibeatur in sanguinis detractiōe. Caput .XXII.

Hinc pleriq; ueris tēpore quotannis de ceruice iumētis sanguinē demere, & sic in herbā mittere necessariū putāt, ne ueteri corruptoq; sanguis nouus admixtus natura caleſcēs, debilitatem, ualitudinis uel periculū faciat. Veteres autē, prudētioreſq; authores absq; necessitate depleri animalia uetuerunt: ne consuetudo minūēdi, si tempore aliquo facta nō fuerit, statim intra corpus morbi ac ualitudinem generet. Rectius ergo est minoris etatis animalibus & bene ualētib; ex nulla parte corporis sanguinē detrahi absq; palato: de quo assidue tā minoribus, q̄ maturis detrahendus est humor, ut caput, oculi, cerebrūq; releuētur. Maturis uero aīalibus nō in cōmodū est pulsare uenā cū mīnūtur in pascua. Illa tamē in omnibus, q̄ deplendi sunt, conseruanda est consuetudo, ut pridie quā uena pulsetur, sustententur leuioribus & parcioribus cibis, ut per diastema composito corpore sint, non turbato per indigestionem. In solo autem equali statues iumentū, ceruicēq; illius loro cinges, quo strictius super scapulas tangatur, ut uena possit ab aliquo clarius intueri: Tunc spongia cum aqua uenam ipsam lauabis, & sepe deterges, ut altius emineat. Pollicem quoque sinistrę

manus interius deprimes, ut non ludat, sed tumidior atq; inflator uena red-
datur. Consequenter iuxta præceptum artis, uel animalis ipsius positione,
sagittam dari calibis exigis cotibus bene acutatam. Obseruabis quoq; ne al-
tius imprimas manum, & gulam atq; gurgulionem rumpas, & arteriã præ-
cidas. Hoc enim uitæ consuevit inferre periculum. Percussa uena, scœnũ uel
farraginem ad edendum apponas animali, quatinus agitatione maxillarum
per uenã melius erumpat sanguinis impetus. Cũ aut niger uel corruptus hu-
mor egeretur, uel cœperit manare purior, statim iumentum tolles à cibo, &
imposita fistula uenę plagam astringes. In plaga uero pitaciũ imponas, ut di-
ligentius claudat, licet quidam utantur & creta. Deinde in tenebroso loco
& calido statues iumentum, & farraginem si tempus est, uel scœnum molli-
mum dabis septem diebus ac noctibus. Aquam etiam offeres, ut si uoluerit bi-
bat. Sed trititia farrago hordeaceæ præfertur: quæ si defuerit, hordeaceam
dabis. Memento etiam quod ea melior sit, quæ uicinior marinis fluctibus fue-
rit. Propter quod uentrem facilius soluit, humoremq; deducit. Pulsata etiã
quocunq; loco uena, omnem sanguinem diligenter excipies, & aceto oleoq;
permixtum, uel alijs medicaminibus quæ ratio deposcit, animalis ipsius cor-
pus perunges, præcipueq; illum locũ, ex quo detractus est sanguis, & qui
esse putatur in causa. Constat enim, naturali quadam ratione atq; beneficio
(ut quidam aiunt) ipsum sanguinem, cum supersusus est languentibus mem-
bris præstare medicinã, uitiumq; siccare. Quam curatiõis sollertiã nõ opor-
tet omitti. Præterea interpositis diebus post flebotomiũ animalia producuntur
ad solem, & sanguis detrahitur eis de palato. Despumantur etiam tertio gra-
dũ à dentibus caninis, quos oportet suspendi altius propter sanguinis fluxũ.
ita ut ea die mollißimis cibarijs utantur & fursure. Sequentibus aut diebus
non ex integro hordeũ consequantur, sed à uilibus incipiant, & ad consuetu-
dinem per singulorum dierum augmenta perueniant. Consequenter tepido
die ducantur ad mare uel fluuiũ, diligenterq; loti tergantur. Vino quoq; &
oleo in sole perungendi sunt diligenter, & confricandi, ut corpora eorum ca-
lesfacta aut repellant, aut perferant perfricationis iniuriam. Quibus perfe-
ctis equi nobiles tunc demũ ad labores cursusq; itineris reuocentur.

Castrata animalia nõ deplenda. Ca. XXIII.

Sciendum est præterea, castrata animalia nunquam oportere depleri
cause

causa herbae, quae iam partem uirium cum testibus amiserint, et si depleta fuerint, uehementius eneruantur. Hinc est enim quod a finis non detrahendus est sanguis, quia naturaliter minus habent sanguinis, gracilioresque sortiti sunt uenas.

Admissum facientes non deplendos. Ca. XXIII.

Admissarios etiam equos flebotomare non est opus: parte enim uirium et sanguinis in coitu natura digerit. Si tamen ab admissura cessauerint, nisi annis omnibus herbarum tempore depleantur, incidunt in cecitate, quia id quod coitu digerere consueuerant, declinat in oculos.

In quibus passionibus, & ex quibus locis sanguis auferendus est. Caput .XXV.

Nunc ne quid relinquatur ambiguum, in quibus passionibus, et ex quibus locis sanguis emitte debeat indicabimus. Morbidis et quibuscumque totum corpus in causa est (sicut febrientibus, unde infra dicendum) de matrice detrahendus est sanguis. Cephalargicis autem, arpiosis, insanis, cardiacis, caducis, freneticis, bistrutitijs, sicardicijs, rabiosis quoque modo praecipitur de auriculis sanguinem demere. Verum tamen melius est de temporibus, quae in dextra ac sinistra sunt parte, detrahatur, id est, sub cauitate temporum tribus digitis ab oculo interpositis inferius uena perquiritur, et ex utraque emitte sanguis. Eis uero quibus suffusio contingit oculorum, uel cetera uitia quae oculis nocent, inferiores uenae sub oculis posita, quae descendunt sub angulis oculorum inferioribus, quatuor digitis inferius quam oculi sunt, inciduntur. Quibus quidem fastidium inhaeret, uel arteriarum uel faucium tumor, uel praegratio capitis, de palato auferendus est sanguis. Quibus autem pulmo est in causa uel icterus, uel cetera quae his uicina sunt membris, de pectore minuendus est, ex uenis quae posita sunt in dextra ac sinistra, ubi brachio la coniunguntur, et flexura fit cum armus plicatur. Quibus quidem a mus est in causa, de brachiolis sanguis minuatur; quae uenae posita sunt interius, ubi centuriae, id est, musculi brachiolares sunt, sex digitis superius quam genu, tribus uel duobus digitis inferius quam centuriae. Haec uenae sagitta percutiuntur, sed caute modesteque tangantur, propter debilitatem aialis. quia haec commixtae sunt nervis. Quibus autem articuli in causa erunt, uel si articulus inferius uel intortus fuerit, uel aut aquatilia habuerit, uel quiduis simile in articulis contigerit, de

C subcirro

subcirro sanguis subtrahi debet: quæ uenæ posite sunt inferius quàm articuli tribus digitis sub coronâ. quæ uenæ cum summa cautela tangendæ sunt, quæ articularum coniunctæ sunt nervis. Creciaco uel si basim mouerit, de coronis rectis tollitur sanguis.

De his quibus sanguis in ungulam tollitur, alii, qui ungulam cogunt uel eiecerint, quomodo sanguis tollatur. Caput .XXVI.

Quibus aut iumentis uel suffusionis uitio, uel p uoluntatē excruciata ungula fuerit, uel qbus remorata basis longi temporis claudignem fegerit, eiusmodi curatiōe sanatur. Componis omnem ungulā quasi ad uiuū, adlidesq; t uirantū, hic suffraginē illius alligatā lino uehemēter striges, totūq; simul ungulæ solū in circuitu scalpelletur, et circūgyrabis ut a corona ungula subleuetur ex pte, tūc circūcisorii inferes inter unguē & solū, et cū bene elimpidaueris, suffraginē soluis, et inuenies de calcaneo uenas fluere, et cū sufficiēter effluxerit cruor, sale pfricabis, postea aceto et o'eo inunges, et linteolis munies diligenter. Sparciā calciare curabis, ut post egestionē humorū ungula reparetur. Huiusmodi aut curā nūq̃ nisi singulis pedibus adhibere debebis, ut in tanto dolore aīal duret ac stet. Si aut in alio pede similis est causa, cū in illo q̃ prius curatus est, firmiter aīal stare cœpit, tūc eū elides, & ut dictū est, simili obseruatiōe curabis. Si uero in his causis aīal cremare uolueris, semissabis illud hoc modo. Compones ungulam eius ad uiuū, et cōtra uenā addita sagitta ptūdis, ut possit sanguis acōtizare p solū quod sagitta ptuderit. Sili aut modo sale fricabis, oleoq; et aceto, linteolisq; munibis, dūm maxat singulos pedes, ita ut portare se possit. hi plane q̃ semissatur nō elidūtur

Epistomicis, uulsis, colicis, strophosis, & qui morbo subrenali tenentur, unde sanguis tollendus est. Caput .XXVII.

Epistomicis, uel qui morbo subrenali leduntur, uulsis etiam, colicis, & quibus uenter frequenter dolet, de cauda sanguis emittitur, licet melius puteatur propter huiusmodi causas ortas de uisceribus debere sanguinē tolli. Quod si de cauda tollere uolueris, sic facies. Erige et resupinā caudā ad lumbos.

lumbos, quatuor digitis ab ano ubi pilos nō habet cæde caudam cū tabula aſſi qua nō ponderosa, quouſq; ſe uena demonſtret, & in caudæ media diuſuræ quatuor diguis ab ano ſagitta percuties uenam, ut acontizet ſanguis, poſt decurſionem ſaſciola colligabis. Cum autem de uiſceribus emittere uolueris, ſub inguib; de dextra ſiniſtraue in ſingulis femoribus eminentes uenas medias ſagitta pcuties, poſt decurſionem ſanguinis cretam impones, ſed caute, propter uicinā miſturā neruorū. Si laccæ in gambis fuerint, aut aliq; dolor coxae uel gambæ, ſanguis detrahatur gābis: ſunt enim uenæ à uiſceribus deſcendentes p gambas interius, quas medias propter uicinā mixturā neruorū caute tranſuerſo ſlebotomo percuties, & poſt decurſionē ſaſciola ligabis.

De ratione foci atq; cauterij. Caput .xxviii.

IN animalium curis ac medicinis duplex remedium authores eſſe uoluerunt, Minutionem ſanguinis, per quā conſtricta laxantur, & Vſtionem cauterij, per quod laxata firmantur. Sed cū ſlebotomi ratio euidenter uideatur expoſita, Cauterij quoq; licet nouiſſima cura ſit, apīda uidetur utilitas. Nā aduſtio laxatā cōſtringit, inflata attenuat, humectata deſiccatur, coagulata ſoluatur, ſarcinomata præcidit, ueteres dolores emēdat, alienatas corporis partes ex qualibet cauſa ad ſtatū ſuū reuocat, ſup naturā excrescētia, ſublata, et aduſta creſcere nō patitur. Nā cū candēte ferro rupis cutē, uitū oē concoquit atq; maturatur, et beneficio ignis diſſolutū, p foramiā q̄ facta ſunt eſſe fluit cum humore. atq; ita ſanatur paſſio et tollitur dolor. Poſt q̄ cicatricibus clauſis, cōſtrictior et robuſtior redditur locus, ac prope inſolubilis cutis. Sciendū uero cuprina cauteria plus effectus ad curandū habere q̄ ferrea. Præterea ſi in capite morbus eſt, inuritur ceruix: ſi ſubrenalıs eſt, lūbis ignis adhibetur. Interdū aut puncta inſigūtur, interdū ad ſimilitudinē lincæ candēs deducitur ferrum, aliquando uelut palmule fiunt. In hoc enim laudatur Melomedici ingenū, ſi ita animal cauterio curauerit ne deſormet. Pro locis aut in quibus eſt paſſio, & pro pellis eſtimatione cauteria uehemētius imprimūtur aut leuius. Memoria aut retinendū eſt, † quaſſaturas, emota uel extorta, aut eiecta de locis ſuis, uri penitus nō debere. nā ppetua debilitas cōſequitur. ſed melius eſt cū locis ſuis re poſita fuerint, & ligaturis diligētius cōmunita, atq; ita nature indiſtriæq; beneficio cōroborata, coſtaſticis unctiōibus et malagmis,

atq; † fracturæ

postremū causticis eadem percurare ad spem perpetuæ sanitatis. Quod specialiter admonendū est, ne Mulomedici festinantes, dū fūco curare cupiūt, animalia debilitent aut deforment, cū flebotomis, potionibus, unguentis, syrīngis, medicaminibusq; diuersis ante sit temptanda curatio, & si nihil profecerint, ad extremum ignis adhibetur.

De passione & curis febrium. Caput .XXXIX.

Quæcumq; passionēs plus iumentis periculi inferre consueuerunt, & difficilioribus obscurioribusq; indigent curis, has primo amplectimur libro, ut et facilius reperiātur quæ in exordijs ipsius occurrēt, et legentibus fastidiū nō possint adferre. De curis quæ prima sunt. Febriētibus itaq; alialibus primū cōuenit subuenire. Nā nō amplius q̄ triduo caloris uim sustinere posse creduntur. Intra quod si curata nō fuerint, moriuntur. Oportet igitur prius passionis huius signa causasq; prædicere, & mox medicinas exponere. Febriens iumentū deiectū caput ē terra alleuare uix poterit, erit oculis apertis, labijs demissis, tristitia turpis & grauitas totius corporis insequitur, testiculi tumidiore laxius pendent, membra caloribus feruent, uenæ uehementi pulsu saluunt, anhelitusq; creber & calidus, tussis assidua, incessus nutans, fastidiū cibi, bibendi cupiditas, uigiliæ iuges. Causa autē huius passionis ex magno labore et fætigatione est, si negligentia cōsequatur. Interdū aestu nimio, aut perstrictione uehemēti, uel ex cruditate ciborū, aut sudoris subita infriagatione, uel ex feruore hordei nouelli euenire cōsueuit. Curatio autē ista solennis est. Continuo sanguinem eis de facie, uel de temporibus, aut palato oportet emitti, ab omni esca prima die penitus abstineri, scœni optimi aut herbe uiridis subinde pusillū offerri oportebit, & quiescere etiā ab omnibus rebus, & etiā sequestratū temperato tpe, et inambulationibus leuibus aīal cōmoueri, calidis quoq; locis coopertū stabulari. Cū cœperit melius esse, herbam minutatim concisam porrigito, quæ si defuerit, hordeū maceratum, ablatisq; suis folliculis tūsum in modum ptisanæ paulatim offeratur et frequenter exiguū.

De lassitudine quæ uidetur febribus similis. C. XXX.

Plerumq; autē equi ultra uires ad cursum coacti, aut ponderibus prægrauati, ac sudore defecti, similia febricitantibus signa demonstrant.

Quos sic intelliges: Oculi sublachrymantes erunt, & tanq̃ subfusi sanguine, præterea spiritū crebrius agitāt, scenumq̃; fastidit, & de posterioribus pedibus melius se sustentabit. nā primos quasi subtritos tardius ponit.

De febribus internis. Caput .XXXI.

Quod si febris interna fuerit non facile aīal dormiet, et quotidie deteriorius fiet, interdū furunculos in dorso uel in lateribus habebit. Scias eum à morbo qui superius disputatus est malleus, detineri. Cui lotiū aliquot dierum tam hoīm quā arietum per nares infundes. Et sic potiones quæ de isto morbo suprascriptæ sunt, dabis.

Si in autumno febrierit. Caput .XXXII.

Si autem autumnī tempore coeperit febrē iumētum, statim de ceruice sanguinem detrahes, uel gradu tertio de palato; post herbæ trixagnis sextariū, draganti, rosarum atq̃ uncia 1. in pila lignea pistabis, cernesq̃; subtiliter, ex aqua cū mulsā et oleo potionabis, atq̃; ita restitues sanitatem.

Si in æstate febriat. Caput .XXXIII.

Si autem æstate febrē coeperit, totū sudabit, sataget salientibus uenis, mincturam & naturam simul dimittere, ad terrā transuerse ambulabit. De coxa media quatuor digitis ab ano uenam ingris, et ex ea sanguinem detrahes. Si aut nō inueneris, de ceruice tollendus est. Cui hanc potionem pro tempore dabis: Herbam portulatæ plenā manū tundis, succūq̃; eius cū dragante & thure, & succo rosæ campanæ mulsā addita offeres, potionem non satis grandem ne plus quā oportet infrigides: quia cum quasi plene careat simul & defectione sanguinis calore priuatur.

Si hyeme febriat. Caput .XXXIII.

Hyeme uero si febrierit, supradictas species aridas contūdito, diligenterq̃; misceto, & per sinistram na rem dato, sanitas consequitur. Febrientibus aut hæc potio utilis traditur: Mannæ thuris uncias ij semis, yrisillyricæ uncias 6. piperis uncia 1. baccarū lauri, seminis apij atq̃ unciam 1. cū passo potionabis. Item post detractionē sanguinis de matrice aut de palato sic potionabis febrientē: Hysopi librā unā, abrotani uncias 6. la

ARTIS VETERINARIAE

Lactis caprini sextarium, amili cyathum, olei optimi uncias 3. herbae urciolaris succi cyathum unū, misce cū cæteris, & per cornu faucibus infunde, erit salutare remediū. Item alia potio. Lactis sextariū, olei cyathos 2. croci scrupulū 1. mirræ 2. appij seminis cochleariū plenū, miscebis piter, et dabis ad cornu. Hyeme farinā triticeā cū aqua tepida, æstate aut farinā hordeaceā cū aqua frigida dabis in potū. Si febrient mensuram nō des, illorū aut loca cauterio inurenda sunt, & usta curāda. Item alia potio. Lactis caprini heminā, amili cyathū, oua 4. olei cyathū, succū herbae urciolaris quotidie potū dabis usq; ad sanitatē. Item unctio quā p̄fricandi sunt febrientes. Rosæ librā, olei ueteris librā 1. aceti heminas 3. lactis caprini librā semis, portulacæ seminis et nucis amaræ aff. uncias 6. menthæ uel rutæ quantū expedit. s. teres et commisces, et tēp̄facto utere, ita ut diutissime confrices contra pilū, et in loco tepido unctū aīal coopertūq; statues.

Item potio alia si hyeme febrierit.

Gentianæ unciam unam, aristologie, hyssopi, absynthij, abrotani, singulorum unciam unam, caricarum uncias 6. seminis apij uncias tres, rutæ fasciolum 1. omnia in cacabo cum aqua decoques ad tertiam, & cum nigrescere uideris, coctum est. Exinde uini heminam misceto sicut suprascriptum est, & per cornu faucibus infundito.

Si ab indigestione uel pletura febriat. Ca. XXXV.

S*I quod iumentū ab indigestione uel pletura febricitauerit, naribus spiritum ducet, & illa frequenter agitabit, anhelitusq; erit seruēs et aridus, spinam facilius flectet, nam qui ex perstrictione febrit, rigidus est; quia calor membra dissoluit, frigus astringit. Ex pletura igitur febrienti, copiosus sanguis emittitur de ceruice, nares aceto p̄fricātur ut sternuet sæpius. Venter quoque febrientis si durior fuerit, per anum iniecta manu, stercus extrahatur, à cibo abstineat, paucissimum potum per interualla suscipiat, & unctum suprascripto medicamine, diuq; fricatū, loco stabit calido horis tribus aut 4 cooptū, postea ad ambulandū producet, nihilominus inuolutū.*

Si ex uulnere oris aut faucium febriat. Ca. XXXVI.

S*I quando ex uulnere aliquo uel suppuratione oris aut faucium nascitur febris, de temporibus, nec non etiam de palato detrahendus est sanguis.*

De max

De maxillis quoq; siue de ceruice, & ad postremū quicumq; locus febrienti doluerit, ex eodē cum mensura sanguinem oportet auferri. Quod si cibū penitus respuerit, farinā aqua mixtā ad cibi instar faucibus eius infundes. Offas quoq; de passo facies iustę magnitudinis, et septenas cū oleo digeres, ut possit habere substantiā. Ita deniq; febrienti ualis est, ex quacūq; pte detractio sanguinis fiat, si consideratis uiribus animalis mēsurā seruetur. Nā ut emissus rationabiliter releuat, ita enormiter ablatuS cuirat uel turbat.

De coactiōe. i. de nimia lassitudine. Cap. XXXVII.

Coactio in animalibus passionis est nomen, ex qua ægritudinū diuersa genera nascūtur, ideo sic appellata, quod ab iniuria uel labore uel ex coactione contingat. Quoties enim lassū aīal fatigatione itineris, uel nimietate cursus, uel magnitudine ponderū, non studiosē refouetur, uel estate sitire, uel hyeme algere compellitur, uel certe penuriā sustinet cibi, aut hordeo nouo, aut feno pessimo leditur. et p dies aliquot circa curā eius nulla adhibetur industria, & sic totius corporis compago, & interiorum uiscerū dispositio per iniuriam & fatigationem uitatur.

Que genera ægritudinū ex coactiōe nascent. C. 38.

EX qua coactione hęc passionū genera nascuntur. Ex perstrictione enim sunt epistomici, podagrici, phthisici. Ex aestu autē euenit grauedo febris, insania, capitis dolor. Ex sudore oritur tumor in cruribus, suffusio in pedibus, febris, spasmus, et tussis. Ex humore quoq; q de naribus profluit, passio aptissima declaratur. A' cerebro enim uel a capite uenit multa pituita crebra et spissa. A' pstrictione erit humor tenuis, aquaticus, & frigidus: ex qua re fiūt coriagrosi & epatici & phthisici. A' colibus & glandulis & arterijs humor erit candidus & uiscosus, ex quo euenit fastidiū & faucium prefocatio & synanches. A' pulmone autē humor crassus, sanguinolentus, & maleodoratus emanat, colore pallido. Ex qua causa fiūt peripleumonici, uomicosi, ortomici, et phthisici. A' morbo autē malleo uenit humor multus et crassus, & pallidus. Ex qua re fit ortomicus, profluius atticus, et suspiriū articulare. A' iecore humor erit liuidus, yricus, et uiridis, et tabidus, non ualde crassus, neq; olidus. Ex qua re fiūt sciatici, hydropici, febricosi. Ideo autem signa passionum causas que diuisimus, ne ingratus

ARTIS VETERINARIAE

error noceret, & facilius euidentis doctrina curaret. Absyrus huiusmodi de coactionibus prodidit medicinas: Si equus, inquit, coactus de uia uenerit, oculi eius intro abibunt uel uersabuntur, spirat calidum frequenter atq; suspirat, & auriculæ huius ac reliquū corpus extensum erit. Cuius talis est curatio: ut parū hordei accipiat, foenūq; nō multū. Potio aut huiusmodi preparabitur, hyssopi, abrotani atq; uncia 1. sampsiuci uncias 6. foenugræci librā unā, lini seminis pondo duo: hæc omnia tusa & cribrata in cacabo nouo cum sex aquæ sextarijs infundis, addisq; nouem duplices ficus, quæ cū ad partē dimidiam decocta fuerint, uniuersa conteres atq; liquabis, præterea uini ueteris optimi sextarios tres, mellis heminā, piperis triti drachmā adicies supra scriptis, rursūq; seruere facies oīa, ex qua calidā potionē plurimis diebus dabis, quæ mirifice iuuare consueuit. Si de labore itineris suffusio pedū forte prouenerit, caue ne sanguinem calido detrahas, sed requietū pausatūq; flebotomabis, huiusmodi beneficio potionis usus: Turis masculi drachmas 2. foliorū caprifisci librā, grana piperis 25. fermētī uncias 3. croci drachmā: Omnia bene trita in tres partes diuides, & expausatū iumentū triduo cum oleo potionabis & uino: si hyems fuerit, tepida os ablues, estate frigida: si tardius, aut non recte ambulat, † sulphurē & resinā calentē ungulis imponis, non semel tantū, sed aliquoties donec rectus incedat. Si uero ista nō profuerint, semissabis eum ut de ungulis sagitta contactus cōpetenter profluat sanguis, & uulnera traumatico curabis pharmaco. De laxis hæc signa erūt: toto corpore grauabitur, & posteriora crura quasi inligata habebit. posca itaq; & pulegio nares eius & totam faciem fouebis, panem & merū dabis ut manducet, offeresq; ei lactucas uel gramen diligenter lotū atq; cōcūsum, consequenter daturus huiusmodi potionē, Succū pisanae, passum, oua, oleū rosatum, quæ omnia pariter mista per tridū dabis, ita ut hordeū primo decortica tum siccatumq; māducat. Præmonendū autem est, ne iumento ex coactionis iniuria laboranti pulses uenas calenti continuo enim neruorū contractio & debilitas cōsequitur. Oportet aut armos eorū & genua uino calido & oleo tepido suffundere, totūq; corpus mul'torū manibus diutissime cōfricare, & loco statuere tepido, mollia de siccato stercore uel de paleis strata præbere. Posteriorē ptē flebotomo laxi nō oportet cōtingi, ne penitus euirētur. Qd si uenæ in cruribus tumēt, et plenæ sunt humore, de coronis sanguis auferatur.

De diuersis passionibus uentris. Caput .XXXIX.

Non minus multæ & obscuræ uoletudines in internis animalium quæ hominū existere consueuerunt. Imò si uerū querimus, propè pares atq; consimiles sumus. Nam animalibus quia rationales sumus, sola mente præstamus; corporis uero natura cōmunis est, maxime in doloribus. Dolorem uentris in iumentis Veterinorū impitū putat facile posse curari, quod graue, nescit, Et ex uentositate, uel constipatione uitii, torsiones uocāt & interiorū incisiones. quibus aut præcantationes anicularū more, aut aliud quod quasi physicū remediū adferre conantur. Cū quid enim intrinsecus iumentis dolere inceperit, statim se allidūt & uolutāt, et solius uentris creditur esse causa, cū plures & difficiles sint passionēs, ex quibus dolor & uolutatio illa contingit. Et nisi singulis pro causarum genere competens medicina subuenerit, sanitas redire non poterit. Efficaciter autem curare potest nemo, nisi qui internarum ægritudinum signa rationesq; cognouerit.

De aqualiculo. i. stomacho. Caput .XL.

Primus uenter ipse, qui aqualiculus nominatur, totius corporis obtinet dominatum, in cuius capacitate cibus potioq; miscetur, ac per digestionem naturali calore decoctus, separatis humoribus, partē ad substantiā membrorū conuertit in sanguinem, & partem in urinas resoluit, partemq; secū trahit in stercorea. Quod si loca illa præstrictio longi temporis uiciauerit, intestinorum dolor, & corruptio digestionis necessario sequitur. Nā pars humoris coagulatur ex frigore, & fit conglutinosa in præcordijs, atq; in intestinorum partibus, quæ ducuntur ab aqualiculo usq; ad collum, quæ appellatur † enteron, retinetur & hæret, quod latine ieiunū dicitur, per quod in collū humor pessimus transit, & interclusione sua cibū nō patitur ad interiores partes more solito peruenire. Hinc etiam tortura & extensio uentris dolorq; cū magno periculo generatur: quæ passio græce emphragma, latine præoccupatio dicitur.

De colo & colī dolore. Caput .XLI.

Exoritur & alia causa doloris asperior, quæ græce chordapfos appellatur, cum præclusa intestina uiscerū uento sumōue se urgente colligāt,

D usque eo

ARTIS VETERINARIAE

usq; eo, ut aqua, & cibum, & stercus animalia etiam interdū reuomere cogātur. Præterea ad similitudinem hominū propter inflatiōis iniuriā, coli quoq; dolore uexantur, propter quam necessitatē animalia diuerse uehementerq; uoluēdo rumpuntur, quod curari iam non potest, & ideo moriuntur.

Cura longanonis & ilei. Caput .XLII.

ILei quoq; uitia ex perfrictione huiusmodi humoris nascuntur: qui cum intestina maiora & præcluserit, & in eorū sinibus stercora coeperit detinere, prohibet illa ad catachlytum longanonis decurrere (Longanon autē intestinum uocatur, per quod stercus egeritur) tunc uentis crassus uel præclusionē ipsa intra uiscera increscit, ac sibi met dolores morsusq; excitat uehementētes, ex quo iumenta se proijciunt ac uolunt, extensisq; pedibus calcitrant, sed per impatientiam se sæpe iam iactando uentus increscit, & mixtus stercore usq; ad intestina descendit, nec iam, ut supra, rumpitur, sed iumento qđ in uitium, qui Illeos uocatur (ex eo, qđ intestina locis suis exclusa, aīal quasi euilices facere faciunt) inciderit, ea uale tudo periculosa est, nisi cum celeritate subueneris. Huiusmodi autem sunt adhibenda remedia: Aqua calida renes animalis diutissime sōmentabis, scēnumq; cum calida, ut uapor magis penetret, frequenter apponis, post cilicijs diligenter absterges, oleum uetus & picem liquidam, & oleum laurinum mīscēs, calefacies, & diutissime perfricabis, ita & testiculos eius perunges, & in auriculas calidum medicamen infundes. Tam diu autem fricabitur, ut sudare incipiat & uentū emittere, ex quo spes ostenditur sanitatis. Quod loco calido statues, ac sagis cooperies diligēter, hanc daturus quotidiē pōtionem: Piperis grana quinquaginta, petroselinum quantū quatuor digiti comprehendunt, cimini alexandrini tantūdem, cimini quoq; africani tantūdem, semen apij, murrā, nepitā, trixagnē, æquis ponderibus, quibus ad dimidiam omnium partem nitrum admiscere te conuenit. Quæ omnia bene trita ex uino calido & oleo æquis ponderibus, et melle quantum satis fuerit dabis. Hæc autem potio & calefacit, & uentrem resoluit. Quod remediū si tardius subuenerit, saccellos cum surfure calentes per totum dorsum & renes animalis imponis. Clysteriabis etiā ex aqua calida & oleo, quod cum sale & melle afro, et nitro, ouoq; mīscēbis, & ita uentre laxato & stercora emittuntur & uentus. Quod si clyster defuerit, sal bene tritum

netritum & mel coques, pastillosq; longos & duros facies, & in anum iu-
menti interius immittes. Quæ res omnem spurciciem humoris intus stantem
abstrahit, & ad sanitatem perducit, nec est aliud qd magis ualeat subuenire.

Causæ & curæ strophæ. Caput .XLIII.

Sunt animalia quibus assidue uentris impendit dolor, qui strophus ap-
pellatur, & hac ratione concipitur. Interdum sudor animalium uel ni-
mio cursu, uel labore profluens, in internis residet intra uentris intesti-
norumq; compagnem, q punctiones doloresq; præstat interius. Et cū totū à
labore cessauerit, ac refrixerit corpus animalis, cessat & dolor. Sed cū à la-
bore calefieri cœperit, rursus exoritur, & ideo strophus uocatur. nā frequen-
ter uolutatur, et cū surrexerit, terrā pedibus tuidit, & interdū terrā quasi
manducare conatur, et iacēs uidetur quasi pusillū regescere, et surgēs citius
ābulare se cogit. Sed ex hac iniuria frequēter uolutādo uētū sibi nutrit intri-
secus, et fit tympanites, ex quo et iumentū rūpitur, et præsens uitæ piculū cō-
sequitur. Qd uitiū si in ppetuū auferre uolueris, paracenthesim facies sic: qua-
tuor digitis sub umbilico ueretrū uersus, medio climate uētris sagittā inijcies
ut non solū cutē, uerū etiā periconiū ipsum aperias. Periconiū enim dicitur
membrana quæ intestina omnia continet. Ad mensurā autem cū magna cau-
tela periconium aperies, ne intestina ledas, & præsens discrimen inferas.
Post exempta sagitta subijcies fistulā centimalem, quā Mulomedici portare
cōsueuerūt, minutis foraminibus multisq; pertusam, p quā foras humor ema-
nat, quē suscipies in uase, & inuenies limpidō lotio similē, tolles uero non mi-
nus sextario. Hæc cura etiā illa animalia sanabit, quæ uel stupida uel macra
sunt ex coactiōe longi tps, qbus nitrū diligenter cribratū in hordeū debes a-
spargere, qd omnes asperrimos humores et spurcias corporis purgat. Sed
strophosis dabis potionē superius declaratā plurimis diebus. Etiā acopo ter-
māico renes eorū, totūq; corpus punges, et diebus aliquot à pluribus facies
cōfricari. Ad ultimū renibus eorū causticū induces, et sic reuoces ad laborē.

De lūbricis, coxis, tinea, et pediculis. Cap. XLIII.

Intolerabile dolorē intestinis inferūt lūbrici, uermes, et tinea, quas alij pe-
diculos appellāt. Nā coagulā et aqualiculū itus erodūt et uulnera faciūt.
ex q necessitate animalia macrescūt, et coriaginosa fiūt, et sine febre nō erūt

ARTIS VETERINARIÆ

Et celeriter moriuntur. Huiusmodi passionis signum est, cū inuenitur humor in ano fabæ coctæ similis: est nāq; sanies ex illis uulneribus quæ bestiolæ intrinsecus fecerunt. Ieiuna animalia ex hac necessitate uehementius torquētur. Nā cū his deest cibus, magis uitalia consumūtur à uermibus. Hi nō sunt inflati, & tamen per dolorē se uolunt, et in spinā se projiciunt, & caput sibi intra pedes mittūt, & ostendunt doloris sui locū, dentibus illa sibi quasi scalpunt, & rodunt nonnūq; lumbos, & caudam parietibus confricant. Cū ista signa ostendere cœperint, & crebro clamare, hoc est, uehementer hinnire, scias eos iam mortī esse uicinos. quibus adhibetur ista curatio: Olei uiridis et amari sextarios 2. fasciculū absynthij pontici concoques. præterea nasturcij seminis, santonici, coriandri seminis, radicū seminis, sinopidis pontici uncias singulas, mirtis & scœnigræci selibrā: hæc infusa et decocta in oleo illo facies permanere, ex quo heminam olei, & aquæ tepidæ heminā dimidiam per cornu dabis. quæ uirtus medicamentorū, & lenitas olei animala ipsa intus occidit, & foras eijcit. Ex qua portione si per multos dies acceperit, p̄mixto nitro tunso & castoreo, oēs lūbricos & tineolas & uermes discludit à corpore, et cū stercore eijcit, & restituit sanitatem. Alia portio ad lūbricos, tineolas, & coſſos: Santonici, absynthij pontici pulueris, lupini crudi, seminis nasturcij, scobis cornu ceruini, seminis radicū uncias ternas, sinopidis pontici p̄stillos tres, pollinis erui uncias 3. uini austeri sextarios tres, olei hispani sextarium unū, opopanacis uncia 1. seminis coriandri heminā: hæc omnia diligēter trita decoques, & quotidie ieiunis heminas singulas dabis.

De clysterijs ad curam lūbricorū & tinearū. C. XLV.

Sed quia pestes ipsæ sæpius ad coagula se conferunt, & portio quæ per os data, ad loca ubi morantur rariùs peruenit, ideo etiam per anum adhibenda sunt clysteria: aceti acerrimi sextariū unū semis, olei uiridis tantundem, opopanacis uncia 1. centaureæ uncias 2. absynthij pontici uncias 3. santonici uncias 3. farine lupini crudi uncias 3. erui uncias 3. seminis rafani, seminis coriandri uncias ternas, nitri triti uncias 3. radicis capparis tunse uncias 3. hæc oīa decoques cū oleo & aceto, & per tridū singulos sextarios bene calentes per anū de clystere diffundis animali. Memēto aut quoties per os portionē das, animal contra cliuū teneri debere, ut facilius quod acceperit ad interiora

interiora descendat. Quoties autem clysteriabis, caput animalis in ualle statues, & clunes ad altiora conuerteres, ut quod per clysterem diffundis ad interiora perueniat. Diutissime autem post potionem in talibus locis animal retinetur, ut facilius necentur uel eiciantur pestes internæ. Ad cossos & lumbricos specialis potio. Herbe cameleontis radicem ex aqua ad tertiam decoques, et cum opopanacis duabus uncijis misces, ac uini heminam, & ad cornu per sinistram nares diffundis. Item alia ad lumbricos. Seminis coriandri quantum una manus coeperit friges, nasturcij quoque seminis tantum diligenter teres, quæ utraq; cum aqua tepida per triduum faucibus infundes. Ad matricis dolorem medicamen. Aloe, epaticum, mastice, castoreum, lauri baccas, amoniacum, nino & melle mittis in ollam, & bullita atteres, dabisque ad bibendum.

De iumentis calculosis. Caput .XLVI.

SI quod iumentum calculosum fuerit, hæc signa monstrabunt: torquetur, gemet, extendet se ad conatum mingendi, stillat ueretrum eius guttis materiam, modicum mingit & plene mingere non potest, quod quotidie patitur. Sed huiusmodi uitium teneris ætatibus plerumque contingit, quod sic inuenies: Manum ad interiorē partē mittes, et a ceruice uesticæ sub ipso ano ad hip pocentaurii uersus palpabis digitis, & calculum ibi inuenies. Quod uitium difficile curatur. Nam interdum nimio conamine prope ipsum anum uestica disrumpitur, & lotium per anum emittit, & quasi aquæ adsimilatur. Ideoque missis digitis per foramen quod fecerit, longanoni & ipsius uesticæ aculeo calculum eximis, & curabis clysterijs collecticijs, id est, quæ glutinent, ut foramina illa sanentur. Potionabis autem illos duritica potione. Difficilis autem huiusmodi cura est, quia uim patientes ex corruptione uesticæ tortione moriuntur.

De emphragma. Caput .XLVII.

QUodcumque iumentum ex qualibet causa inuenieris uolutare, oleo maximum perunges, & ipsum anum oleo satiabis: post quod manum in interiorē partem longanoni protendis, & si inuenieris ipsum longanoniem clibano subili patere, scias eum strophum pati, & continuo stercora eicies paulatim ad manum, quibus egestis cito noueris animal percurandum. Si uero manu iniecta longanoni præclusionem inuenieris, & stercoris modicum, hoc est, duas aut tres pillulas squibala, et præfocatum longanoniem qua manus uix

ARTIS VETERINARIAE

introeat, scias eum emphragma pati et periclitari, & ideo curadi sunt renes medicaminibus superscriptis, & clystere utendum, quod indignationem intestini resoluat & curet.

De ileo. Caput .XLVIII.

SI manum inieceris, & totum uentrē tympano similem pertractando senseris, scias eum ileum pati, & cito periclitari. Et ideo unctionibus calidis fricandus est uehementer & diu. Si uentum coeperit emitte, tūc in illo spes incipit esse uiuendi.

De dolore uentris. Caput .XLIX.

Item si manum miseris, & inueneris ualde pati longanone, & stercora nō multa habere, nec esse uehemēter inflatū, scias ipsum uentrē dolere, id est, aqualiculū. Cito relescere solet, si celeriter supradictas et calidas accipit potiones, diligenterq; ex calido unguento fuerit pfricatū. Si morā curationis non abstuleris, difficile euadet. nā ex hac passione chorda psus fieri cōsueuit.

De dolore colī. Caput .L.

SI manum miseris, et similiter longanone pati sine ulla inflatione repereris, & non frequenter uoluantem se, sed proijcientem subinde in dexterā partē, et quasi extēsiōnem interdū ad conamē minctiōis, inuenies duriciem in intestinis ingentem cucurbitae similem, scias animal coli dōlore uehari: & quanto durius intestinū inueneris, tanto pluribus diebus dolore cruciatur. Ex qua causa raro periclitantur, & dolent biduo, uel triduo, uel si nīmīū quinq; diebus. Sed quāto inueneris molliorē ipsum locū, tāto uelocius mitigabitur dolor. nā quēdā stercora in lōganone repies, et erit salubris curatio si post clysterē uel potionē multū stercoris adsellatus ediderit. quo facto statim intestinū, quod à colo induratū fuerat, & tumebat, nō apparebit redditā sanitate.

De dolore uesicae Ca. LI.

SI currendo fuerit inuersa, similis dolor sine inflatiōe ex cursus iniuria & nimietate frequēter emergit. Huic manū subijcies in anū, & depri-
mes usq; ad ueretrū uersus, ubi inuenies uesicā eius lotio plenā, quā à
dextra & sinistra pte leniter adducis sursum ad anū uersus cū oleo, et min-
ctionem

ffionem prouocas, tã diu donec urinã faciat: liberabitur piculo de quo animalia difficile euadũt.

Cossi & lũbrici qua cura tollant ad manũ. C. LII.

SVnt alij qui assidue dolorem uentris patiuntur sine ulla inflatione, nec uehementer se uolunt, & quasi in cursu prouocant, aliquãdo se proijciunt, et ilia sibi corrodũt, et quasi scalpũt. In huiusmodi dolore manũ imittis in longanone p circuitũ et interiore pte p plurima loca diligẽter tentabis, & inuenies uermes collectos exisse in singulis locis, et intestinũ pertundere. Ex qua necessitate nascitur dolor periculosus. Digitis euellere eos, q qui uix euelluntur, & ipsa tibi in manu coheret ut difficile eos proijcias. ex qua ratione multa iumenta caudam frequenter parietibus fricant, propter morsum uermium, quos purgare de longanone studiose debebis, & potionẽ dare per plurimos dies eam, quẽ ad lumbricos faciat, ita omnes uermes, quos cossos appellamus & tineolas purgabis. Similiter etiam qui lumbricos habent in uentre, sic eos conuenit mederi: Pice liquida & oleo calido renes & totam spinam cum dorso perfricari oportet tam diu, donec calefactionem patiantur ex manibus. & auriculas eorum et anum ex oleo complebis. uentrem quoq; & testiculos perunges, sal tritum cum melle decoctum mixtum in anũ subijcies, animal potionibus crebris ambulationibus potionatũ exercebis. Si ex hac ratione non mitigauerit, clysteriabis eũ calida, & afronitro et sale. Præterea super renes & dorsum saccellos calidos ex surfure plenos imponis, & tam diu innouabis calefactionẽ donec uentum reddat. Potionabis eũ potionibus supradictis & clysterijs ut à discrimine liberetur.

De syncopatis & confixis. Caput LIII.

SI quod iumentum syncopauerit his agnoscitur signis: Pigrius ambulabit, tanquam suffusione constrictum. Inter suffusos autem & syncopatos hæc distantia est, ut suffusi licet tardius à terra leuent pedes, flectentes crura incedere solent: Syncopati autem uniuerso corpore constricti & rigidi sunt, etiam cum se proijciunt, non sine gemitu & toto corpore decidunt. Hi uero non sine febre erunt, cibum & potum fastidiunt, magis iacere cupientes. qui cum se leuare uoluerint, impetu conantur exurgere, sed propter dolorem omnium membrorum tardius exurgunt. Quod contingit ex magno

ARTIS VETERINARIAE.

ex magno labore & cursu nimio, uel ex humoribus nimijs, cū plurimus sudor fatigatis neruis mēbra conquasset, unde syncope, id est, defectio nascitur: cuius ista curatio est. Calida cum flore foeni eū fomētabis à spīna, armis, et renibus, tepesactumq; diligenter tergendo siccabis, Tunc uino et oleo calido totum perūges, diutissimeq; confricabis: coopertū deinde locis calidis statues, molliaq; substernes ut dormiat. Quod cū per triduū feceris, hac potione refouebis. Mirræ uncias 2. dragāti uncias 4. croci drachmas 4. meliloti uncia unā, anagallici librā, thuris masculi pondus unū. quæ omnia cribrata in puluerem rediges, ex quo duo coclearia cū aquæ calidæ hemina, & mellis coclearibus duobus, et olei rosei cyathis duobus potionē dabis plurimis diebus, donec sanum fiat. Etiam uulsis hæc potio, & tensione laborantibus prodest.

De his qui sanguinē per nares mittūt. Ca. LIIII.

Sæpe ex cursu nimio iumēta sanguis infestat, & per nares emanat, qui difficile ueluti ruptis uenis labore & calore substringitur, & uelocissimam etiam postulat medicinā. Succū itaq; uiridis coriandri, uel si defuerit, porri satiui succū in naribus periclitantis infundes. pollinis triticei drachmam, thuris puluerizati drachmā 1. anagallici uncia 1. amyli semiuncia, commixta & in tres partes diuisa, ex uino nigro suffundes naribus, sanguinemq; præcludes.

De infestatione sanguinis. Cap. LV.

Animal sanguine laborare hæc signa declarant: Oculi tumbunt, frigidum erit corpus et ceruix, tristitia fastidiumq; iungetur, difficileq; curabitur. Hac ratione curandum. A cibo potuq; temperabitur, somniq; indulgebatur copia mollibus stratis, tum de matrice quantū ratio postulauerit sanguis auferatur, nec potionis cura cessabit. Succū itaq; uiridis coriandri, uel si defuerit, porri sectui, trixaginis quoq; & centaureæ uiolacæ, & nitri æqui ponderis mixtura inungitur. Ex quibus tumis atq; cribratis diurnū cochleare ex hemina aquæ tepidæ infundatur faucibus. Quæ potio humores & sanguinē, iminentesq; alios morbos purgat, phibet et sanat.

Quæ adhibēda diligētia, ut aīalia sana perdurent. C. LVI.

Obscuras difficilesq; curas prima fronte digestimus, consequenter ad cætera pergentes; sed necessarium credimus ostendere rationes, ex quibus

quibus incolumitas iumentorum incorrupta seruetur. Melius enim est diligēti studio custodire sanitatem, quā aegritudinibus præstare remedia. Diligēs itaq; dominus stabulam frequenter intrabit, & primū dabit operam ut stratus pontilis emineat, ipsumq; sit non ex mollibus lignis, sicut frequenter per imperitiam uel negligentiam euenit, sed roboris uiuacis duricia & soliditate cōfactum. Nam hoc genus ligni equorum ungulas ad saxorū instar obdurat. Fossa præterea quæ lotium recipiat, deductoriū debet habere cuniculum, ne pedes iumentorum redundans urina contingat. Patena, quæ appellatur, hoc est, alueus, ad hordeum ministrandū sit munda semper, ne sordes aliquæ cibarijs admisceantur et noceant. Loculi præterea uel marmore uel lapide uel ligno facti distinguendi sunt, ut singula iumenta hordeū suum ex integro nullo præripiente cōsumant. Nam sunt animalia ad edendū auidiissima, quæ cū celeriter propria deuorauerunt, partem consortis inuadunt. Alia uero naturali fastidio tardius comedunt, & nisi separatim acceperint, uicinis rapientibus macrescūt. Cratis, quæ iacca uocatur à uulgo, pro equorū statura nec nimis alta sit, ne cū iniuria guttur extendatur, nec nimis humilis, ne oculos contingat aut caput. Luminis plurimum stabulo infundi oportet, ne tenebris assueta, cū producuntur ad solem uel caligent, uel aciem uisus imminuant. Aestate in apertis locis tā noctibus quā diebus iumentis libera aura præstanda est. Hyeme uero tepere debent stabula potius quā calere. nam nimis calor licet custodiat pinguedinem & reficere uideatur, tamen indigestionem facit, & uehementius nocet naturæ. Propter quod diuersa genera morborum ex uapore ipso animalibus generantur. Si producuntur ad frigus insolitum, statim aegritudinem ex frigoris nouitate percipiūt. Curandū est præcipue, ut siue fœnum, siue paleas, uel manipulos uiciæ pro regionum usu uel copia animalibus præbeas, incorrupta ac bene olentia & munda mittantur. De hordeo quoq; non erit sollicitudo dissimilis, ne aut puluerulentum sit, aut lapidosum, aut mucidum, aut uetustate corruptū, aut certe recens de areis sumptum, & ipsa nouitate præferendum. Aqua etiam limpida ac frigida, etiam perhennis ac profluens ministranda est. Nā quicqd importunius fluit, uirus non admittit. Bis in die multorum manibus animalia sunt toto corpore confricanda: quæ cura & mansuetudinem docet, & laxata cute pinguedinis præstat augmentum. Hordeū quoq; non semel nec bis, sed pluribus portioni-

bus præberi conueniet. quicquid enim paulatim acceperint, legitima digestione faciunt. Quod uero semel et enormiter sumpserint, cum fimo indigestum integrumque transmittunt. Vicinum uero stabulum conuenit esse loco arido, stercore uel paleis mollibus adopertum, in quo ante potum animalia uoluntur. Quod exercitium et sanitati proficit, et aegritudinis uitium commonstrat. nam quoties animal, aut non solito more se transuoluit, aut omnino detrahitur, aut accumbere, scias illud extadio laborare, et ideo separari debere, atque curari. Ad quod opus quoque plurimum iuuat, si sæpius et cum moderatione animalia sedeantur. Nam imperitia rectoris et incessus eorum debilitat, et mores, præcipue seruorum impatientia, qui absentibus dominis ad cursum equos uehementer stimulant, et non solum flagellis, sed etiam calcatribus cædunt, dum aut inter suos uelocitatem cupiunt experiri, aut cum alienis uehementi obstinatione contendunt, nec reuocant aliquando currentes, nec temperant. neque enim de damno domini cogitant, quod eidem contingere gratulantur. Quam rem diligens paterfamilias summa seueritate prohibebit, et iumenta sua idoneis et moderatis hominibus, scientibusque tractare committet. Post sudorem quoque si æstus sit, pusca os ablui conuenit: si hyems, muria. Vinum quoque et oleum faucibus infundi oportebit ad cornu, æstate frigidum, hyeme tepidum, ita ut hyeme meri sextario, olei uncie tres, æstate autem duæ tantummodo misceantur. Nec conuenientium portionum debet cura cessare. nam languor, macies, et tussis, et internorum dolor facile submouetur, si sulphuris uiui semiuncia. i. 3. 12. myrræ 3. 4. redactos in puluerem, ouoque crudo imixtos cum hemina uini optimi per os dederis. Est alia sumptuosior, sed accommodatior potio ad omnes morbos, quæ et celeriter reficit et cum intrinsecus purgauerit, curat omnes morbos, tussim ueterem, phthisicos, uulsores, et quæcumque uexata sunt in opertis. Ptisanæ sextarium 1. seminis lini hemina, scæni græci hemina, croci uncia 1. acronem salsum porci pinguis, uel lögano nem, uel si porcina defuerint, caput hædinum depilatū, cum pedibus suis, et cordulis intestinorum mundis, hyssopi fascies duas, cochleas germanas xv. bulbos xv. ficus duplices xx. rutæ fasciculū 1. baccarū lauri cum uirer sextarium, dactylos xx. allij capita tria, seui caprini uncias 6. pulegij sicci fasciculū; hæc omnia purgata leniterque cōtusa decoques in aqua cisternina, donec acron ille, uel certe caput hædi liquecat et dissoluatur ab ossibus. propter quod assidue aquam refundas.

fundis ne cōburatur, sed seruēdo pinguescat, uel succus ipse pinguior efficiatur. Post hæc diligentissime colabis ad colum, tū draganti uncia 1. in tres diuisas partes, ita q̄ exinde in unā potionē missurus es pridie infundas in calidā ut inturgescat. tunc addis passi sextarios 3. & tribus diebus singulos sextarios dabis, oua numero sex, († indie secundo olei rosati oua plena nūero 2) butyri uncias 3 (In die tertio) anagallici uncias 3. amyli uncias 3. pulueris quadrigarij selibrā, lomenti fabæ selibrā. Quæ oīa misces, ut dictum est, æquis ponderibus p̄ triduū diuides, & ieiunū aīal potionabis, et horis aliquot deābulare facies, usq; ad septimā, a cibo abstineatur & potu. Animalia uero macie attenuata, nō absq; studio diligentī reuocantur ad corporum firmitatē. Nā oleo ueteri uinoq; permixtis, & tepēfactis in sole, per totum corpus unguuntur, & contra pilum multorum manibus perfriantur, ut & nerui mollescant, et cutis laxetur, & sudor erumpat. Quo factō cooperta in pontili strato collocantur. Et si hyems fuerit, condita cū semiuncia appij seminis triti, & olei tribus uncijis calefacta p̄ os ipsius oportet infundi. Si æstas fuerit, absynthiū uel rosatum cū 4 scrupulis croci, & duabus uncijis olei frigidū p̄ os similiter debet accipere. Quorū si nō suppetit copia, uinū simpliciter conuenit præberi cū cæteris. Præterea eiusmodi species tpe hyemis cū hordij modijis 4 misces, fabæ sextarios 8. tritici sextarios 4. ciceris sextarios 8. foenigræci sextarios 4. erui sextariū 1. & si meritū equi uel facultas domini suppetit, uuæ passæ et nuclei sextarios singulos. quæ omnia sollerter cōmista cū fuerit, unū modiu in aqua mundissima pridie debes infundere, et paululū mane siccare, ex quo equo semimodu ante prædiū, et semimodu ad uesperā dabis p̄ plurimos dies in loco optimo. uiginti uno die ita stabuletur ut intrinsecus bibat. Quod si ultra modum sagina prouenerit, ne pletura noceat auferendus est sanguis à matrice. Præterea graminum radices, quas aratrum frequenter euellit, studiose collige, et quā potueris longas minutatim concide, hordeoq; cōmisce, et quotidie præbere nō dubites. Aestate uero, excepto eruo, species illæ quas diximus, pro estimatione mensuræ ferragines adinuicem præbeantur, hoc est, hordei uiridis plures maioresq; fasciculos, tritici uel ciceris uel foenigræci minores & pauci. Quæ oīa cōtusa oportet apponi. Præcauēdū tamē ut in lōgiore uictitōe uel itineribus, iumētis urinae copia nō negetur. quæ res nō sine piculo plerūq; differtur. Pedes quoq; eorū post uia eruendi sunt diligēter, ne quid luti

ARTIS VETERINARIAE.

uel sordium in articulis basiꝑ; permaneat. Vnguēto etiam confricādi sunt, quo ungule nutriantur, & medicaminis beneficio subcrescat quod itineris attriuerat iniuria. Alij capita tria, rutæ ueteris fasciculum, aluminis scissi et cribrati uncias 6. axungie ueteris pondo 2. stercoreis asinini recentis manū plenam, quibus cōmixtis atq; decoctis domi, ut uolueris in itinere uteris ad uesperam. Præterea aliud quod ungulas nutrit & firmat. Picis liquidæ libras 3. absynthij librā 1. alij capita 5. axungie librā 1. olei ueteris librā semis aceti acrioris sextarium unum, uniuersa contundes & misces, et decoques, & ex eo coronas uel ungues animalū confricabis. De palatis singulis mensibus minuente luna sanguis detrahetur. quo factō si qua est capitis passio releuatur, & ciborum fastidium tollitur. Oportet autem ferramento concisario animalium soleas ramulasq; purgari, quod euaporat atq; refrigerat, & fortiores ungulas reddit. Si animal domi forisq; perfrixerit, calidioribus unguentis, quæ multa sunt, lumbi eidem confricentur & cerebrū, potionibusq; & pigmentis, & herbis quarum seruentior est uis, per os continuo oportet infundi, ut perfrictionis incommodum euincatur atq; pellatur. Nā si in uisceribus permanserit algoris iniuria, diuersos, periculososq; procreat morbos. Si uero dierum canicularium tempore aestu animal fatigabitur, uel aquis frigidis est perfundendū, uel in mare flumen ue mittendum. frigidis etiam potionibus recreandum, ut necessitati laboris aut temporis aptior medicina succurrat. Sed in equis non solum utilitas, uerum etiam decoris ratio seruāda est. Nunquam itaq; nisi necessitas passionis exegerit, de articulis rese candi sunt cirri. Naturale enim ornamentum pedum natura in illis con?ituit. Ceuicē etiam ipsam diligens. debet ornare tonsura. Multa enim sicut currulibus, ita & sellaribus iumentis pressius colla radunt. Quæ res licet præstare creditur augmentum, tamen sub honesto sessore deformis est. Alij ita tondent, ut arcū uideantur imitari. Nonnulli Armeniorum more crines aliquos in tonsura ipsa per ordinem derelinquunt, Sed gratiora sunt quæ translata de Persis posterior usus inuexit. Nam media iuba ad omnē accuratationem ex sinistra parte tondetur, à dextra uero omnino infecta seruat. Et nescio quo pacto plurimū deceat, quia illud quod naturaliter laudatur Vergilius imitatur.

Densa iuba, & dextro iactata recumbit in armo.

Quod si bicomis fuerit, ut uulguſ appellat, mediæ cernicis setas equaliter o-
portet

portet attondi, ita ut tam dextri quàm sinistri limitis continuata serie iubæ relinquantur intactæ. Quod nihilominus inuētum constat à Parthis, quibus consuetudo est equorum gressus ad delicias dominorum hac arte mollire. nō enim circulus atq; ponderibus prægrauant ut soluti ambulare cōdiscant, sed ipsos equos, quos uulgo Trepidarios, militari uerbo Tottonarios uocāt, ita edomant ad leuitatem, & quædam blandimenta uecturæ, ut Asturconibus si miles uideantur. In sicco itaq; æqualiq; solo quinquaginta passus in longum, & qnq; in latum plenis cophinis digeritur per ordines creta, ad similitudinē stadij, quod aulicibus asperius sit, tum difficultate coronam uelocitatis optantibus ingerit, in quo spacio cum equus frequētissime exerceri cœperit, in illos aulices necessario offendit, et priores & posteriores ungulas impingit, et ali quādo uel cadit, uel sic offendit ut cadere uideatur, post quod admonitus iniuria, tollit altius crura, & inflectione geniculorum atq; gambarum molliter uehit. Præterea minutos gressus imitatur, ut inter aulices ungulas ponat, nā si extendere uoluerit, offendit in cumulum. Minutim autem equus ambulās commodius uehit, & pulchrius uidetur incedere. Potiones etiam hyemales æstiuasq; conscripsimus, quibus aut conseruetur sanitas perpetua, aut uehemens ægritudo pellatur.

Potio æstiuo tempore danda. Ca. LVII.

Dum æstus incanduit, hæc potio animalibus commoda est, quia humectat & refrigerat: Croci uncia unā infundes in uino ueteri, draganti uncias tres infundes in aqua calida, his adiunges fasciculū uiridis porri 1. item fasciculum uiridis apij, herbæ portulacæ succi heminam, lactis caprini sextarios tres, oua septem, olei rosei librā, mellis uncias 3. passi sextariū 1. uini ueteris quod sufficiat. Ex quibus omnibus diligenter commiscis atq; contritis, ad cornu per triduum sextarios singulos animalibus dabis. Alia quoq; refrigeratoria potio: Vini ueteris sextarium, olei librā semis, oua tria, succi coriandri cyathum 1. lactucarum cyathū 1. sollerter admisce, & in tres diuides partes, daturus per triduum iumentis æstuantibus salutare remedium. Tamen eo momento quo potionem defusus es, per singula animalia singulas heminas aquæ frigidæ & recens sumptæ potioni decies adiungere.

HYeme quoq; potio ista præbetur: Vini uetris sextarios 3. olei selibræ. pipis uncia 1. ruta uiridis uncias 6. cerefolij uiridis uel seminis ipsius uncias 3. draganti uncias 3. seminis feniculi uncias 3. baccarū lauri uncia 1. mellis uncias 6. oua quot uolueris, et passi quantum usus exegerit.

Potio in Autumno et uere præbenda. Ca. LIX.

COSTI semiuncia, castiæ fistulæ uncia, celticæ semiuncia, petroselini semiuncia, betonice semiuncia, glicericæ semiuncia, sagapini semiuncia, spicæ indicæ semiuncia, saxifragæ, eupatorii, meliloti, irisillyricæ, aff semiuncia, centaureæ, gentianæ, aristologiæ longæ, aff uncia 1. amomi, aristologiæ rotundæ, aff semiuncia, scinoanthos semiuncia, asari, aloë, aff semiunc. murræ uncia, opopanacis, radicis dracontæ, aff semiunc. croci uncia, draganti unc. 6. castorei uncia, absynthij pōtici fasciculos 2. hæc oīa in puluerē redacta ad. xij. aīalia p triduū sufficere credūtur, ita ut cū uino optio digeratur.

Potio omni tempore necessaria. Ca. LX.

COSTI, meliloti, hyssopi, irisillyricæ, aristologiæ, samplici, dracontij, asari, draganti, centaureæ minoris, marrubij, gentianæ, spicæ celticæ folia, æquis ponderibus misces, redactaq; in puluerem cernes. sed si æstiuā dare uolueris potionē, cōmises croci, mellis, et draganti quod sufficit. Si autē potionē facies hyemalē, addis, piperis, appij seminis, et semis sēnapi. utroq; autē tpe cū boni uini sextario plenum cochleare miscetur, fauctibusq; animalū diffunditur.

De difficultate urinæ. Ca. LXI.

DE urinæ difficultatibus ordine suo multa dicenda sunt, sed uiatorium istud, & physicum, & semper paratum te scire conuenit. Lutū ex cuiuscūq; equi lotio factū uino p misces, colatūq; p nares infundes, et confestim prouocat urinā. Itē allium conteres et in anū inicies et ueretrū, mox egerit lotiū. Itē, Puluerem quoq; thuris cū ouo uinoq; p mixtū, addito succo apij et caulii, si potionē dederis, prouocabit urinā. Itē, Betas ac maluas ad tertiā decoques, ex qbus aquā calentē ad med ū sextariū cū melle cōmises, et p os digeres, proderit minctioni. Itē, Cimicē quoq; uiuū in aurem equi mis

equi mitte, et alterum supra naturam in ipso foramine quo mingit confrica, facillimum certumq; remedium est.

De stropho. Ca. LXII.

I Tinerum casibus subuenire cupientes, de pluribus pauca, sed manifesta libabimus. Nā aīalia sub sessore uel onere dolor uentris frequenter affligit, ut uoluentur et procūbant. Semē itaq; rutæ syluestris uel hortēsis si illa defuerit, diligenter tritū cū uino calido per fauces oportet infundi. Præterea aquā in qua usq; ad tertā betæ decoctæ sunt, succūq; earū nitro trito solerter admisces, oleiq; addes hemina, tepesactaq; in intestinū per clysterē diffundes, cū prius pronū aīal statueris, ut iniectū ad interiora perueniat. quæ si forte defuerit, mel coctū cū tertia pte salis triti coqis in pillulas, ita ut collyria ad oīi magnitudinē facias, similiterq; pronō aīali in intestinū uel qnq; uel septē, aut nouem collyria inserere curabis. post soluituruēter et mitigatur dolor. Item, physicū traditur os limacis neq; manu immunda, neq; terra, neq; dente contactum alligare umbilico dolentis curare continuo.

De dorso curando. Ca. LXIII.

P Lerung; dorsum aīalibus aut sarcina ledit, aut sella, propter stramētū negligentia uel oneris iniuriā. qđ in itineribus interdū necesse est euenire, sed recēs tumor hac ratioē curatur: mallonē ceparū uel ipsas cepas in feruenti aqua decoques, et calētes quantū coriū ualeat sustinere, tumori suppones, et fascia ligabis. una nocte oīs aufertur inflatio. Præterea sal tritum cum aceto miscebis, additoq; uitello oīi, loca quæ tumere cœperint perfricabis, recens indignatio destrieta siccabitur.

De probatissima potione diapente. Ca. LXIIII.

C Vi cure est aīaliū salus, potione supius declaratā, quā specierū nūcro diapenten græco uocabulo nūcupāt, Gentiane, aristologie, murræ, baccarū lauri, rasuræ eboris, paria pondera diligenter trita atq; pmi xta, domi, siue in itineribus prius cōdita, habere oportet in promptu, ut quoties incesstū aut horridū uideris animal, aut morbi alicuius labe tentatū, statim plenū cochleare ex puluere memorato cum sextario uini optimi p fauces diffundas, et p tridū, etiā equo in labore constituto, digeras, ut aduersus uirus internum subueniat. probata curatio. Tussienti autem cum passi hemina dabis, et statim sentiet curam. Si liber, cui iam ponendus est finis, legem

ARTIS VETERINARIAE

tium non offendit auditum, sequenti uolumine inchoantes à uertice usq; ad ungulas ex diuersis authoribus enucleatas animalium publicabimus curas, ut ordo, qui à natura datus est, in medendi dispositione seruetur, ne indigesta ac membrorum consequentiæ repugnās pagina quærentē confundat aut tardet.

FINIS LIBRI PRIMI.

IN SECVNDVM ARTIS VETERINARIAE VEGETII LIBRVM, PROLOGVS.



Vl medicina ars iamdudum uitio cupiditatis, et exiguitate mercedis, nullo studiosius discere, collapsa est. Nūqd uero exemplo Hunnorum siue gentium aliarū artis ipsius etiam usus intercidet, dum homines resurgentes expensas, barbarorum cōsuetudinem imitari uelle se simulant, & incurata animalia hybernis pascuis, & negligentiae casibus dedunt? Quæ res nulli cōpendium, plurimis attulit damnum. Primo quod Barbarorum animalium alie nature, & ad omnem iniuriam durius corpus est. Deinde quod sic instituuntur à paruulis, ut nec potionē medicinalem requirant, & hybernis pascuis uigeant, ac sine perniciæ frigora pruina sūq; sustineant. Nostra uero iumenta & mollioris generis sunt, & tectis frequentioribus assueta, calidissimis etiam stabulis imbuta, cum indignationem ex aliqua necessitate contraxerint, continuo in aliquod genus incidunt morbi. Diligens itaq; paterfamilias, cum mortibus animalium suorum & cum medicinæ expensis atq; mercedibus faciat rationem, intelliget unius uilissimi iumenti pretiū ad multorū, quæ sine dubio peritura sunt si curata non fuerint, salutem posse sufficere.

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE LI.
BER SECVNDVS.

DE VALITVDINIBVS CAPITIS.

Caput primum.



IN VNIVERSO ANIMANTIVM genere caput obtinet principatum, quod eminentius cæteris, dominatum quendam circa loci ipsius conditionem sortitur. In eo est odor, gustus, auditus, ac uisus: quod quantum habet potestatis, tantum sustinet ex labore discriminis. Causas itaq; ex quibus ægritudines generentur, et signa, per quæ qualitas eorundem possit agnosci: curas etiam, quarum medela sanitas reuocetur, per ordinem indicare tentabimus. Plærunq; autem in corporibus iumentorum indigestionis uitio sanguis corrumpitur: quod euenit cum ex aestu uel frigore debilitata sunt mēbra, et in capite frigus sanguis uertatur in uirus. Tunc enim repletis uenis cerebri membrana distenditur, et somni salubritatem frequenter excludit. Ex quo necessario dolor capitis, mœstitia, et imbecillitas subit. Quæ ualeitudo et prima uidetur, et leuior, si uelox medicina subuenerit.

De Appioso. Caput .II.

CAeterum cum noxius sanguis membranam cerebri et ex una parte pertulerit, et eandē dolore nimio coeperit prægrauare, efficitur animal appiosum: cuius et mens hebetatur, et uisus. Nam cerebri incommoditas et oculos paſcit et sensus. In qua passione quia una pars capitis prægrauatur, tanquam ad molam uadit in gyrum.

De Frenetico. Caput .III.

CVM uero medium cerebrum corrupti sanguinis uirus infecerit, animal freneticum redditur, ut repente saliat, et uelut effugere uelit, pa-

F rictibus

rietibus se tanquam irregibilis impingat, nec possit ratione aliqua contineri.

De cardiacis. Caput .IIII.

Cardiacus is est, cui cor dolet. Cardiacus autem fit, quoties sanguinis illa corruptio stomachi uel thoracis impleuerit uenas, cerebrūq; percusserit, cor etiam pestiferi humoris labe constrinxerit. Quæ ualutudo inducit mentis alienationē, & corporis sudore monstratur. ex quo difficillime liberatur.

De rabioso. Caput .v.

Quod si Appiosum. simul passio thoracis inuenerit, facit cōtinuo rabiosum. Ex ardore enim nimio iecinoris & sanguinis, uenæ cordis neruiq; præsocantur, ex qua constrictione fit dolor ipsius loci usq; adeo, ut mordendo se comedat. Ex quibus ualitudinibus si animal fuerit liberatum, & post curationem aliqua pars cerebri fuerit imminuta, uel tumor subreuerit, ineptum iumentum, pigrumq; redditur. & in illa parte capitis ubi uitium remansit, difficile se gyrabit, & ex eo latere se parietibus iungit, & tarde incedens, non sentiens plagam, ambulaturæ gratiam perdit, et erit submisso capite, & cum stare cœperit cum tarditate se mouet, minus etiam uidebit, nec cibum nec potum recusat. Quem si curare uolueris, cyclo curabis. In omnibus suprascriptis ualitudinibus, primum de temporibus minuendus est sanguis, sed & de matrice aliquando tollendus. Cura autē penē omnīū similis est, cuius ordinem sequentia declarabunt.

Qua obseruatione cyclo curentur animalia. Caput .VI.

Memineris autem omnes ualitudines capitis, præcipue ueteres, periculosos, cyclo oportere curari. Cui hæc obseruatiō et ordo est adhibendus; Triduo ab hordeo abstinabitur animal, temperabitur etiā mollibus cibus, post diem tertiam de dextra ac sinistra, prout ætas aut uires, uel ualitudo permiserint, de matrice sanguis auferetur. Quo factō, per triduum uiridi cauliculorum ac lactucarum sustentabitur cibo. Primo uno die a cibo eum sustinebis & aqua. nouo autem die offas caulium cum liquamine & oleo optimo temperatas non minus uiginti digerās, cui nihilominus lactu
cam dab

cam dabis in cibo ter in die. post potionē bibere semper incipiat. Si uero uenter uehementer solui incœperit, caulū offas dare desistes: sed dabis paleas et fursures, ita ut sequente die penitus nihil manducet, sed solam aquam percipiat ad bibendum, ac postero die inducatur in cellam balnei calidā et sudet. Opus est autem diligentia ut reducatur celeriter de calore, ne intercluso spiritu pereat: tunc extergetur diligenter, uinoq; et oleo largiter perfricatus, accipiet cum nitri puluere folia rasanī conspersa, quantum commodum est. Possi modum cum radicibus cucumeris asinini uiridis minutatim concisis oleum optimū misces, et in uase nouo ita decoques ut tertiam perdat. ex quo singulas heminas per capita animalium per triduum dabis, ut potio uentrem resoluat. Sed si ultra modum fluere cœperit, lenticulam et hordeum pari mēsurā friges, et de his singulas bilibres per dies singulos cum fursure et paleis dabis. Quinq; itaq; diebus operam refectiōis eius impendes, et leuiter exercebis, ut intelligas quantum uires corporis sanitasque profecerit. Post hæc eum pro arbitrio despumabis. Sequēte die caput eius purgabis exorica, uel radice dianaria, quam Artemisiam dicimus: si hæc nō fuerint, ex liquamine optimo cū oleo mixto. cuius caput pedesq; connectis, cum bene purgatum agnoueris, soluito, butyrum ex oleo roseo solutum infundes in nares, ut illo purgationis mitigetur asperitas, ita ut singulæ cotylæ singulis naribus infundantur. Si supradictæ potiones non soluerint uentrem, mellis, hellebori albi pondus unius denarij cum hemina dulcis uini bene tritum in potione recipiat, uel certe scammonie pondus duorum denariorum diligenter trita cū dulcis uini hemina simili ratione diffundes in fauces. Quod si uenter ultra modum dissolutus discrimen importat, anagallicum succo ptisanæ ad restrictionem ipsius dabis, lenticulamq; et hordeum frixum, singulas bilibres cū paleis et fursure præbebis in cibo. Ad ultimum, partes quæ in causa sunt, sinapizabis diligenter, sinapizatum cauterē ferreo, uel quod ualius creditur cuprino combures, uisā curaturus ex more. Potionem quoq; ex antidoto polygresto per dies plurimos dabis, et exercebis leuiter, et ad cibaria ipsius aliquid per partes semper adiunges, donec ad pristinam consuetudinem reuocetur. Insanabiles uale tudines cyclo affirmantur posse curari, id est, insani corroborari, caduci cyclo curati uruntur in capite; morbidi uero, dysenterici, coriaginosi, orthopnoici, strophosi, cyclo curentur in renibus.

De cerebro commoto. Caput .VII.

Cerebrum plerunq; diuersis passionibus commouetur, quod his deprehenditur signis; Ambulabit prauus, & frequenter offendet, & toto se corpore commouet. Cuius ista curatio est; Baccas lauri nūero xx. nitri selibrā, rutæ manipulum; quæ omnia diligenter trita, cū aceto non acro, & oleo optimo rosaceo cōmixta, hyeme calefacies, perunctoq; oleo capite eius & cerebro, uel auriculis, cerebellū de lauata pelle cōuoluis. Quæ si forte defuerint, farinam hordeaceam resināq; miscebis, ex quo cataplasma cōfectum cerebro oportet imponi. Præterea ceram oleo cyprino coniungis, & linteo inter auriculas ad ceroti instar imponis. Sed & reliquum corpus potionibus resouēdum est. Tres fluuiatiles canculos cōteres diligenter, et cū duabus uncijis succi caulii, addito lactis sextario olei duobus cyathis, pmiscebis, & colatum per os diffundes ad cornu. Quorum si inopia est, mellis cyathos duos, aquæ calidæ sextariū i. coquito, ex quibus pastillos facies, & in aqua frigida dilues, & dabis in potum. Præterea si hyeme curaueris, farinā triticeam; si æstate, hordeaceam, aquæ frigidæ adinuicem amuli permixtā in potione præbebis.

De dolore capitis. Caput .VIII.

De capitis dolore multi authores multa dixerunt. Cuius hæc sunt signa: Tumor circa oculos apparebit, pabulum recusabit, lingua eius & palatum labiaq; tumbunt, quanto uehementius increuerit morbus, tanto exoritur amplius tumor: ambulātes toto corpore uacillāt, umbrāq; suam uelut odorantes expauescunt. Cuius passionis ex corruptione sanguinis nascitur causa, cum indigestio ciborum naturali meatu intercluso, uel certe derelicto, in eas uenas, quæ circa tempora sunt, defluit, membranamq; cerebri uitiat. Cui sanguinē de temporibus oportet minuī, & cōtinuo oleo acetoq; permixto caput largiter perungi. Quod si hyems fuerit, hordecum pridie infundes in aquam & decoques, calidamq; in saccellos immittes, iumen torumq; caput fumentando diutius uaporabis. Alij authores tolli de palato sanguinem iubent. Tunc cimoliam cretam ex aceto infusam, & merdā bubulam recentem cum nitro trito miscent, & in cacabo super carbones decoquunt, calidūq; cerebro languentis imponunt, aceto rigantes ne creta astrin-

gatur

gatur ad pilos usq; cum prius calida sumentauerunt caput. Dolorē capitis propē ad insaniam ista signa demonstrāt: Quoties graue est, & in præsēpio se deponit, lachrymæ frequenter oriuntur, auriculæ stabili, oculi grauiore sunt, anhelitus creber, aridus pilus, tremores frequentes, tristis aspectus. Quem in primis ab aqua abstinere ne nimium bibat, de utraq; parte collī sanguinem detrahes, caput sicut scriptum est curabis.

De Distentionibus. Cap. IX.

Distentionis quoq; ualitudo ad capitis præcipue causam refertur. Cuius hæc erunt signa: Impediente caligine obscurabitur uisus, tremor & sudor totius corporis insequitur. Quod uitium contingit ex aqua, si sudans iumentum biberit: uel ex indigestione cibi, si non dormiat, uel substrictus manserit. Huic capitis membrana distenditur. Quæ passio cæterarū ualitudinum & fons probatur & mater. Nisi enim inter initia curaueris caput ut animal dormiat competenter, fiūt appiosi, insani, rabiosi, frenetici, carij diaci. Igitur cū aīal distentiōis ægritudo comprehēderit, de ceruice eidē sanguinē tolle pro magnitudine corporis & ætatis. Et si æstas erit, oleo & aceto caput totumq; corpus perunges, & diutissime confricabis, loco refrigerato & opaco inclusum continebis, substernes etiam stercora sicca uel paleas, ut prouocet ipsa mollicies ad cubandum, locum calidum declinabis, nam impedit somnum: fursure uel paleis uel folijs lactucarum reficies. præterea potū præbebis exiguum: cum cōualescere cœperit, modicis ambulationibus exercebis, ubi idoneum uisum fuerit ad cibaria largiora insusum hordeū ad pristinam consuetudinem paulatim per incrementa reuocabitur. Si die septimo non profecerit, sanguinem iterum de temporibus emittes, & caput sine intermissione curabis. potionem dabis qua sanatur appiosi: Nasturcij seminis, appij seminis, seminis lactucæ, anagallici, petroselini, aneti, papaueris syluatici seminis uncias singulas, piperis scrupulos 3, croci drachmā unā. Quæ oīa bene cribrata atq; cōmixta ex aqua temperabis, trochiscos facies, ut habeant minus quā singulas drachmas. In dieta unū trochiscū in aqua dissolutum per os digeres. quod quotidie oportet fieri donec sanitas redeat. Si non appetit cibū, singulos trochiscos solutos cum succo ptisanæ quotidie præbebis. Vinū nūq; dabis. Capitis enim ualitudo sumpto mero deterior efficitur.

De Appioſo. Caput .X.

Si quod iumentum appioſum fuerit, in præſepio incumbit, oculos tenſos habebit, micabit auriculis, niſus caliginem patietur, & gyrat in circulo tanquam ad molas.

De rabioſo. Caput .XI.

Quod ſi etiam fuerit conuerſus in rabiem, ſic intelliges: Subbito hinc nict tanquam ſanus, parem ſuum appetit morſu, uel hominem, præſepia aut ilia ſibi mordicās rodit: quē ſicut appioſum curabis. Proſus abſtinebis ab hordeo, mollibꝫ cibarijs ſuſtētabis. Præcipue tamē apū uidentem quantum uoluerit præbebis. Sanguinē de temporibus aut de ceruice emittes, loco tenebroſo ſtatues, caput eidem huiuſmodi acopi cōſectiōe curabis: Opopanacis librā 1. refinæ, terbentinae atqꝫ uncias 2. galbani unciā 1. refinæ frixæ uncias 3. maſticis trita uncias 2. olei ueteris librā 1. ex hoc ei cerebrum & auriculas confricabis, oleū tamen ſolum ac liquidum in aures eius ſuffundes. cuius tamen priꝫ quā acopo utaris, ſaccellationibus caput cerebrumqꝫ uaporare te conuenit, & caput appoſito cerebello communire. Potiōes quoqꝫ ex trochiſcho ſupius memorato quotidie præbebis, collurio acrimungis aſidue ut caligo ex oculis poſſit auferri. Quæ cura ſi non profecerit, caput & tempora ſub ipſo protocomio ſemiſſe inuris cauterio, quod & ſup uenas tēporales facies. Pleriqꝫ tamē facies ne deſormēt iumentū ſolo tabulare palati († conſecto) ſani fieri poſſent. Feruor enim ſoci debilitatem capitis tollit, & membranā menti priſtinæ, ſanitatiqꝫ reſtituit.

De Infania. Caput .XII.

Alij authores inſanientis iumenti ardentes & ſanguineos oculos et humore ſuffuſos, ſtantes auriculas dicunt uel micantes, ut ad inſtar indomitōrū nec capi poſſit, & captum, parietibus ſe illidens conetur effugere. terram pedibus fodiet, et multum flegmatis ex ore profundet. quod hac ratione curatur, ut auferatur ei ſanguis de angularibus uenis, de palato, & poſt de cruribus, d cibo eadem die abſtineatur & potu. Alia autē die aquā frigidā dabis ei bibere. Auferātur ſtercora quæ in ano eius ſunt, p quatrīdū continuato clyſtere, curabitur uenter, ungetur cerebrum, ſecreto conlocabitur loco

huc loco, accipiet in substantiam porros, & herbam molliſſimā, aut molliſſimum ſcēnū. His potionibus percurandum: pulueris turis drachmā 1. aceti albi ſextariū 1. radice panacis uncia 1. herbæ ſaxifragæ uncias 3. ex aqua mulſa per os dabis. Lactis caprini ſextariū unū deſundis in ſauces. quod ſi deſuerit, ciminū ruſticū pondo duo in puluerem rediges, additoq; olei optimi in oculo, ex aqua mulſa diſſundis ad cornu. Sed cæteris potio hæc aptior creditur: apij uncia 1. iuſquiami uncia 1. ſeminis apij uncia 1. ſeminis lactuce uncias 2. papaueris ſylueſtri uncia. quæ oīa in puluerē reducta cōmiſceſ, et unū cochlearium magnū ex aqua dabis, uel ſi cibū non accipit, ex ſucco ptiſanæ: obſcuro et frigido & laxiore loco ſtatues, ſilentiūq; præbebis ut dormiat. prius tamen oleo ac pice liquida caput perunges, auresq; complebis, tempora etiā munies cerebellare uel ſaſcijs, mirtam quoq; aridā conteres, & aceto oleoq; miſcebis, corpusq; eius totum diutiſſime conſtricabis. Solent conſtringi & obarui ſtercore ut ſudent & dormiāt. Quibus ſi ſomnus uenerit, afferet ſanitatē. Rabioſum uero iumentum eadem omnia, & maiora oſtendit quā inſanum. Nam & alia animalia comedit, & facit ipſa cotagione rabioſa. Plærunq; etiā morſibus inſtina ſua extrahunt & ineunt fortiter. Quæ ualeſtudo ex nimia ſanguinis abundantia & ardore contingit. Curatur aut obſervatione & potione ſuperius declaratis.

De Chirurgia. Caput .XIII.

Chirurgia appellatur quodcūq; ſecatur ferro, uel cauterijs uritur. quæ cum ſit omnibus membris aīalium, præcipue tamen capitis neceſſaria eſt medicina. Quodcūq; igitur iumentū in qualibet parte ſegerit caput uel nudauerit caſu, ſollicite curandum ne indignatio uulneris in ueruos cerebrūq; penetrādo piculū generet, nec in primo medicamētis uti acrioribus cōuenit, ſed magis melle curare, cū ad maturitatē uenerint illa quæ fracta fuerant, oſſa laxantur, tenta ſollēter, et mobili manu uel forſicibus eximito. Reliqua fragmenta oſis, quæ aſperata ſunt ferramentiſ cædito atq; prædito, ut carnē facilius inducāt. Nūq; enim clauditur uulnus ſi non raſeris, do nec ſanguis per os ipſius reſpōdeat. In quo maior eſt adhibēda cautela, q̃a ſolet in locis oſſuoſis et cōmiſſuralibus fiſtula fieri. quæ cū euenerit, parum per iniuriā aſſicit uulnus, per quod non ſanies, ſed humor liquidus emanat. nec unquam deducta cicatrice ſolidatur. Quod ſi euenerit, hac ratione curabis.

ARTIS VETERINARIAE

Papyrus per ipsam fistulam traicies, ita ut capita papyri, quæ extra fistulam eminent, ex utraq; parte alligas lino ne cadat, et diebus v. uel pluribus, donec callositas fistule papyri distentione turgescat, & maius vulneris foramen fiat. Tunc ad mensuram vulneris ex fistulari medicamento collirium faciens, ex empto papyro intra fistulam injicies, ut impleatur ex integro, plane ne excidat munies diligenter. Post dies quatuor uel quinque soluis. Si fistula ceciderit, traumatico curabis, quod vulnere semper immittes, donec spissa sanies & non multa in eo loco reperiatur. Cum autem iam lympidum uideris collirium, fac pollinem herbi, & tritici masculum tritum æquis ponderibus cum melle decoquito, & plagæ ipsi imposito, per dies plurimos quotidie curato ita, ut deprimas ipsas partes vulneris, quatinus iunctæ citius coherescant. Si grauius offenderit caput, ut cerebrum uexet intrinsecus, continuo de temporibus sanguinem eidem oportet auferri, & spongiam aqua, si æstas fuerit, oleo roseo, & aceto æqua parte commixto capiti eius imponi, fasciâq; connecti, & cibos uirides præberi. Si nec ipsos appetit, quia omnem cibum recusat, fabam moles & conuerteris in pollinem, farinam quoque triticam pariter admisces, et cum mulsâ per cornu ad substantiâ animali tam diu faucibus eius infundes, donec cibos uirides appetat, quos aqua marina uel salsa oportet aspergi.

De auribus. Caput. XIII.

Aurium ut uicinitate proxima, ita periculi non discrepans cura est. Quæ si casu aliquo fuerit à radice contusa, & collectionem fecerit, eam cum maturauerit, scalpello secato, & pus finito fluere, tum lino aceto acerrimo & oleo per triduum, quarta die traumatico curato donec sanetur. Etiam si cartilaginem uexauerit, eiusdem medicinae obseruatione proficiet. Si uero à radice auriculæ, uel commissura capitis tumor magnus cum duricia extabit, ex scæni græci & lini semine & tritici polline cataplasma imposito, maturatam collectionem scalpello secato, ita ut inferius plaga spectet, quatinus humor per prona decurrat. Vino, oleo, & sale mixto infusos leniscos inducis, & uulnus per quatrimum soueabis. post traumatico ueris. sed difficilis cura est, quia fistula in talibus locis frequenter oriuntur. quæ si euerint, suprascripta curatione curantur. Si tamen ægritudo uulneris ulterius etiâ post medicamenta procedat, uicina urenda sunt partes, & cauterio in ipsis coll

ipsis collectionibus insignenda sunt puncta uehementius, ut et cutis et causa perumpatur interior. post solerter uita curanda sunt. Non enim aurium est negligenda curatio, ne ex dolore nimio generetur insania. Primum purganda est auris diligenter intrinsecus, ut auferatur quod dolorem mouet, aut lædit. Si nihil inuenitur, spongiam nitro et aqua molliter infundes et dilues, anamq; noctem intra auriculam infusam spongiam manere patieris. Die tertio nitro et aqua calida fouere incipies frequenter et diu, donec dolor recedat. Quod si aqua fuerit ingressa, oleū uetus et acetum æquis ponderibus adiecto nitro in aurem mittito, et succidā lanam superimponito. Si uulnēra fuerint hyparem auribus inseres et curasti.

Depilis qui nascuntur in oculis. Cap. xv.

Quodcumq; iumentum in oculis tritiacem patietur, id est, ut pili aliam palpebram urentes lachrymas moueant, uisumq; conturbent hac ratione curatur. Non longe a pilis ab interiori parte scalpello plagam dabis in cute palpebræ, post forpibus per longū ad mensurā oculi fasciolam præcides, et impositis fibulis consues palpebram foris uersus, ut oculus sine deformitate recipiat uisum et gratiā naturalem. Tūc uero optimo oleo, necnon etiam muria infusam spongiam superpones, et oculū fasciabis. Post die quinto soluis, tunc intrinsecus oculum collyrio curabis. de foris uero tetracharmum impones, nō prius fibulas ablaturus quā duxerit cicatricem. Nihilominus et cadentibus fibulis, collyrij cura non deerit, ne caro rursus superflua excreseat. Sed pleriq; adhibent cum deformitate cōpendium, ut partem quæ prominet ad mensuram naturæ forpibus amputēt, pusca quæ frigida sunt propter fluxum sanguinis foueant, oculum collyrio intrinsecus curent, ne indignationis necessitate ledantur.

De suffusione oculorum. Caput. xvi.

Suffusio sicut hominum, ita iumentorum impedit uisum, cuius tria genera ab autoribus indicantur: Stenochorialis, plotochorialis, hypochorialis, græce papula nōiatur. Stenochorialis dicitur, cū constringitur uisus et uires amittit. Quæ hac ratione curanda est, ut sanguis de temporibus auferatur: radicē quoq; feniculi, et herbam celidoniā uel rutā decoques ad tertias, et cotidie ex ipsa aqua quantū manus patitur, oculus foueatur. Inun-

G ges etiam

ARTIS VETERINARIAE

ges etiam collyrio opobalsamo, quod suffusionibus prodesse consuevit. Aduersus infestantes pilos tertia cura est, ut leni tenuiq; cauterio genæ quæ procreuerint inurantur, quo facto, ducta cicatrice coneritur pellis, & palpebra alterius eleuata à pupilla cursu pilorum arcet iniuriam. Platochoriasis autem est cum se ultra naturalem modum pupilla diffundit, & eripit uisum, nec curari ullatenus potest. Nam sicut oui uitellus casu aliquo disruptus in priorem formam coire non potest, ita semel pupilla diffusa recipere non potest usum uidendi. Quod euenit equorum sudore dum membrana quæ cōtinet lumen, indignatione caloris disruptitur: uel certe sollicitudo longi itineris ad indignationem iumenta compellit, aut lesum oculum dominus curare neglexerit. Quod cum accidit, oculus uidetur incolumis, nullis lachrymis, nullo sanguine, nulla indignatione prodit iniuriam, sed uisus tantum declaratur indicio, quod in pupilla ipsius imaginem tuam tanq̃ in speculo uidere nō potes. Hypochoriasis autem à capitis humore descēdit, & in uno oculo sese primo ostendit, postea etiam ad alterum transit, intelliguntur autem humore uel lachrymis. Continuo sanguinē ei de supercilio uel de ipsa parte temporum detrahes, fomentabis extepida aqua, in qua radices feniculi decoctæ fuerint cum ruta. Preterea inunges collyrio opoponato & opobalsamato. Quod si insiteris medicinæ per lachrymarum cursum consuevit sepius caligo sanari. Temporales quoq; uenæ cauterijs inuruntur, & meatum humoris excludunt.

De paracenthesi in oculis. Caput .XVII.

Quod si uis passionis intulerit cicatricem, diligenter attende quo colore sit membrana, quæ apposita pupillæ impedit uisum: si auroso colore fuerit, insanabilem scias. Si candida nimiū, etiam noueris nō posse curare ipsam. Si uero spissa fuerit colore oleagino muco similis, per paracenthesim ad hominū similitudinem, cum fuerit maturata curatur. Iumentum igitur pridie temperabis à cibo, uel potu maxime prohibebis, in loco molli elides, caputq; eius & ceruicē apte collocabis, ita patentē oculū facies, ut claudere nō possit. deinde ab ipsa fronte paracetheriū inter tunicas oculares subijcito, ne pupillam tangas, aut aliquid lēdas interius, sed ipsum albū de superiori parte ubi hypochisis posita est, capitello paracetherij deorsum deprimis.

primis ad palpebrā inferiōrē subtiliter. Quod si depositū fuerit, nō prius peracetherium eximas, nisi clausum oculum penicello calido diutissime uapora ueris, solet enim resiliere. Quod si ita euenierit, reprimito, donec ita componatur ut resiliere non possit. Cum itaq; intellexeris claritatem pupillae sine ullo obstaculo hypochisis, tunc eximes ferrum, & inuenies alia uidere. curabis sic. Ex oleo roseo & oui albo anacollima facies, lanam infundes, & super oculum curatum impones, ac desuper fasciabis. Caueo ne ipsa die manducet, & moueat oculum agitatione maxillae, sed tamen si uoluerit bibat. Altera die soluis & calida fomentabis diutissime. deinde scoenigræci succum in oculo subfundis, & rursum anacollima supradictum similiter imponis, fasciabisq;. Quod cum per triduum, aut quatrimum feceris, oculum soluis, & scoenigræci succo fomentabis, ex melle optimo attico unges donec cicatrix se confirmet & oculus.

De oculolunatico. Caput. XVIII.

Est aliud uitium eiusmodi, ut interdum oculo album inducat, inter alio lympidet: ex qua passione lunaticum oculum ueteres nominauerunt. Cuius ista curatio est, ut de ipsa parte temporum detrahatur sanguis, interpositis diebus sub oculo. Nihilominus sanguinem oportet minui. Cotidie quoq; calido fomento oculum curabis de foris, Intrinsicus autem inunges collyrio thermantico et acerrimo per plures dies donec recipiat sanitatem. Si nihil ex hac ratione profecerit, uenas superiores in temporibus supra ipsum locum qui sustinet passionem, diligenter perquires & inures, ut humor uoxius possit arceri.

De staphylomate oculi. Caput. XIX.

Quod cumq; iumentum in oculo habuerit staphyloma, incurabile est: talis tamen curatio consueuit adhiberi: De sub oculo sanguinem ei detrahes, & fomentabis calida cum radicibus foeniculi & rutae decocta, inunges etiam collyrio non ualde acri, si uulnus fecerit & deplauauerit, ex succo scoenigræci fomentabis, & inunges collyrio leni, quod facit ad tunicas ruptas, donec se cicatrix cum planitie claudat, tunc uteris acriori collyrio, & per dies plurimos, donec quaecunque pars equari possit

aquari possit ad naturæ similitudinē, cōpicaturq; ut nō deformetur obtutus.

Ad album de oculo tollendum. Caput. xx.

SI casu aliquo aīal oculū impperit, aut cōfricauerit, uel ex percussura laferit & albū induxerit, etiā si totus oculus præclusus sit, tamen expi mētis hac ratione probatū est cito posse curari. Hederam colliges terre streum & in pila mundissima diutissime contundes, succum exprimes, ex hoc animal inunges: potestate medicaminis quicquid desperata, consumitur albugo. Sed si terrestrem hederam nō inueneris siue baccas hederæ siue folia contū des, & succum exprimes, & ex eo succo inunges. Si hoc quoq; difficile ui debitur, aut morosum, paululum aquæ frigidæ cū folijs hederæ diutissime cō tundes, succum exprimes, & per siphonem ei in oculum defundis. Quod cum per dies plurimos tam mane quā ad uesperam feceris, albū omne tol letur. Sed si uinū miseris optimum & recens efficacius curata sanat.

De suffusione curanda per nares. Cap. xxi.

ALiqui authores dixerunt, si dexter oculus suffusione suscepit, uel album incurrit, dexteram partem naris, si sinister sinistram dili genter inspiciet: in ipsa callositate narum foramina subtilissima in ueniet, quibus tenuis inferenda est fistula, per quam ille qui curare debet os plenum uino insufflet, ut merum per foramen illud penetret. Quo facto oculus incipiet lachrymare. Velocius autem proficiet, quia per interiores uenas meri uirtus ad oculum penetrat.

De diuersis passionibus oculorū. Cap. xxii.

IVmentum in oculo in osse percussam, si tumorem fecerit durum, callo sum, & ossilagini similem, hac ratione est curandum: Deiecto animali contra causam ipsam, cutem aperito, & ossis cisorio ginguulam, uel cartilaginē uel os quod ex se excrecere coeperit, cædito, ut de planes ad simi litudinē partis alterius. Si apte deplanaueris, aceto et oleo lineolis uel licinio ad dito, locum ipsum comples, & fasciabis. tertia die solues, & similiter cura bis p dies, s. donec feruor desinat. post traumatico uteris. Catastolico quoq; medicamēto libraturā cuius consumis, quam diu lymphidum uulnus curetur et adæquetur. Quod si ipsum os concarnari non potuerit tam diu cotidie era-

dicam.

dicato donec sanguinet atq; concarnet, ita ut medicamentū congruentia uul-
neri imponas. Quod si post sanitatem causa eadem crescere cœperit, pun-
ctus cauterio subtiliter urito. Oculorū epiphora infra oculū detractus sanguis
emendat, si usq; ad sanitatem melle optimo inungatur assidue. Preterea pro-
dest eidē passioni; myrræ pōdus denarij unius, crocodili stercoris semiuncīā,
salis armoniaci semiuncīā, sepiæ ossiū semiuncīā, mellis attici cyathos 2: ex
quibus omnibus tunsis atq; permixtis oculū perunges. Magnæ lippitudinī
adhibetur tale remedium: Murre trogloditis uncīā 1. thuris masculi, croci si-
culi, limpidis cipriæ, eris usti, añ uncias 2. teres simul, consparges & cernes,
aque cœlestis, & salerni uini, mellis attici adijcies quantū sufficit, in uase ui-
treo conles, & cum neceffe fuerit uteris. Si casu ciliū ruperit, fistulam dabis
& manū thuris cum ouo impones. Discutit cicatricem oculorū eiusmodi
compositio: Spicæ nardi uncīā semis, salis armoniaci uncias 3. catinīæ uncīā
semis, croci uncīā 1. piperis semiuncīā in puluerē conuertes & uteris. Albi
uitia deterget ista curatio: Sepiæ marinæ ossis rasi 3 decem, croci 3 duos, salis
armoniaci scrupulos 1. myrrhæ, crocodili stercoris scrupulos duos. Item,
album siue glaucomata emendat: uini amenij ueteris sextarij tres, gariofilī
sextarius, mellis uncīæ tres, quibus omnibus decoctis uteris. Album tollit
si ex humore uel percussura euenerit: Sandaricæ uncīā 2. ossis sepiæ combu-
sti uncīæ 4. piperis albi semiuncīā, salis armoniaci uncīæ 2. cum melle permi-
xtis. Cicatricibus oculorū medetur ieiuna saliuā, si cū sale mandatur in
ore, & expuatur in oculum. Sal quoq; tritū cū offe sepiæ, & sinapis agre-
stis semine. Collyrium nardinum; opopanacis scrupulos 2. uiolæ uncias 2.
spicæ nardi, cassiæ, marrubij añ semiuncīā, croci siculi uncīā semis, olei semis
unciam & scrupulos 4. piperis albi uncias sex, gummi scrupulos 5. Item
alia confectio collyrij: Eruginem eris & salē optimum æquis ponderibus
& aceti quantum sufficit musces. Necessaria compositio; rute scrupulos 4.
thuris masculi, stercoris columbini, murium, olei, croci, mellis, catinīæ, olei
rosati añ scrupulos 4. diligen-ter trita miscebis & uteris. Si uero oculus ictu
uulneris insanabilis redditur, & (ut Mulomedici dicunt) canchremata fece-
rint, ne periculum mortis incurrat, erui pollinem cum oleo roseo & ouo si-
mul immittito. Cū purgatum uulnus fuerit, cum melle attico inungito. Sunt
& alia multa collyria, quæ quia eandem uim, easdemq; species continēt, enu-
merare superfluum duximus.

ARTIS VETERINARIAE
De strumis iumentorum. Caput XXIII.

Plerumque strumæ, uel parotides, aut scrophule iumentorum guttur infestant, & faucium tumorem producunt. Nam & subrecto sunt capite, et tanquam ab stranguria præfocantur. Hos primum somētis calidis, et cataplasmate ex polline hordeaceo & resinæ uncijis tribus mero ualido coctis, curari expedit: & cū collectio fuerit maturata, scalpello secari opus est, & quicquid collectū fuerit emittere, et aceto, et sale, & oleo infusos lemniscos subijcere. cæteris quoque diebus traumatico, et medicamentis aptis sollester curare si uulnus pateat, dū sanetur. Nam in his locis ex præclusionione cito solet fistula fieri: quæ si euenerit, ut supra demonstratū est, papyro & collyrio poterit persanari.

Deglandulis. Caput XXIII.

Glandulæ quoque aialibus, et præcipue pullis, usque ad periculū interdū molestæ sunt, et in morbum transeunt aliquādo. quæ inter maxillas inferioresque fauces nascuntur, et ad similitudinē pillularū maiores, aliæ uero minores cōnexæ ex carne obdurescunt, et tumorem sine doloribus faciunt. Quæ inter initia perunctæ oleo, picula perfricari solent, uehementiusque manibus corrumpi, et ita uelut uanescedo sanari. Quod si excreuerint amplius, deiecto animali, ita ut per mediū secentur scalpello subtiliter cū radicibus eximuntur, ne aliqua uena tangatur. Quo facto, aceto & oleo cū sale, medicamentisque superius declaratis sananda sunt uulnera. Plerique urenda dixerunt. Sed si parue sint prodest, cæterum maiores execandæ sunt ferro.

Depullaribus. Caput XXV.

Dum caput pullorum calefecerit prima dentitio, inter gingiuas atque maxillas tumor, collectioque generatur, quæ pullaria uocatur. Cuius passionis tanta tensura est, ut māducare uix possint. Sed cataplasmatibus studiosissime maturanda sunt, deinde scalpello aperienda, post sale et aceto & oleo curanda. Plerique etiā, cū ferro exemptæ fuerint glādulæ, propter sanguinis fluxum loca uri debere præcipiunt, post sale & oleo octo diebus utuntur, nec non ex nitro et aqua calida diluunt. Si nitri inopia est, lotio calido aut lixiuio utuntur. Deinde uinum & oleum & farinā de eruo imponunt per triiduum, consequenter de uino ac oleo, & farina hordeacea, et melle percurant. Addentes, quæcumque plaga fuerit aut strumæ uel parotidis, glādulæ, quæ tolluntur.

luntur licio medicamento, uulnera percurari ita, ut de mali granati sicci pulvis aspersus, celeriter adferat sanitatem.

De fistula maxillæ, Vel de conficiendo collyrio
fistulari. Caput .XXVI.

SI ex aliqua huiusmodi curatione iumentū fistulam in ore fecerit, hac ratione curabitur: papyrum injicies in fistulam, ut pars eius in ore extet, quam lino diligenter ligabis ne possit elabi; pars uero foris exeat, quæ nihilominus constringenda est lino ne cadat, triduo permaneat, quarta die papyrum eximes, Collyriumq; ad longitudinem & cauituram uulneris ad arctum fistulæ subijcies, & ne forte labatur, fasciabis locum, ita ut ad māducandū possit maxillas agitare: tertio die solves. Si fistula ceciderit, diebus septem unguento traumatico curabis. deinde collyrium ex melle & erui polline decoctum subijcies ad plenitudinem foraminis diebus plurimis. Ad ultimum, anapleroticum ipsi uulneri medicamen imponis, donec omnis plaga, ducta cicatrice, solidetur. Fistulare aut collyriū hac ratione conficies: anisi uncia 1. ferule uncia 1. æruginis æris uncia 1. battituræ calcetis uncia 1. cimini semis uncia 1. teres cū aceto acerrimo, et secundū qualitatem uulnerū, cū usus exegerit, collyria formabis.

De expositione fistulari. Caput .XXVII.

Fistule nascuntur, quoties neruus, aut cartilago, aut os negligentia uel impitia curantis, ex plaga alicuius tabido humore uiciatur. Tūc enim quæ commeauerit ad instar cuniculi carnem indurat & incallat, & fit fistula, quæ nulla ratione sanari potest, nec aliquando coire, nec solidari, nisi penitus eximatur. Huius à diuersis autoribus tradita est diuersa curatio. Alij enim scalpello ressecari & apiri iubēt, et stringotomio decarnari, medicamentisq; acerrimis cōsumi, et sic postmodū uulnus ad cicatricē coire. Quod cū laboris ac discriminis habeat plurimū, minus tamē prodest. Alij uero cauterio omnē fistulam inurendā, uicinasq; partes eius punctis feruentibus præripendas esse duxerūt, quatinus per ignē callositate submota, astalticis medicamentis uulnera pcurētur. Sed melius est fistulā, sicut supius declaratū est, papyri iniectiōe curare. quia neq; neruus, neq; uena, neq; cōmissura uexatur. Nā scalpello uel cauterio sæpe fit causa deterior, et piculū creat. Collyriū uero omnem

ARTIS VETERINARIAE

omne callositatē fistulæ de alto à radice eius eximit. Quod si os fuerit uexatum quod oporteat radi patens uulnus, per medicamenti curam nō potest impedi. Si uero in alto tabes aliqua uel nervus aut cartilago remanserit, ex eodē collyrio puluerem facies, & frequenter iniicies. Omnia enim uulnera elympidat atq; per sanat.

De tumore faucium uel capitis. Cap. XXVIII.

Interdum ad similitudinem synanches animalibus fauces & caput intus intumescunt, adeo ut bibere aut manducare non possint. Cuius totum & os & lingua, aqua calida fomentatur, & taurino felle perlinitur. Potio autem datur huiusmodi ad cornu: olei ueteris libras 1. uini sextariū 1. cōmīscēs quōq; nouē caricas cū nouē capitibus porrorum, decoques, & diligentissime conteres, & in aqua ipsa nitrum alexandrinū triū quantum sufficit mīscēs, & ex his omnibus potionem mane & ad uesperum heminas singulas dabis, ut tumoris ipsius relaxetur ac mitigetur asperitas. Manducet autem herbam uiridem, aut qđ melius est pascatur. Quæ si defuerint, sariānam de hordeo facies, cui nitrū admiscebis, & sic apponis. Fœnū quoq; molissimum eliges: quod nihilominus nitro & aqua cōsparges, sanguinem non detrahas nisi forte de palato, desumpes, cum cœperit conualescere, nitrum tunsū & cribratū, pulueres de radicibus cucumeris asinini syluatici cōmīscēs & uini sextariū, coctearia pulueris ipsius iunge, ut huius potionis ui resolutio uentre purgetur. Alij authores tumorem capitis ac lingue uel faucium, cū si obdurauerit, ita festinantes propter periculum curare nituntur: lapides molares plures igne succendunt, cum candere cœperint, caput equi coopertunt, & uas plenum lotio sub ore & naribus supponunt, & per uiares singulos candentes lapides in lotium immittunt, ut ille uapor ac fumus à calore lapidum concitatus, os equi & nares impleat, et suste transversum, ut apertum os habeat debet accipere. Quod cum diutissime feceris, aquam marinā calefacito, uel certe salem in aqua dulci mīscēbis, fouendq; dissoluis, addito aceto acerrimo, caput eius & os & ginguas diutissime confricabis. Postea sinū bubulinū cum acri aceto mīscēbis, & tepē facies, ex quo caput totum frōnemq; & labia perunges. tunc farinā hordeaceā cum aqua tepida sufficiens pro cibo dabis & potu.

Si ex ple

Si expletura sanguinis fauces tument. Cap. XXIX.

Quod si ex sanguine tumor ille indignationis euerit, ita intelliges, si uenis tēsis obturabitur balitus, et oculi sanguinei apparebūt, cui de *als auditus.* temporibus si non tument, aut certe de palato si ibi indignatio nō erit, sanguinem oportet auferri. cretam cimoliam duabus partibus et tertiam partē cretę nigre, ex uino austro tēperabis, et dū calet illinis caput.

De intomatīs. i. de Tuberibus. Cap. XXX.

Sciendum est autem tubera in corporibus iumentis frequenter excrescere, quę greci intomata uocāt. horū uarię q̄litates et diuersa sunt nōia. Stechatoma est tuber qđ in se adipem uel pinguedinē cōtinēt. Meliceris est tuber in quo caro inspissata, quo modo in uerrucis inuenitur. Aneutrisma est tuber in quo sanguis cōspiratus ueris uenę similis inuenitur. Actero ma est tuber in quo farinosa cōgeries repitur. Ganglion est tuber quod fit ex duplicatione nerui, similis tubero cum dolore immobili. Horum omnium una est curatio. Iumentum colligatum deponitur, et contra locum causę sagitta aut scalpello in longum dextra ac sinistra pro mensura tumoris aperitur, ita ut media fasciola cutis, quę supra tuberū est, intacta permaneat. Post egestis uel eueris omnibus quę tumorem mouerant, medicamentis cōpetentibus, ea quę supra declarata sunt, producit ad cicatricem.

De lingua incisa. Caput. XXXI.

Si iumento lingua fuerit incisa, statim cum fibulis consueto, dein de uino lauato, post gallam tundito et puluerem cernito, ex eo imponis donec sanetur: cui dabis fœnum molliissimum concisum, et pro hordeo sursum res. Alij postq̄ fibulas acceperint linguaq; uino fuerit elota, mel imponendum esse duxerunt, ut plagam purget et curet. Ad ultimum ex malo granato puluerem iniecerunt.

De gingiuis & dentibus. Cap. XXXII.

Si iumento loculamenta dentium. i. gingue uel dentes doluerint, hijs agnoscitur signis: hoc deum solidum glutiet, macescit, salinarum plurimum effundit, gingue intumescunt. Cretam cimoliam cum aceto acer

ARTIS VETERINARIAE

rinito macerato, & calentem extrinsecus maxillis inducito, ne minus quinque diebus: gingivas autem interius cum pulvere corticis malignanati, & melle tertia die diutissime confricato donec egesta sanie conualescat. Quod euenit, eum humor acrior ex capite, in maxillarum defluxerit uenas.

De osse fracto. Caput .XXXIII.

Quod si animal iuxta collum uel molares, uel alio oris loco os freg-
rit, ut morsum claudere non possit, et apertiis dentibus horreat pro-
pendentibus labris, continuo calida fomentabis, & labrum & qua-
sunt disrumpa componis, fasciola tenuissima aceto & oleo madefacta diligen-
ter unam partē, deinde alteram cōpingas ad locū, & silitur fasciato, ne iterū
dissipetur: Cui & t̄corbem cōstrictam oportet imponi, ne deprauet dentes
& labia. Cum solueris ad curandum, manu quae ante composueris contineto,
sursurem & farinam hordei mixta in cophino ad manducandum dabis, ita
ut quamdiu manducat, manus tua à loco quem continet non recedat. Cum
iam manducare noluerit, offero ei aquam ut bibat. Cum biberit curato simi-
liter, ut supra scriptum est. cui et succum ptisanæ conuenit dari, si minus for-
tasse manducauerit. Quem tali obseruatione per dies quadraginta curatum
restitues sanitati.

De cartilagine narium si sanguis fluat. Ca. XXXIII.

Imento narium cartilago si corrupta sit, & sanguis reprimi non possit,
spongiam asram & thuris masculi pollinem commixtum impone ad lo-
cum qui latus est, et si uulnus factum fuerit in cartilagine, hac ratione
curato. Interdum animal despumatum remissus semel de palato sanguis nō
potest reprimi, propter quam necessitatem, sicut superscriptum est, in loco
in quo sagitta ruptum est palatum, spongiam imponis, caput quae eius sur-
sum constringe, & aqua frigida renes cerebrumq; testiculosq; perfundis.
Quae res si tardius subuenit acatiam nigram & thuris pollinem aquis pon-
deribus ex aceto acerrimo temperabis, totumq; caput illinies, donec sanguis
ipsa constrictione claudatur.

De palato, si uena se nō clauserit. Ca. XXXV.

Mature piculū creat cū incisa uena claudi nō potest in palato, sed cō-
tinuo sanguis fluxus inhibetur, si aut candēti cauterio fuerit meat-
us ille cō-

tus ille cōbustus, & suspēsum altius caput. Cū per nares sanguis defluit, nec potest aliter retineri, coriandrū uiridē sufficienter tundes, succumq; eius expressū, substricto equo, naribus infundes, frigore naturali uenas p̄tinus claudis: chartā etiā et lanā cōbures, ipsumq; puluerē p̄ fistulā insufflabis naribus

De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt. Caput. XXXVI.

Mucorum etiā qualitates, qui per nares effluūt, conuenit nosse, ex quibus genus passionis ostenditur, & causa cognita facilius curari potest. Mucus lymphidus cotidianus est, & nisi minus fuerit, non debet esse suspectus. Crassius autem & candidus à cerebro defluit, & admonet ad medelam capitis festinandum. Rubens, tenuis, frigidus, ueteris perfrictionis prodiit iniuriam. Propter quod theriacis potionibus calefieri animal oportet. Cœruleus. i. fuscus leuis ab interioribus uenit, q̄ indicat febrē. et ideo conueniēs leptiperisis. i. piretran adhibenda curatio est. Crassus autem, spumosus, & pallidus, à pulmonibus nascitur, qui suspitiosos ostendit: quibus difficile, nisi festinatum fuerit, subuenitur. Fabaceus uero à glandulis serpit, quæ celeriter aut eximēdæ sunt, aut ferro curandæ, ne cōuertātur in morbū.

De cuserino. i. cum post cursum sanguis de naribus fluit. Caput. XXXVII.

Sæpe sine ictu uulneris animalibus per nares sanguis fluit. quod uitii cuserion uocant, quod præcipue contingit, si equus ultra uires agatur ad cursum: omni corpore oleo & aceto perungendum est animal, ac loco tepido statuendum, cooperiendum etiā diligenter, dandaq; opera ut mollior cubet, nec ad deambulādum cogatur, sed cibo diligentius reparetur. tunc erucæ unciam i. cum lacte cōteres & per cornu naribus infundes. Quod si eruca defuerit, aristologæ unciam i, croci semiuunciam cū uino dulci conterito, & deiscito per nares. Similiter coriandri uiridis succum exprimes & naribus infundes.

Depolypo. Caput. XXXVIII.

Si polypus oritur in naribus, præcluso spiramine strāgulabitur stertet. Humidi profluēt muci, picula passiōis plurima, hæc medicina subuenit. Si prope polypus fuerit, acutissimo excabitur ferramēto. Curādū his

ARTIS VETERINARIÆ

rebus quibus circuncisa sanatur. Si uero altius fuerit, cauteriū plumbeū quadratū facies, ex quo calefacto polypū frequēter inures, & sic polypū sanas.

De siderato. Caput .XXXIX.

Iumentum si fuerit sideratū, his agnoscitur signis: Labia eius & maxilla nec non etiam nares eius deprauatur in parte, ita ut uix cibaria dentibus inlidat. Quæ etiam humoribus plena reperies, & cum uoluerit bibere, os usq; ad nares demerget in aquam; quia infirma sunt labia, quibus haustus attrahitur: aceto & sale lingua eius & labia diutissime perfricantur, donec sanguis emanat. Tertia die causticum crudū in illa parte labij imponis, quæ sentit iniuriam, cū cautela, ut prius alliges linguā, ne medicamentū uolentia noceat. Cum medicamento labia perusta uideris, aqua lauabis, deinde aceto & oleo fouebis, sicut alia uulnera, & hac ratione curabitur. Si uero maxillā sideratam habuerit & tortam, hæc est cura: De temporibus partis ipsius sanguinem detrahis, simum bubulum acerrimo aceto permiscebis, & diutissimo decoques, & parti temporum ex qua sanguinem extraxeris, calidū inducis sæpius, ut exiccetur & curet, hac usus potione: Trixagnem, hyssopum syluaticum, origanum, serpillum, aristologiam, mannam croci pro æquis ponderibus cōtundito atq; cribrato, ex quo puluere plenum cochleare cū aqua mulsa oleo & uino per narem sinistram ad unam heminā quotidie oportet infundi.

De obseruatione flebotomi. Caput .XL.

Conuēnit de ceruicis curatione dicturo, obseruationem indicare flebotomi; quia circa ea loca frequēter operatur. Detrahturus sanguinem animal à cibo abstinebis & potu, æquali loco constitues, tunc locū supra ceruicem alius teneat et adstringat ad normā, ut uena facilius appareat. Deinde supra laqueū de sinistra manus pollice uenā deprimas, ne ludat, tum sagitta tangas. Dux autem uenæ à capite summo descendunt, & conueniūt se sub maxillis usq; ad gulam, inde à geminis uenis inferius quatuor digitis, feramentum deprimis, ne in gulam mittas, & bifurcum tangas, & iumentū occidas. Statim sagittam duobus digitis tenebis, nec plus ferri imprimas, quàm extra digitos eminebat. Nihilominus etiam mediano digito manū tuā moderatō suspende, ut sit leuior, ne uehementius imprimas quàm oportet. quia nō plus debet quàm mucro descendere. Si parum apte profuat sanguis, iumentū

faciunt

scenum dabis, aut aliquid quod manducet. Agitatione maxillarum plus sanguinis uena profluat.

De ceruicibus. Caput .XLI.

Si iumentum ceruicem eiecerit, aut laxauerit, aut certe uertibulas eiecerit, uel extorserit, hac ratione curabitur: Deponito iumentū atq; constringito, & ceruicem eius extendito supra fossam, donec omnia uertibula laxentur. Post oleum uetus & axungiam ueterem tunsam colatāq; permisces, & cum calefacto eodem unguento ceruicem diligenter infundis, in locū reponis, & fasciā tenuem & amplam ex oleo tepido & uino madefactā alligabis ad corpus. Lanas quoq; succidas ex oleo & uino infusas supra conuerteres, post regula soleaguijs nō minus quatuor digitis, ita ut tantum spaciū sit inter regulas alligatas & cōnexas, & lino constringes. Et si aestas fuerit quater in die suffundis; si hyems, bis. Cum modum fecerit, regulas solues. hoc die quinquagesimo & primo, post unctionibus uteris, donec ad sanitatē perducas. Si tardius confirmabit uires, regulatim & solenniter uisā curabis.

De malandria. i. de uulneribus ceruicis. Ca. XLII.

Si iumento malandria de ceruice auferre uolueris, ita facies: Candentia prius cauteria preparabis, deinde ferramento decarnabis, sic, ne nervos tangas, & uenulas quasunque uideris emittere sanguinem, aduris. ut possit cruoris fluxus inhiberi. Caue autem ne cauterijs plus aduras, et indignatione nervorum periculū facias. Post axungia ueteri ceruicem perfricabis, & fascia munies. Sequenti quoque die cataplasma imponere incipies, ablatāq; († ferunta) lotio calido fouebis, deinde aceto & oleo dilues, & medicamentis aptis curabis. Si iam uideris cicatricem pilos renouare, puluerem ex canino capite combusto, & adipem suillum recentem permisces, & inducis; ex quo medicamento & sanitas consequitur, & pilorum redit ornatus.

De distillatione ceruicis. Caput .XLIII.

Si ceruix distillationē patiat, tumidior uidebitur quā oportet, fontem habebit canceraticum cum humore nigro & liquido. Cuius foramina scrutaberis diligenter, ne ulterius inter nervos aut armoressum distillationem fecerit. Quod si acciderit, pauca hinc difficulter euadunt.

ARTIS VETERINARIAE

nam his signis discriminē ostenditur: stridet de pectore, & per nares humorē liquidū proijcit. hac ratione curabis. Foramina de super marrubio et sale pariter confuso implebis, atq; calcabis, subter autē cataplasmate apposito laxabis. Et si loci cōditio patietur, dieresim dabis ut foras per plagas humor emanet. tertio quoq; die calida urina lauabis. deinde traumatico & pannis lineis lymphida & purata iā uulnera sanare incipies, Cuius cōpositio talis est: erui pollinis sextarium, irisillyricæ uncias 2. thuris masculi uncias 2. miscebis, & facies cephalicum medicamentum, quo uteris ad consumptionem medelæ.

De dissolutione scapularum. Caput. XLIII.

Quod si iumētō scapulae fuerint dissolutæ, diligētē inspicias, ne quas inter nervos & cōmissuras pendignes faciat, quod si inueneris quācūq; parte plagas accipere poterit, cataplasmatibus mollire, & scalpello uel cauterio aperire curabis, ut sanies illa atq; collectio defluat. Foraminibus autē traumaticū & linteola sicca dabis. Si quod inter nervos foramē factū fuerit cautissime curato, ne ulterius aut ferrū aut cauteriū procedat, neq; putorem neq; putredinem lauis, sed magis siccis omnibus curare festina. Nā omnis humor distillationi præstat augmentū, Quum incisa uel uista duxerint cicatricem, pro confirmatione in ultimo causticum imponitur.

De armislæsis. Caput .XLV.

Si armus læsus erit, in medio crure utræq; soluētur uenæ, et puluerē thuris cum eo qui profluat sanguine copiosissime immisto armi lineantur. Quod si plus profluat q̄ necesse sit, stercus ipsius iumētī fluētibus imponitur uenis & fascijs alligatur. Postero quoq; die quasi apospesis fit, & ex eisdē locis sanguis detrahitur, atq; similis in omnibus cura procedit, Ab hordeo abstinebitur, fœno sustentabitur exiguo per triduum. deinde porri tres pyathos olei heminā miscebis, & per cornu faucibus infundes. Post sextum diem lente ingredi cogatur, & cum ambulauerit, mittatur in piscinam uel flumen aut mare ut natet, cum sparcia & pannis uincto pede, postea firmioribus cibis ad saginam pristinam reuocādus. Si leuiter dolebit, uino & oleo tepesfacto perfricetur in sole: si ualidius dolebit uentum in armū mittito, atq; pertundito à summa iuba infra digitos octo, ne cartilagnem tangas. Et cū inflaueris, ferula uel uirga molli armum cedio, sale & oleo perfricato. ipso die postre-

die postero stracta uteris; cuius hæc erit compositio: simile sextarios duos, si defuerint pollinis triiicei sextarios duos, cum aceto acri & cum tribus ouis miscebis: sed ouorū solū albū mittes; adijcies etiā pulueris thuris unciā semis. Quæ omnia manu subigis, & in armos inducis, & per dies multos armum aqua calida cū flore fecni fouebis diligenter, ut mollescat, stractam quotidie imposito, de uino puro armum lauato, Ad daturus unguentum: baccas lauri selibrā, olei sextariū, uini boni sextariū, nitri uncias 3, sed nitrū et baccas lauri in puluerē rediges, & cribrabis. Ex quo in sole, cū calida armus fomentatus fuerit, inungatur ex tepido, & diutissime confricetur. Post syncrisma ad curandos armos inducitur, & cum melius habuerit natatum mittito. Quod si eiecerit iuxta consuetudinem ad rotam armum reponito, & supra scriptis medicamentis curato. Si non senserit, ultimum est ut uratur. Armi doloris hæc sunt signa: pedem priorem tantum quasi rigidum a foris extrahit (sed conuenit inspicere diligenter utrum ex percussura uel casu coeperit eā) & si ex iectura fuerit, prius locis suis reponenda sunt membra, & sic reliqua facienda. Quod si ex humore uel sanguine armus grauabuntur, sanguinem emittis à pectore uel unctionibus uteris.

Degenuemotouelbasi. Caput .XLVI.

Genu uel basim si semouerit ad tormētum rotæ uel macine, locis suis eiecta restitues, lanam succidam ex oleo & aceto infusam imponis, et alligabis ex more, tertio die solues fomentabisq; , post resinam induces & piculam, ad ultimum malagma uteris aut caustico.

De fractura articuli, cruris, uel coxæ. Cap. XLVII.

Impulsu axium uel rotarū in circo uel in alijs locis uarietate casuum ammalibus crura franguntur, aut coxæ uel articuli, in qua necessitate si extracutē fractura ossis erupit, hoc est, si exbercen fecerit, difficile noueris et prope insanabile curā. Similis desperatio est, si coxam fregerit, aut tatrocoera, aut supra gambam, insanabilis est casus, quia non recipit ligaturam. Si uero fractura sit sine uulnere in his locis, quæ constringi possunt, hac ratione curabis: Primo fracturam recompones, & fascies, mundis scissilibus infusis ex uino & oleo conligabis, in super lanarū munimenta coniunges et regulas circumduces, lumentū aut in cauterio uel in scalis uel in suspensoloco, ut

als. tatrocola.

alis ne fractu loco, ut fractura uelut leuiter commolet, cui quotidie mane & ad uesperam
 ra sicbilitat. suffundes, tertio die solues, & expleta curatione ligabis. Quinto quoq; vi.
 aut ix. die eadem facies, donec corpus inducat. Post hæc adijcies muscum de
 uilice, aut salicis radicem, & oua cruda quinq; uerum non regulis, ut prius,
 sed circumductis ferulis alligabis. die tertio solues & fomentabis, de resina &
 axungia perunges: ubi cura profecerit, malagma uel causticum inducis, non
 ante tamen permittis stare iumentum quàm dies quadraginta prætereant.
 hoc autem tempus est quo diuulsa uel fracta solidantur.

De flegmone, marmore, siue mallonibus. Cap. XLVIII.

PLEXUS in genibus, uel articulis aut phlegmon oritur, aut marmora,
 aut mallones. Quæ uitia ex malo humore generantur, & passionem
 cum deformitate tumoris ostendunt, Sed ista distantia est, quod phle-
 gmon tuber est molle, marmor duriciam ostendit ex nomine, mallo inflatus tu-
 ber est sine dolore, quibus recentibus potest facilius subueniri. Primo lanam
 succidam ex oleo & aceto induces, contra aquam frigidam & currentem
 animal constitues, Post sine ferro hac ratione curabis: Sinapis & salis ale-
 xandrinis 3. aceti cyathos 2. axungie ueteris selibram, simul conteres & in-
 duces, post diem tertium soluis. Si aperturam fecerit, spongiam cum aceto &
 lasere imponis, uulnera stiptico curabis. Preterea locum, quem curare uolu-
 eris, inducto pilotro decaluas, Radicem filicis & eruum & ficus aphros
 contundes in pila & induces in panno, per triduum ligatum patieris mane-
 re. Alij radicem filicis & eruum cum axungia ueteri & aceto acerrimo pu-
 tant oportere misceri. Item cineris quoq; de foco uncias 3. calcis uiuæ un-
 cias 6. uino subigito ad crassitudinem oximellis, & anteq̃ obdurescant, tu-
 bercula obline. Quod si assidue in recenti feceris, passionis molestia siccabitur.
 Si uetustiora sint, punctis subtiliter inurantur, ne ui & igne uiciantur.
 Talis quoq; cōpositio spargere phlegmon asseritur. Rhododanes uncias 3.
 bituminis, nitri ass. uncias 3. axungie ueteris colatæ uncias 3. pleriq; dixe-
 runt cauteria cuprino candenti duobus punctis debere prærumpi, & phle-
 gmon effundi, licineo quoq; intorto cū axungia, & aceto, & oleo loca, de qui-
 bus muscus eiectus fuerit, satiare: per foramina etiam uestionis lemniscū trahi
 debere, ut quicquid humoris est, egeratur. Post hæc cataplasma et scœnugræ

to & uino confectum inducis, cū uista ceciderint & tumor resederit, lemniscum eximis, traumatico curabis, ad ultimum causticum inducis. Alij sagitta pertuso corio phlegmon effundunt, & lanā madidā cū aceto et lasare plagis inserūt, sic spongiā cum pulſca acri & lasare supra uulnus imponūt: tertia die solluunt, lanam eximunt, & tetrapharmaco curant quinq; diebus uel septem. Si uero marmor habuerit, ex quo ualidius claudicet, & uix flectat articulos, inurēdus est leuiter. Cui post feruntam malagma, quæ cupressina appellatur, oportet imponi. Ex qua curatione sanitas redditur, & deformitas permanet. Si autem mallon in genibus uel articulis excreuerit, continuo curam adhiberi oportet, ne neglecta passione deformitatem tumor augeat, uel obduratione diuturna conuertatur in marmor. Aperies in pedibus siue genibus dextra ac sinistra uel ferro uel cauterio cuprino, sicut superius declaratū est, lemniscum traiecies cum aceto, et sale, & oleo, ut supra, cataplasma imponis, donec feruor desinat et saniem faciat. Post purgatis uitijs lemniscos eximis, et traumaticū imponis, et ternis diebus interpositis solues, et medicamentum renouabis, donec sanetur.

De aquatilibus & ozœnis. Cap. XLIX.

SI aquatilia in articulis uel in gambis fuerint, frigido ferro oīno nō sunt tangenda, ne abundantia humoris iumento discrimen importet. Sed utēdum est scarificatione subtili, et detractione sanguinis, post quæ lauis ualidissimis, tam cum aceto quā cum optimo sale tunso, et oleo, uel axungia, per dies quinq; conliganda sunt loca. Si tardius hæc cura profecerit, utendū est feruentissimo caustico ut faciat ustiones. Alia quoq; ratione sanatur, si flectam qua trictores utuntur, et salem pro dimidia parte commisceas, lanamq; succidam ex aceto alliges, post diem tertium soluturus. Si aperturam fecerit farinam hordeaceam ex melle coctam cum lini semine & fœnigræco inducis, ad ultimum malagma crudum impones. Præterea atramentum sutoriū, gallulas minutas, & alumen æquis ponderibus tunsum cum axungia miscabis, addito puluere mali granati, nutro, & aceto: quæ in commune decocta, uitium si adiungatur emendat. ficus sicca cum sinapi cōtusa mixto aceto imponuntur. Post diem tertium soluto medicamento, si tardius profecerit, eadem cura renouatur. Cum melius habere cœperit, alliccem impone articulis. Alij opoponacem cum farina hordeacea coctum in modum cataplasma-

tis imponunt. Nonnulli sabam fractam in aqua decoquunt, & mixto melle deterunt, & in panno inducentes curant. Ad ultimum malagma cupressinum imponunt. Plures calcem uiuam & cineres ex melle & uino commiscēt, et ozœnis frequenter imponūt. Ad ultimū caustico utūtur. Quæ genera curarū et posterioribus pedibus adhibēda ueterū censet auctoritas, usus inuenit, addito sale et aceto cilicij ozœnas defricare, donec cruor aut tumor emanet. Quæ obseruatio etiā si nō persanauerit, sequētes tamē adiuvat curas.

De pedibus reumaticis siue uentosis. Cap. L.

Interdum reumatici iumentorum, interdum uentosi sunt pedes: quæ uitia nunq̃ tangenda sunt ferro, sed exiccanda per malagmas uel causticum, et aliquando urenda leuiter per uenas, ut cauterij meatus, qui humorem suscipiūt angustentur, et cōstringantur, ut pro tēpore asserant medicinā. Quid in totū, etiā si intercise & adustæ sunt uenæ, nō poterit talis causa sanari.

De impetiginibus. Caput .LI.

Impetignes quoque in articulis uel genibus inter nervos commissuralibus locus aliquando nascuntur, & sit uulnus simile ragadio, & non facile sanatur, nisi staticis uel stipticis rebus, non sine alligatura, uel interdum adustione curetur. Malagmas quoq; conuenientes oportet imponi.

De uligine. i. dulcedine. Caput .LII.

Vligines etiā in pedibus, cruribus, unguibusq; uel sub armis aliquando generantur, quas quidam dulcedines uocant, habent similitudinem scabiei. Quæ cum se diffuderint, pedes exulcerant ad similitudinem lepræ, & urgente prurigine animalia sibi partes illas corrodunt uel alternis pedibus confricando uulnerant. Quod uitium à crudo uel putrido humore consueuit generari, & idem curatur detractione sanguinis, unctionibus, & purgationibus uentris, si radix cucumeris syluatici cum nitri puluere miscetur infusa per fauces, humores pessimos purgat.

Depodagra iumentorum. Caput .LIII.

Podagra uero nonnunq̃ solet occupare iumenta, cum hominum uitium transit in pecudes: cuius passionis hæc sunt signa: nec stare potest nec abulare, sed si cogatur, claudicat, & sepe se projiciet, sicut indigesta ex hordeo

hordeo animalia faciunt, quæ propter dolorem non coquunt cibum, & ideo fit horridum, & corpus eius calebit, uenæ etiam extabunt, natura submissa erit, in pedibus sterco hærebit propter nimium eorum calorem, sicut subtritis solet euenire: cui proderit si non smatur accubere, sed minutim deambulare & loco sicco, donec sudet, multorum manibus confricandum est, ut uehementius sudet, sanguinem ei detrahes à capite à superioribus uenis, sed non multum: sequenti die de posterioribus locis detrahes supra talos. tertio de gambis uel de sub ipsis dolorum locis. Memineris semper parum oportere detrahere. Aquam calidam dabis in potu, in qua adijcies puluerem nitri, & triticam farinam, pollinem quoque thuris acetabulum plenum in uino maceratum infundis, & triduo per nares singulas cotylas: betas etiam excoques & aquam earum ad tres cyathos suffundes, & exercebis eum singulis diebus, uentrem quoque eidem expurgabis ut auferatur humor pessimus, qui descendit in uenas. Hoc genus purgationis adhibet is: thimi acetabulum plenum in uino ueteri dulci macerabis, ei singulas cotylas per nares eidem infundis, scenum uiride adponis. Quod si defuerit, siccum nitro aspersum dabis. Si nihil profecerit, castretur, & uitio carebit. nam podagra raro uexat eunuchos.

De orthocolis siue stillosis. Caput. LIII.

O orthocola etiam iumeta uel stillosa dicuntur, quæ contractione neruorum patiuntur in pedibus, & de capitibus ungularum calcant, & sunt rigidi articuli, plenas ungulas in terram ponere non possunt. Quod uitium nascitur ex enormitate onerum & labore confragosarum uiarum. sed hac ratione curantur: sanguinem ei de subcirro uel de coronis detrahes, ungulas bene compones, pollinem ex hordeo & resina cum axungia decoques, & ter in die perunges: tepida quoque in qua uerbena decocta fuerit, confouebis, et tota eius crura acopo perfricabis. Post dies quique cataplasmas eis ex poline hordei & lini semine & fenigraeco aquis pabulis ex uino decoctis: cataplasma imponis in omnibus cruribus ante acopo perunctis ab auriculis usque ad genua: quæ loca lanis succidis munies & fasciabis, & ter in die paulatim incedere facies. Si hoc non profecerit malagma hæc auriculis eius imponis: armeniaci, galbani, opoponacis, medullæ ceruinæ lib. 2. resinæ terbinthinae uncias 2. apocimatis librā, resinæ frixæ librā. oleum uetus quod sufficiat, lento igne decoques et colabis, impones in alutam per dies plurimos omnibus pedibus, donec sani sunt. Sed necessar

necessaria festinatio est, quia sic solēt remanere si tardius cura praestitur. Alij uero urēdos censent paulatim in articulis, sed raro etiā praestitit medicina.

De pedibus & ungulis. Caput .L V.

A Nimalium ungulae asperitate ac longitudine itinerum deteruntur et impediunt incessum. Ex tortura quoque, si in aspero uel lapidoso itinere iumenta coguntur ad cursum indignationes oriuntur. Postremo etiā si nulla causa praecesserit, ociosa in stabulis ex collectione humorum incipiunt claudicare. Oportet autem solum ungulae celeriter aperiri, ut per inferiores partes apostema digeratur, ne eruptionem super cronulas faciat, & difficile ac tardius cura procedat. Cuius haec sunt signa: Pedem priorem planum ponet, quod si suspēdere uideris gressum, ut diligentius intelligas causam, ungulam subradis, & locum quem uideris nigriorem, digito pulsabis, si cesserit in dolore et maturum fuerit, aperies, & saniem emittis, pendiginem circuncides ad uiuum, ex oleo roseo, et aceto et sale cum stercore ipsius linteola imponis, animal calciabis, tertio die soluis, si caro excrescit gramen decoques cum oleo et impones. Si uideris carnem ipsam nigrescere, inspicies ne aliquam fracturam habeat, neque clawum aut lapidem acutum, aut spinam propter quod fomenti & resina utaris, ut possit educi. Cum purum uideris uulnus, traumaticum impone. Post quod adijcies fuliginem siccam. Cum autem compleueris curam, resinam remissam et sulphur imposito. Quod si adhuc in alto apostema fuerit, hordeum uel fabam in aqua decoques, et ex inde fomentabis, ut exinde ad maturitatem possit adduci. Subtrito pedes fomentabis aqua calida, axungiaque ueteri perunges. deinde testa candēti decoquis, oleo post & sulphure pariter cōtrito lana candente leuiter ures per tri dium. Si uero contuderit, sanguinem de corona emittes, & calida fomentabis, axungia ueteri perunges, ouinum quoque sterus cum aceto permiscebis, & imponis: quamuis alij caprinum efficacius credant.

Si pulmunculum ad aperturā fecerit. Cap. LVI.

S i iumentum ad aperturā pulmunculum fecerit, scias totum solum, hoc est assem, hac ratione tollendū: ungulam subradis, deinde inter commissuram calcis & assis in circūitu incidis, subleuabis a parte priorae & solum calcis retrouersus expelles, ubicunq; pulmunculus fuerit, radis ad uiuum, & adijcies

Et adijcies lanamentum ex oleo, et aceto, et sale, et stercore ipsius imponas et calceas, tertia die soluis et tollis post hoc fomentabis: farinam hordeaceam resinā, et acetū decoques, per triduum impones; hoc enim medicamento etiam fracturam curabis, si frequenter apponas. post etiā traumaticum cum liniamento impone, et cum corpus fecerit, coriū malignanati et bitumen iudaicū ex aceto decoques et impones triduo, et cum solueris iterū impone, donec obdurescat in cornu.

Si exungulauerit iumentum, & si suffusionem pedum patiatur. Caput .LVII.

Si exungulauerit iumentum cura difficilis, sed profutura si non egebit industria, papyrum cadelarum purgatam, subtiliter carpis, intingis in oui crudi albumento circa nudatum pedem in circuitum pones, panno et fasciolo superligabis, post diem tertium soluis, fomentabis farinam frumentacea, resina, aceto et melle pariter decoctis, interdum, lumentum pro farina mittis. Si vulnus non erit purum, uino tepido lauabis, liniamenta cum melle impone; cum purgauerit traumatico uteris. Cum autem duxerit cicatricem corium fabae cum pelle ceruina cumbures, ex melle temperabis, addito puluere bituminis iudaici et malignanati, cum aceto: alternis diebus medicamentum renouabis, donec cornu ungulam faciat. Ad ultimum sparciam ueterem contundes, ex aceto in olla noua decoques, ex quo ungulam obdurescentē obuolues, et ad plenā reuocas sanitatem. Si suffusiones pedes patiatur, ficus siccas cum sale pro æqua parte contonde et ungulis impone.

De pedibus attritis siue mollibus. Cap. LVIII.

Animalibus exiguae ungulae crescunt, uel attritae reparantur, si alij capita 7. Ruti manipulos 3. aluminis tumsi et cribrati uncias 7. ax ungulae ueteris pondera 2. stercoreis asinini plenam manum commisceas ac decoques et utaris. Prudentius consilium est pedum tueri sanitatem, quam passionem curare. Coroborantur autem ungulae, si iumenta mundissime sine stercore uel humore stabulentur, et roboreis pontibus consternantur. Articuli quoque uel suffragines post iter calido foueantur uino. Naturaliter autem molles ungulae solidantur, si hederæ seminis duas partes et alluminis rotundi unam partem pariter contundas, et calciatis pedibus per multos

I 3 dies

ARTIS VETERINARIAE

dies inducas. Item subtritis pedibus prodest, picis liquidæ selibrā, aceti hemina, salis librā, hederæ folijs quantū sufficit pariter contundis, & laboranti quondie pedes perunges. Mollissimæ ungulæ hoc uno medicamine, quo potentius nihil est, assolēt indurari. Iacertā uiuū uiridē in ollam nouam mittis, adijcies olei ueteris librā i. aluminis iudaici selibram, ceræ librā, absynthij tūsi selibrā, & decoques cum lacerto: Cum fuerit resolutū, calentia uniuersa colabis, abiectisq; ossibus & purgamentis, liquatum medicamen in ollam remittes, & cum ungues indurare uolueris, ungulam subradis, & factum unguentum in cannam uiridem mittes, adhibitis carbonibus, prope feruens, per canam instillas ungulis: prouisurus ne coronam tangas aut ranulas, si his exceptis, in solo & in circuitu solidaturus ungulam confricabis. Memineris autem ungulas excrescēdo renouari, & ideo interpositis diebus uel singulis mensibus talis cura non deerit, per quam naturæ emēdatur infirmitas.

De dorso confirmando. Caput . LIX.

A Nimalium dorsa ut laboris plurimum sentiunt, ita diligentius sunt curāda. Exceptis enim his, qui deputati sunt circo, reliquum mulorū, equorū, asinorūq; genus sub sellis aut sagmis solo tergo prestat officium. Vnde laudabilior industria est, quæ incolumitatem tuetur, quàm quæ cupit læsa curari. Nam diligentia defendit à uitio, si centones uel saga primū sufficientia, deinde mollia imponantur, & lota, atque ad tempus diligenter excussa, ne aliquid sordidum aut asperitatis inhæreat quod sub pondere inulceret pellem: tunc sagmarum uel sellarum mensura conueniens, & apta qualitas debet adhiberi. Si enim ista minora fuerint uel maiora, angustiora uel ultra modum lata uel quæ non congruunt, grauiter nocent. Hinc enim collisiones, suppurationes, apostemataq; nascuntur, cum nimis locis in æqualibus premitur pondere, uel discentes tracturam mercurius aut spina deteritur. Ipsorū quoq; pōdere, etiamsi in stratis nulla sit culpa, enormitas nocet, & ideo temperanda est mensura ne inferat uulnus.

De dorso curando iam læso. Caput . LX.

QUod si dorsum sedentis iniuria tumere iam cœperit in recenti statim mallonem ceparū i. calamos siccos unde fascēs dependent, in aquam feruentissimam mittis, & aliquandiu maceratum, calidum
super tu

super tumorem impones, fasciā constringes uel cordiscum super impones, una quoq; nocte manere patieris absq; suppurationē palpabitur tumor. Quod si clauum fecerit, farinā hordeaceā cum folijs caulium contundis pariter et tepidā impones. Cinerem quoq; cū oleo miscebis, et inducis quā diu clauus cadat: cum ceciderit lyppara utere cum minutissimis pannis, uel mel cū linteolis; cum ulcus purgauerit, licio percurabis.

Si pulmunculus nascitur in dorso animalis. Cap. LXI.

Si pulmunculus natus fuerit in dorso, difficile est eum medicamentorum appositione siccari: sed si paruulus fuerit, cauterē, et præcipue cuprino aperendus est, ut sanies quā colligerat, egeratur: tunc curandus est sicut moris est usta curari: sed commodius est pulmunculum decussatim ferro secare et eximere, ita ut pellem ad modum præcidas, ne cum cicatricem duxerit, inueniatur epidarmus: oleum, acetum, et salē continuo addis in plagam, et ne nimius sanguis erumpat, stercus ipsius uulneri superponis et colligabis, die tertio folia caulium tūsa cum oleo, et aceto imponuntur per dies quinq;. Cum iam ducere cicatricem coeperit, licio curabitur.

Si uulnus fecerit. Caput. LXII.

Si uero fecerit uulnus, indulgebis otium, ut diligentius curetur, et recepta sanitas confirmetur indutijs, nec imponendus est labor qui rescindat adhuc teneras cicatrices. Sanatur autem ulcus si gallas syriacas cōbustas cum melle superimponas. Pulueres quoq; corticum pini et flos calcis uiuæ æquo pondere miscebis, et uulneribus inspergis. Pillulas quoq; cypropresi tūsas, et cribratas, et cortices quercustritos et in puluerē redactos mittis. Præterea ossa sepiarum et testas etiam ostriarum in puluerem rediges, et ærei quoq; uasis fuliginem pariter miscebis, quæ benetūsa si frequenter asperferis, siccatum uulnus ducet celerius cicatricem.

Ut pili renascantur. Caput. LXIII.

Quod si pili tardius cresctū, uiuā testudinē supra sarmenta cōbures, et cineres eius in nouū cacabū mittes, additis uncijs 3. alumis crudi, medullæ ceruinæ qd sufficit, et uino infuso decoques et diebus plurimis.

ARTIS VETERINARIAE LIB. II.

als. † uino

rimis imponis reuocare pilos creditur. Puluis de fabis cōbustis, uel de lupinis crudis uel de folijs fici cōbustis † seuo cōmixtus superponitur assidue. Quod si nulla præcedēte causa decidūt pili, Spica nardi, uuas passas pariter tundes & ex aceto decoques, calidumq; medicamentū glabro corpōri impones.

De denigrandus pilis albis. Caput .LXIII.

SI album pilum nigrescere cupias, atramētī sutorici scrupulos 7. odor laphinis succum scrupulos 4. cepi cparini quod sufficit pariter temperabis & uteris.

Vt pilī nigri albescant. Caput .LXV.

SI ediuerso albos pilos facere uolueris, cucumeris syluestris radicum libram unam, nitri scrupulos duodecim, in pulueres cogis, heminam mellis adijcies, quibus permixtis uteris.

FINIS LIBRI SECVNDI.

IN TERTIVM ARTIS VETERINARIAE VEGETII LIBRV. PROLOGVS.



Vlomedicinae me commentarios ordinante, ciuium, atque amicorum frequens querela, accepti operis cōtinuationem suspendit, desentium ægrotudines, moralesq; clamorissimas bouum, cum magnopere peterent publicandum, si quid pro salute tam commodorū animalium scriptum reperiretur in libris. Cedens itaq; familiarium honestissimæ uolūtati, ex diuersis authoribus enucleata collegi, pedestriq; sermone in libellū contuli. Cuius erit præcipua felicitas si eum nec scholasticus fastidiat, & bubulcus intelligat. Maximo autē incitamento mihi fuit ipsorū bouum utilitas & gratia, sine quibus nec terra excoli, nec humanum genus sustentari ullatenus poterunt. Cuncta igitur legumina siue frumenta bobus merito atrisq; debentur; uinearum ipsarum usus

rum usus periret nisi eorū adminiculis subuehendis carpēta sudarēt. Quid de diuersorum onerum cōparatione referamus, dum inter mobilia & quicquid grauius est, absq; uehicularum pene reddatur immobile? Reliqua quoq; animalia, ipsēq; cohortales aues & eorum capiunt labore substantiam. Vnde enim equis hordeū, unde cibum canibus, unde porcis pabulū dominorū solertia ministraret, ni pararētur boū labore frumēta? Et ne longū faciā bobus debēt alimēta quicquid ali potest. Apud alios genus mulorū, apud alios camelorū, apud paucos elephātorū licet exiguus usus est, nulla potest natio esse sine bobus. Postremo ut ad prouidentissimorū uirorum scripta redeamus quorū firmatur auctoritas iusticiā iumentorum cāde uiolenta derelictis terris ad syderum remeasse consortem. Quid potest laudabilius reperiri quā ut nomen equissimum, boum fugaretur interitus quod dum homicidia fierent permanebat in terris. Duplicem igitur sollicitudinem oportet impendi, ut sanitas incorrupta maneat, et aegritudo quæ ex casu uel negligentia siue labore contracta est, competentis medicinae curetur ratione.

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE LIBER

SECUNDVS.

DE OBSERVANDA BOVM SANI-

TATE. Caput primum.



VT LONGÆVI ET SANI SINT boues, bubulcum cōuenit prouidere uel dominū, quatinus frigoribus calidissimo cubili muniantur, & si fieri potest, semper foco uicini sint boues. Quodam enim beneficio naturali eiusmodi animalibus semper ignis commodum est, siue q; inutilis & pestifer humor exudat, siue conceptū ex pastu uel opere frigus expellitur, siue in flammarum halitu interna curantur. Præsepium oportet extructum esse

K

diligenter

diligēter, ne quid pabuli inter pedes animalū pereat. Bouile autē loco sicco stat uendū est, assidueq; munda dū est, ita quod quotidie pabulū ad edendū inutile substernatur, ut boues siccus & mollius cubent. Parum quoq; fastidium est cum boues reuocantur ex opere, ut colla eorū ex uino tepido perfundantur, & diutissime perfricentur. Cum uero de uia uel pastu redeunt luculentia adhibita, priusquā deducantur ad bouile, aqua diluendi pedes, ne inherentes corpori sordes ulcera generēt, uel ungulas faciant molliores, uel certe molestiam manducantibus, uel inquietudinē afferant dormituris. Sed hyeme omni solertia frigus est prohibēdum, uelut aestiuis mēsis pura aura quērēda. Per diē igitur sub umbra, per noctē sub diuo boues stare conuenit. Nō enim payciore si aestuauerint, quā si alserint colligūt morbos. Preterea unum ouum crudum cum hemina salis et sextariū uini per singula capita septimo diffundi per commodum est. Iuuat etiam si allium tunsum hircino misceas sepo, herbam quoq; uerbenam additam deteras, rutam herbam, etiam pollinem iniungas, & cum uino per os digeras. Cauendū precipue est ne aut cursu nimio, aut longo itinere fatigentur, uel ullis grauioribus certe oneribus affligantur: nimiam enim lassitudinem sequitur aegritudo, & omne animal est debile si rumpitur. A quam quidem istius generis animal non requirit nitidissimam, nec usq; adeo laeserit si sordidam biberit. Sed tamen bubulci diligentius est procurare ut mundam semper & optimam bibant. Maxime autem studendū est ut competentibus redundantibusq; saturi semper habeantur et pingues. Omnis enim aegritudo exordiū sumit ex macie. Exhaustū animal celerius labor frangit, aestus uexat, frigus penetrat. Non solum enim aestiuis mensibus pascuum sufficit ubi frondes diuersi generis addantur, & minuat uarietas ipsi fastidium. Hyeme non tantum paleis, sed feno quoq; et hordeo, & sepius eruo saginādi sunt boues. Nullus autem uberiores ciborum repudiabit expensas, qui considerare uoluerit bouum per inopiam pereuntium quā cariora sunt precia. Aduersum bouum morbos non minor adhibenda est diligentia quā equorum.

De morbis bouum, & primo de malleo. Cap. II.

NAm equinū genus morbus q̄ appellatur malleus, diuerso genere passionū emigrans per plures cōtagione cōsumit, boues quoq; idē morbus

bus interficit, sed à diuersis diuerso nomie uocatur, quæ plerūq; uulgus appellat. Hic morbus bouē si quando tentauerit, istis agnoscitur signis; erit pillo horridus et tristis, stupentibus oculis, ceruice deiecta, saluiis assidue per os fluentibus, incessus pignior, spina rigidior, fastidium maximum, pauca ruminatio; cui si inter initia subuenire tentaueris, discrimen euadet: si per negligentiam adhibeatur tardior cura, ueustioris morbi non potest superari pernicies roborata. Inter exordia igitur tediati boui aduersus oēs morbos potio ista succurrerit: tres semis uncias squillæ minutatim concisas, præterea radices teneræ popinum effossas & diligenter lotas cōtondes in pila, & tria ex hijs pondera addito sextario salis in uini septem sextarios mittes, & per septem dies per os bobus singulos sextarios digeres. Quod si toto anno aduersus oēs ægitudines desperatas boues stagnare uolueris, incipiente uere. i. ab idibus februarij quindecim diebus continuis, hanc potionem dabis omnibus diebus, quæ usq; adeo salutaris est, ut approbatū sit integro anno boues sic curatos nullius morbi cōtagione tentari. Talis etiā compositio & morbis resistit, & uires animalū firmat; folij caprinis, folij mirti syluestris, folij cypressi atq; uncias tres diligentissime deteres, infundes in congrū aquæ, & una nocte sub diuo manere patieris, & inde unoquoq; boue tepesfacto per tridū singulos sextarios dabis: quæ potio ad stagnāda aīalia quater in anno facienda est ultimis tēporibus ueris, æstatis, autumnī, et hyemis. Morbos ægitudinesq; depellit. tres uncias baccarū lauri, gentianæ, aristologiæ lōgæ, myrrhæ, betonicæ diligentissime detere et misce cū mero, ex quo trinas heminas triduo iugiter iumētō pos dabis. Spice quoq; alij tritæ, cū uino quoq; per nares infusæ purgāt capita iumētōrū. oua cruda cū melle iumētōrū faucibus inseruntur, atq; ita fastidiū ac nauisia discutitur. Expedit tamen salē pabulis misceri, Marrubiū quoq; tritū mane cū oleo uinoq; diffundere, thuris puluerē cū mero siue per nares inieceris, siue pos dederis prodest. Nec minores medicinæ bobus horū copia subministrātur. Nam porros, rutā, apium, & herbā sauinæ si quis large deterat, et misceat uino, ternasq; heminas præbeat ad potandum ægrotantibus subuenit. Plurimiq; caulē uitis albæ cōcisam atq; serpillū & squille partē in aqua macerāt, ternasq; heminas per tridū digerūt, quæ potio uentrem purgat, uires quoq; confirmat. Ad interna autem curanda præcipue amurca creditur salutaris, si tantundē aquæ misceat, & animal

Bibere consueſcat. Sed quia licet ſitiat, potum faſtidiat ignotum. Primo cibi aſperguntur, deinde aqua exigua poſſio med: catur, ad ultimum pro menſura miſcetur, & uſq; ad ſaturitatem ſitientibus datur. Quocūq; autem tempore, ſed maxime æſtate, ſi boues concitentur ad curſum, aut alius eorum ad pernitiam ſoluitur, aut febriculæ cōmouentur. Natura enim pigrū, et labori potius q̃ uelocitati accommodū, uehementer læditur ſi ad opus cogatur inſuetū. Periculofum quoq; eſt, ſi ad præſepia ſues aut gallinæ peruenerint. Nam bos cum gallinæ ſinum inter pabula ſumpſerit, ſtatim nimio uentris dolore torquetur, inſlatusq; moritur; cui hac ratione ſuccurri cōuenit: A pij ſeminis uncias 3. cinini ſextariū ſemis, et duas lib. mellis cōmiſces, et tepidū p os iſundes, ac tam diu ambulare compellis, & confricas manibus plurimorū, donec uentrem potiō moueat. Giſni quoq; cum uino deterere, & per os dare creditur ſalutare remediū. Lixiuū quoq; ex arbore ulmi, uel cuiuſcunq; generis ligni cinerem, dūmodo bene coctum, cū oleo miſcebis, & liquidū ac tepidū diſfundere per fauces, aduerſus ſtercus plurimū prodeſt. Si aut porcini ſtercus bos deuorauerit, ſtatim peſtilētiam cōtagionis ſolius mallei ſuiſinet morbi. Qui cū ſemel in gregē uel armentorū uel domitorū inceſſerit iumentorū, ſtatim oīa animalia quæ leuem ſuſpitionē habuerunt, de poſſeſſione tollenda ſunt, & diſtribuēda illis locis, ubi nullū pecus paſcitur, ut nec ſibi inuicem, nec alijs noceant. nam paſcēdo herbas inſiciunt, bibendo fontes, ſtabulo præſepia: et quāuis ſaniboues, odore morbidorū aſſante depereunt. Vſq; eo etiani mortua cadauera ultra fines uille proijcienda ſunt, & altiffime obruenda ſunt ſub terris, ne forte ipſorū corporum interna ſanorū contingantur & pereant. Vno quidem uocabulo peſtilentia appellatur, ſed habet plurimas ſpecies, quas enumerare non licet (uel riget): ſacilius ipſa principia à diligentibus intelligi poſſint. Eſt itaq; humidus humor, quoties per os et nares humor effluit bobus, & faſtidium ægri tudoq; conſequitur. Eſt ſiccus quoties nullus humor appareat, ſed animal quotidie maceſcit & fit deterius, nec iuxta conſuetudinem appetit ciboſ. Eſt articularis quoties interdum de prioribus, interdū de poſterioribus pedibus claudicant boues, cum habeant ungulas ſanas. Eſt & ſubrenal ſis quoties à poſterioribus debilitas appareat, & quia lumbi dolere creduntur. Eſt ſarciminoſus quoties per totum corpus bobus tubercula exeūt, aperiunt ſe, & quaſi ſanantur, & iterum in alijs locis exeunt. Eſt & ſub-

tercutanea:

tercutaneus, quoties humor pessimus in diuersis partibus corporis bobus erumpit & decurrit. Est elephantiosis, quoties uelut scabies minute cicatrices exeunt extra coriū, et ad similitudinē lēticulæ. Est mania quæ reſectis bobus eripit ſenſum, ut nec audiāt more ſolito, nec uideāt: ex qua paſſione celerime moriūtur, quāuis hilares pinguesq; uideātur. Hi oēs morbi cōtagiōe ſunt pleni, & ſi unū animal apprehēderint, celeriter ad oīa trāſeunt, & ſic interdū aut integris armētis, aut oībus domitis aſſerūt interitus. Vnde oī ſtu dio quæ ſemel tentata fuerūt ſegregāda ſunt animalia, et ad ea loca mittēda, ubi nullū animal paſcatur, ne cōtagiōe ſua oībus periculū generet, et negligētiā domini (ſicut ſolet à ſtultis) diuinæ imputetur offenſæ. Euincēdi tamē ſunt, & exquisitis remedijs expellendi quāuis acerbiffimi morbi. Panacem ſupplaffarijs comparas. Eryngion autem herba dicitur, quæ in littorē naſcitur prope undā maris, florē habet quaſi aureū uel galbineū, folia eius ſunt quaſi folia cardui ſylueſtris, inter arenas littorum largiſſime ſpargitur, has effodies, & in umbra ſiccitas ſeruabis, aduerſus morbū tam equorū quā bo um plurimū proſunt. Ex quibus potio cōponitur iſta: Radicis panacis, item q; radicis herbæ eryngij ternas uncias, ſeminiſ quoq; ſceni uncias 3, pariter deteres diligēter, addiſq; farinæ triticeæ ſextariū, ita ut prius frumētū frāgas et molas: quæ oīa de calida ſeruētē cōſpergis, et cū melle uel ſapa nouenas oſas ſingulis diebus digeres. Præterea ſanguinem marinæ teſtudinis colliges, & cum uino per os dabis. Quam quia inuenire difficile eſt, uulgariū teſtudinū prodeſſe eſtimant. Quod utrū bene opinātur, uſus uiderit. Nā auctores de terreſtri teſtudine tractauerunt. Puluerē et caſſiæ fiſtulæ, necnon etiam thuris pro æqua parte admiſces, ex eo unā ſemis uncia cum ſextario uini ueteris in die per nares bouis inſundis. Quod medicamentū per tridū facies. Morbi quoq; quos ſuperius noīauimus amari ſunt, & nō niſi amariſ potio nibus ſuperantur. Nā cōtraria cōtrarijs potionibus curātur ratione medicinae. Ideoq; puluerē herbæ abſynthij et crudorū lupinorū, herbæ quoq; centaureæ uel peucedani æquis pōderibus diligēter miſces et in ſextario uini ueteris trina cōclearia ſingulis diebus, additiſ uncijſ 3, olei, per os dabis. Præſens quoq; remediū experimentauerunt: radiculā herbæ cōſiliginis (quā ali j pulmonariā uocāt, ali j tantūdem radiculā) ſiniſtra manu ante ortū ſolis collige (quia ſic maiorē uim habere creditur) tunc ad acum uel acutiū cuprinum

ARTIS VETERINARIAE.

ps auriculæ quæ lata est, quasi in circulo signatur, adprematq; ut rupta cute leuiter sanguis exeat. Quod cum ex utraq; parte feceris, medium orbiculū perforas ad acum, & in eodem foramine inseres: quod ubi exierit, omnis pestilentia uirus per ipsum defluit uulnus, donec ille solus locus, qui designatus est, putrescat & decidat, atq; ita animal liberetur. Vsci folia cū uino trita defunduntur in nares, atq; ita singulis bobus, siue uniuersis gregibus cum morbum incurrerint subuenitur. Suffimenta quoq; plurimū uiuant, sulphur, bitumen, allium, origanum, semen coriandri, carbonibus insperge, & cooperta boum supra uas, in quo suffimenta incēderis, diutissime continebis, ut fumus os eorum capiat, ac nares impleat, atq; ita ad cerebrum & interna saluari remedio penetret. Sed & totū suffimentare per cōmodū est, ut ab eodē morbo pncipies expellatur, et cætera pestilētiæ cōtagio nō coingnet. Generalia igitur remedia aduersus morbos generales contagiososq; retulimus, nunc aduersus ualitudines, q̄ singlis aialibus accidūt, nec in alia trāseūt, remedia subiūgem⁹

De cruditate. Caput .III.

CRudititas plurimum nocet, cuius hæc sunt signa: crebri ructus, cibi fastidiū, sonitus uentris, intensiōes neruorū, oculi hebetes: propter quæ nec bos ruminat, neq; linguā detergit ut solet. Prodest itaq; ut duos cōgios ubi bibi possit digerere per fauces. Post quos statim brassicas triginta caules modicas decoques, & ex aceto dabis, suspēsūq; aīal ab alio cibo penitus abstinebis. Alij cruditate laborantes, clausos in bouili detinēt, nec cibos præbent. Præterea lentisci et oleastri cacuminū pondera 4. deterūt, et cū lib. mellis atq; aquæ congio miscēt, quæ una nocte sub diuo mittūt, atq; ita faucibus digerūt. Deinde interposita hora, macerata infusaq; erui 4. lib. obijciūt, ab alio quoq; cibo uel potione prohibētur. Nā si neglecta fuerit cruditas, uentris inflatio intestinorūq; subsequitur, exprimit gemitus, cibosq; capere nō sinit, nec in loco consistere, decūbere & uolutare cogit, caudamq; frequēter cōmouet. De expimēto medicina est caudā iuxta clunes resticula uel lino uehementer astringi, uiniq; sextariū cū hemina olei tepidū dare p fauces, atq; ita p mille quingēto s passus bouē currentē trahere: si dolor permāserit, ungulas eius secare, et unctā manu p anū finū extrahere, & rursus agere currentē. Si tardius proficit, tres partes lauri diu cōteruntur, et cū duplici aquæ calidæ dantur. Si ista nō ualent, mirte foliorū syluestris duæ lib. tundūt in pila, & duæ ex

duæ ex calida aqua miscentur, ac per uas ligneū faucibus infundūtur. Atq;
 ita sub cauda quatuor digitis ab ano percussa uena sanguis emutatur. Qui cū
 satis effluxerit papyro ligata cauda restringitur. Post cōcitatus bos agitur
 usq; dū anhelet. Ante detractiōē tamē sanguinis adhibentur ista remedia:
 tribus heminis uini, quatuor uncie cōtriti olei pmiscētur, postq; potionē con-
 getur currere: duæ quoq; uncie salis cū decem uncijis ceparū atterūtur: mel
 quoq; decoctū admiscetur, ex quo facta collyria longiora nō parum ualida
 immittunt in anū, ut uētre m resoluāt: atq; ita bos currere cogitur. Ventris
 quoq; & intestinorum dolor sedatur, si anseres natantes, & maxime anates
 animal aspexerit. Nam anas mulos, etiā equinū genus cōspectu sui celeriter
 sanat. Sed interdū in illa medicina cōuenit sequiturq; omnium uitium, quorum
 signum est si exuentū ⁊ mutosumq; uentrem ediderit, singulare remediū est
 cupressinæ quindecim, uerbena quindecim gallæ diligentissime trita quan-
 tum utraq; ponderatur tanti ponderis uetustissimus caseus, quibus pariter
 detritis admiscētur uini austeri sextarij 4. & in potu dantur, ita ut lentisco
 mixtaq; oleastri cacumina præbeantur. Si uenter cœperit fluere, & uideris
 egere corpus et uires capito plerūq; inutile reddit, quia ex cibarijs ad mede-
 lam bouis nil peruenit, quod sic uideris per uentrē projicit quā quod mādum
 cauerit. Quæ cū acciderint prima die à cibo et potu abstinēdū est, ita qđ nec
 secunda die bibere permittatur, cacumina tamē oleastri et cannæ syluestris,
 itēq; bacca lentisci et myrti dandæ sunt, nec post triduū etiā potestas bibendi
 nisi perparū cōcedenda est. Sunt qui ex folijs lauri teneris librā 1. abrotan-
 num hortense pari portione deterui cū aquæ calide 2. sextarijs, atq; ita fauci-
 bus infundūt, pabulaq; supius præbēt. Aliqui uero 2. lib. ex uinaceis ad focū
 torrēt et cōterūt, et cū sextario uini austeris ad bibēdū dāt, et cūmerata se-
 pius cacūina obijciūt. Qđ si neq; proluuius uētris erit neq; intestinorū dolor
 recusat tamē cibos et prægrauato capite erit: lachrymæ quoq; oculis et pitui-
 ta naribus currit, usq; ad ossa frons media uratur, auresq; ferro discindātur,
 sed uesturæ igne factæ ut sanescant ueteri urina bouis ipsius cōfricandæ sunt.
 Aures uero scissæ picula oleoq; curātur. Periculosum fastidiū bobus ranulæ
 faciūt, quæ aperiēdæ sunt et allio cū sale pariter trito ipsa uulnera cōfricada,
 ut omnis humor exeat prouocatus. Melius creditur si ad acutā cannā exces-
 ranulam, post uino os lauatur. Interposito unius horæ spatii uirides herbæ
 uel frons

ARTIS VETERINARIAE

vel frondes dantur. Tam diu aut sustentantur mollibus cibis, donec facta uulnera cicatrices ducant. Si neq; ranula fuerit, & non appetent cibum, allium eritum cum oleo naribus infundes.

De Febre.

Caput .iiii.

Bos si febre coeperit (quod ex uenarum inquietudine, & calore totius corporis uel oris intelliges) una die à cibo est penitus abstinendus, ita ut postero ieiuno eidem sub cauda exiguum sanguinem detrahas, atq; interposita hora trigesima paruos aculeos decoques, et ex oleo ac liquamine per os digeres, eamq; escā per dies quinq; ieiuno dabis. Præterea cacumina lentiliū, uel oliuarum, uel tenerrimum queng; frondem, ac pampinos, si eodem tempore sint, præbebis in cibo. Labra quoq; eius deterges ad spongiam, & aquam frigidam ter in die offeres ad bibendū, ita ut infra tectum bos febriens teneatur, nec antequam sanatus est dimittatur in pastu. Febrientis autem ista sunt signa; lachrymæ profluunt, grauatur caput, oculi semiclausi sunt, labra saluūis madida, longior & cum quodam impedimento tractus spiritus, frequenter et gemitus. Tussis bouum non minus diligenter sananda est quàm equorū: si recens fuerit, sextarius farinæ hordeaceæ cum uno ouo crudo & hemina passi per os datur ieiuno: gramen quoq; concisum tunsūq; admixta farina fabæ frixæ & pollinis lentis, sextario aquæ calidæ miscetur, agitataq; diligenter per os diffunditur. Veterem tussim sanāt duæ libræ hyssopi maceratæ ex aquæ sextarijs tribus, quod infusum teritur, & cum duabus partibus farina miscetur, & per os datur, super quod aqua hyssopi, in aqua decoctam infusum decoctumq; etiam propinatur ad cornu. Porri etiā succus expressus cū oleo & ipsi febre cum hordeacea farina remedium præstant. Radices quoq; eius diligenter lotæ, & cum farre triticeo contusæ, ieiunūq; datæ, discutiunt uetustissimam tussim. Idem præstat eruum si in pabulis cū ptisana hordei molitum, & cum aqua tepida uel mulla in fauces saliuanti ore dimissum. Suppuratio, quam apostema dicūt, melius ferro aperitur, post cū expressum pus aut sanies fuerit, sinus ipse, qui eā continebat, urina bubulina calida lauatur, ac linamentis ac stuppis siue linteolis pice liquida et oleo infusis curatur. Quod si colligari ea pars, ubi est ulcus, non potest, lana candente sepeum caprinum aut bubulinum stillatur. Aliquāti, cū uitiosam partem inunxerint, tunc uirina ueteri humana lauunt, atq; ita æquis ponderibus pice liquida cum ueteri

axungia incoquunt & liniunt. Sanguis cum ex aliqua necessitate ad pedes uenerit boum, claudicationē affert. Quod cum accidit, inspicito ungulā, inuenies eam ulra solitū calere, & uitiatā partem premi uehementer bos non patitur. Sed si sanguis adhuc super ungulas in cruribus est, ad triduū triti salis perfricatione discutitur. Quod si tantū in ungues descēderit, cultello leniter inter duas ungues aperies, & mundabis deintus, et postea stuppam sale atq; aceto infusam applicabis ad solū, sparta opere calceatur, maxime quæ datur operantibus, & in aquam non mittat pedem, sed ubi siccum est ambulet. Qui sanguis nisi emissus fuerit saniem creabit. Quo suppuratio etiam curabitur. Nam primo ferro circuncisus expurgatur ad uiuū. Deinde panis aceto & oleo & sale madefactis impletur, mox axungia ueteri & sepo hircino pari pondere ferro candenti stillantibus curatur, & perducitur ad sanitatem. Si sanguis in interiori parte ungulæ est, nec aperturam faciit, & tantū claudicat animal, extrema ipsius ungule ad uiuū resecantur, & ita remittitur, ac stuppa uel linteolis cum sale et oleo & aceto infusis pes inuolutus sparta munitur. Mediam uero ungulā ab inferiori parte non expedit aperiri, nisi eo loco in quo suppuratio facta est. Si claudicat ex dolore neruorū, oleo & sale genua poplitesq; & crura confricanda sunt calido aceto, & lini semen aut milium detritū infusumq; aqua mulsa imponendum est, & spongia quoq; feruenti aqua infusa & expressa, conspersaque postmodum melle, genibus circumdatur ac fascijs alligatur. Quod si humor est cum tumore, fermentū uel farina hordeacea ex passo aut aqua mulsa incocta imponitur, & cum maturauerit suppuratio, scinditur ferro, emissaq; sanie (ut supra docuimus) percuratur. Potest etiā radix lilij uel squilla cum sale, uel herba sanguinalis (quam palaganon Græci appellant) uel marrubium ferro aperta sanare. Omnis autem corporis dolor, si sine uulnere est, recens fomentis melinis discutitur. Vetus autem uritur, Et supra uulnus uel butyrū uel caprina instillatur axungia. Scabies anatis trita oleo defricata: Eodemq; remedio rabiosi canis sanatur morbus uel lupini uulnus illatum. Vetus quoq; salisamentum utranq; perhibetur plagam curare. Ad scabiem quoq; presentior medicina ista est: si cumulat bubulam sulphurq; conteritur, admixtaq; myrrha cum oleo atq; aceto decoquuntur, & cum tepescere cœperit, alumen scissum tritum inspergitur: quod medicamentum candentis olei illitum prodest.

L Vlceribus

Ulceribus gallarū tritarum puluis inspergatur. Succus quoq; marrubij im-
 positus cum fuligine sanat. In ista pestis est bubulum pecori (quā & magnū
 rustici uocant) cum pellis ita dorso haeret, ut apprehensa manibus deduci nō
 possit à costis: quæ res non aliter accidit quàm si bos ex languore aliquo ad
 maciem deductus est, aut sudans in corpore faciente refriguit, aut si lapsus
 sub onere uehementer est infusus in pluuia: quæ quandoq; pernicioſa sunt:
 custodire debemus, ut cum ab opere redierint boues adhuc estuantes anhelan-
 tesq; uino aspergantur, & offula panis uino infusa faucibus eorum infusa-
 tur. Quod si prædictum uitium inhererit, expedit decoquere laurū, et cum
 calida & oleo & uino spinam dorsumq; animalis confricare contra pilum,
 ac per omnes partes apprehendere pellē, & uelut à costis separare. Quod
 aut in loco calidissimo faciendum est, aut sub duobus sole feruente. Aliquantū fe-
 ces uini & axungie cōmiserunt, eōq; medicamento tepido post fomentū præ-
 dictum utuntur. Et cum grauis perniciēs, ut cum pulmones exulcerantur,
 unde tussis & macies, ad ulum uero phthisis inuadit, quæ mortem afferant,
 radix consilignis, succus porri, omnū hemina per mensuram olei miscetur,
 & bibendi sunt cum uini sextario per dies plurimos. Nonnunquā & tumor
 palati ciborū fastidium facit, crebrumq; suspirium. Prodest palatum ferro
 aperire ut profluat sanguis, cui cruum sine corio maceratum ad manducan-
 dum dabis, uiridemq; frondem uel quodlibet aliud molle pabulum dum sane-
 tur. Si in operibus contuderit collum, præstantissimū remedium est, sanguis
 ab aure emissus. At si id totū in tempore quæ uocatur & amati amaticum sale
 tantum & imposito. Si ceruix mota & deiecta est, considerabimus in quā
 declinet, et ex diuersa parte sanguinē detrahimus, ex ea uena quæ in aure ui-
 detur amplissima, quæ sarcocata prius uerberanda est, & cum intumuerit
 ferro aperiatur, effusoq; sanguine postero die ex eo loco emitatur cruor, et bi-
 duo uacatio operis datur. Tertio uero die leuis iniungatur labor, & paula-
 tim ad operis consuetudinem reuocatur. Quod si ceruix in neutram partem
 deiecta est, mediāq; intumuit, ex utraq; auricula sanguis emititur. Qui si
 inter triduum q. bos uitium cœperit emissus non est, intumescit collū, neruiq;
 tenduntur, & ita nata duricies iugum non patitur. Tali uitio comperimus
 aptum esse medicamentū, ex pice liquida et bubula medulla, hircino sepo, et
 axungia uetri, oleo quoq; uetri æquis ponderibus impositum cōcoquitur,

quo utendū est cū bos ab opere disiungitur. et in piscina in quolibet tumore ceruix lauatur, cōfricaturq; diligēter prædicto medicamento, deterfaq; diluitur. Si ex toto propter tumore ceruicis iugum recusat, paucis diebus requies ab opere danda est, et ceruix cū aqua frigida lauāda, et spuma argēti linienāda est. Celsus quidē iumentī ceruici herbā quæ uocatur amas (ut supra dixi) cōtundi et imponi iubet. Quæ ceruicē infestāt minor est cura. Nā facile sanātur per ardētē lucernā oleo instillato. Melius tamē est custodire ne nascatur uenæ. Et iā colla caluescunt, quæ nō aliter glabra fiunt nisi cū sudore aut pluuia ceruix madefacta est in opere. Quod si acciderit, puluere lateritio triuopriusquā deiungatur, bouis colla cōspergi oportet. Et cū exiccati fuerint, exinde oleo iterū infundi. Si talū uel ungulā uomer laeserit, picem durā et axungiam cū sulphure et lana succida inuoluito, et candētē ferro supra uulnūs imponito, et ungitō: quod remediū optimū facit, si clauū calcauerit, aut acuta testa uel lapide ungula pertūdatur: quæ tamē si altius uulnerata est, latius ferro circūciditur, ita inuritur ut supra præcepi. Deinde ex parte calceata per tridū acetō suffuso curatur. Qd si uomer intrauerit, lactuca marina, quam Græci cyniolā uocāt, admixto sale imponitur. Subtriti etiā pedes eluuntur calesacta bubulina urina. Deinde fauilla sarmentorū seruētē calcare cōpellitur, et pice liqida cū oleo uel axungia cornua eius ungiuntur. Minus tamē claudicant si ab opere disiunctis frigida pedes lauentur, et suffragines coronæq; ac scissura ipsius ungulæ, ueteri axungia defricentur. Frequēter etiā uel ab asperitate itineris, uel in proscindēdo duritiā soli, aut obujs radicibus obuolutatus cōuellit armos: Quod cū acciderit, ex prioribus cruribus sanguis emittitur, si dextrā ex sinistro. Et si uehemētius utraq; uitiauerit, etiā in anterioribus cruribus uenæ soluuntur. Perfractis uero cornibus, linteola, sale, atq; acetō et oleo imbuta ponuntur, superligatisq; per tridū eadem insunduntur. Quarta die tantum axungia cum pice arida et cortice pini pari pondere imponitur, et ad ultimum cum iam cicatricem producant, subito infricatur. Solent autem neglecta ulcera uermes creare, quæ si mane ex aqua frigida perfundantur, rigore eius cōtracti, decidūt: Vel si hæc ratio nihil profecerit, marrubium aut porrum conteritur, admixto sale imponitur, uel calcis uiuæ puluis inspergitur, aut cucurbitæ uiridis succus cū acetō mittitur. Ideoq; uniuersis ulceribus picem liquidam, oleum uetus et axungiam oportet adhi-

beri, & extra uulnera etiam eodem medicamento circumliniri, ne infestentur à muscis, uel uermes creent cū uulneribus inciderint. Serpentis quoq; ictus mortiferus est bobus, sed & minorum animalium noxium uirus. Nā uipera & celicia cum in pascuis bos improuide supercumbit, stimulo morsus impriunt. Araneus quoq;, quem Græci migalem appellant, parui quidem corporis, non paruam solet inferre perniciem. Verum uiperæ uenenū depellit, supra tumorem, qui inflatur ex ictu, scarificatio ferro facta, ita ut herba quæ personatiam uocant, imponatur trita cum sale. Creditur radix si confusa conatur, uel filer montanum reperiatur, & trifolium simoniamū, quod fragosis locis efficacissimū nascitur, odoris grauis, bitumini similis, propter qdā Græcis asphalton appellatur, nostri autem propter figuram acutum trifolium uocant, nam longis & hirsutis folijs uiret, caulemq; robustiorem facit quā pratense: huius herbe succus cum uino faucibus infundatur, atq; ipsa folia cū sale trita imponentur in plagam. Quod si uiridem minime reperiunt, semina eius collecta & trita dantur ad potandum cum uino. Radices quoq; eius cū succo caulis trite, addita hordeacea farina & sale, cū aqua multa scarificationi superponuntur. Est etiam præsens remedium si fraxini cacumina tenebra contrecta cum sextarijs uini quatuor uel olei, expressumq; succum faucibus infundas. Itemq; cacumina eiusdem arboris cum sale trita laesis naribus superponas. Celicie enim morsus tumorem, suppuratumq; generat. Idemq; facit muris aranei. Sed celicie morsus sanatur, si acuterea locum laesum compungas, et creta cimolca ex aceto oblinis; Muris uero perniciēs, si animal ipsum oleo mersum neces, & plagam dentium ex eodē confrices. Quod si nō fuerit, contritum ciminum cū picula & axungia, ut similitudinē malagmæ habeat, impositū plagæ, perniciem submouet. Quod si antequā tumor discutiat suppuratio fuerit generata, optimū est ignea lamina uel cauterio collectionē apire, quicquid uitosum est inurere, atq; ita cū liquida pice & oleo inliniere. Quidā uiuum murem araneū creta figurari circumdant, & colla bouum suspendunt, morsusq; ipsius bestie submouent. Oculorum uitia plurima in illis sanantur. Nam siue intumuerint aqua multa triticea farina cōspersguntur & imponitur, siue album in oculo est salis fossilis Hispani uel armeniaci, uel cū melle pexmixti uitium extenuant. Idem præstat trita sepie testa, & per fistulam oculo ter in die insufflata. Prodest etiam radix, quā Græci silpion uocant, nostri

autem laserpitium, huiusmodi quantum uolueris ponderis cū decima parte salis armeniaci & cū fistula oculo insufflas. Quæ radix tinsa et cū oleo lentisci mixta uitū expurgat. Si genæ humorē profundū, lachrymisq; uisus cōfunditur (quam epiphorā uocant) polenta ex hordeo mulse aquæ cōpersa super genas superciliāq; imposita reprimat humorē. Pastinaca quoq; agrestis, quā armoneaceā uocant, cū melle trita oculorū sedat dolorē. Memineris uero quoties mel aliō sue succo remedio adhibes, ut prius pice liquida cum oleo circūlinias oculos, ne à muscis apibūsue uel uestis insectetur, quas dulcedo mellis inuitat. Plurimūq; hirudo, id est, sanguisuga, cū foris iuxta fauces hæret, sanguinē trahit, eam à iumento digitis oportet auferri: sed si intērius sit, ut manu detrahi nō possit, cannā uel fistulā perforatā in serito faucibus, ac per eam calidū oleū infundes. Nam eo cōtactu bestiolæ inportunitas recedit. Odor quoq; cimini super carbones impositi ubi sanguisugam afflauerit, euellet à uulnere. Quod si stomachū uel intestinū tenuerit, calido aceto p cornū infuso necatur. Machina quoq; describēda est fabrica, qua cōclusa cuiusuis generis iumēta bouesq; curātur, ut et tutus ad pecudē medendū accessus sit, nec luctando quadrupes aut mēbra cōuxet, ac sic remedia despuet. Roboreas affēs cōstringis, soliū, quod in longitudine nouē pedes debet habere, in altitudinē pars posterior duos sinū pedē: Pars uero quæ ad priora animalū pertinet quatuor pedes: textūtur ita ut uelū in caudā ductū non possit exire. Sed à parte posteriori paululū latiorē, à priore strictiorē machinā cōpingi oportet. Cui trāuersum trigillū ad modū iugī confirmandū est, ad quod equorū capita uel bouū cornua religātur. Nam reliquū corpus ad temones socos et funibus alligetur, ut iumentū præstetur ad medentis arbitrium. Quæ machina ad omnium maiorū animalū medelā solet esse cōmunis.

Ab initio huius tertij libri usq; huc, nō habentur in uetustiore codice, et totū censeitur una rubrica (ut ait) quatuor capitum: & propterea subsequens reputabitur caput secundum.

Si uermes animal fecerit. Caput .II.

Si uulnus in dorso, aut quacūq; parte corporis cœperit habere uermes, & timetur ne puiredo uulneris transeat in cancrum, nepitā & cedrinā

L;

sive cimi

Mercurius

siue timinū ut cicutā cōteres ex aceto, & imponis. Calcē quoq; uiuā ex aceto acerrimo temperatā necare uermes experimenta docuerunt. Si uermiculus dorso putredinem fecerit, utilissimum est cauterizare subtiliter, postea iuscū cū melle & uino cōterere & imponere. Pannos quoq; minutos cū oleo & aceto uulnera purgare manifestum est. Quo facto si necessitas fuerit, ustio rursus adhibetur. Ad ultimum cornu caprinum combustum & contritū uaget, ulceribus superinspergitur, ut recuperetur & sanitas ei detur.

De curalumborum. Caput .III.

Lumborum quoque cura uicina est. Nam animalia aut cum nimio pondere, aut cum transcendere fossam conātur, si posteriores resederunt pedes, erit nimio frigoris dolore renā cōtrahūtur. Ideoq; aqua calida cū flore fœni diutissime confouendi sunt lumbi. Inunctionibus etiā calidissimis perfricādi, et ad ultimū afro nitro diluti, inducto caustico corroborandi. Qd si dolor uehementior fuerit, de ingubus soluendæ sunt uenæ, & oleum cum axungia sanguini qui profluit immixta, renibus inlinuntur. Et si necessitas fuerit, catapla, mis utendum est. Pono quoque renibus subuenit, si pillulas cypressi incidis duodecim supra carbones, nitri quoq; uncias tresas, et utraq; in puluerem redigas, cum uncijis tribus mellis, & uini ueteris sextarijs tribus, & olei boni tribus uncijis, quod per quatrimum aqua parte faucibus digeras. Vitio lumborum medetur hemina seminis brassicæ cum sextario polentæ attusa ex aqua frigida subacta atque imposita dolentibus locis. Sisembrium quoque cum polentæ sextario & aqua subactum medetur. Efficacius tamen est si cypressi folia ad modum heminae diligentissime contundas et polentæ sextarium admisceas, acriq; aceto subactis dolenti imponas. Præterea resina duræ uncias sex decoquas ut liquecat, cui seruēti superaspergis hordeaceam farinā quā diu inspissetur ad similitudinem pulmenti, & diu subactis, & calidum ita ut manus pati possit, superillis renibus. Quod si frequenter renouaueris, & dolori subuenit & tumori. Si uero tanta indignatio fuerit, ut cuiusmodi non sentiat curas, aut cauterio cuprino locis opportunitis urendo deprimes puncta ne deformetur animal, t aut si uilius est, aut necessitati aptum, quos decori gratia lares, sicut moris est, uteris.

R Quibus signis renū dolor indicetur. Ca. II. II.
Enum autem dolor his agnoscitur signis: Posteriores ungulas trahit, lumb

hit, lumbi uacillabunt, cauda deiecta erit, & foetulēter mingit, ilia dura atq; contracta. Interdum tales sunt renes, ut sanguinem mingant, et si nimium effuderit incurabilis est passio. Si parū cruoris abundauerit, scito posse curari. Cui post detractum sanguinem uel de matrice, uel de femoribus, hanc potionem dabis, uidelicet porri sectiui succum ex aqua.

De internis musculis. Caput .v.

SAepe musculi, qui in renibus sunt, uexantur ex casu, & exteriores facilius curantur, si iusta medela afferunt tarditatem. Optimū est quoties ceciderit iumentū loco nō moueri, & aqua frigida perfundi, & postmodum unguentis uti. Quae passio ista cōsueuit ferre indicia: renes obdurescūt, cōtrahuntur testes, coxāq; trahit, & colligere se nō poterit. Quae ualitudo nascitur ex itineris longi fatigatione, aut ab infractu cliuorum uiarū. Incitatio quoq; cursus, & saltus extensio hanc adferunt causam. Sanguinem igitur ex uisceribus oportet emitti, pro ut qualitas corporis patietur. Vtendū est potionibus etiā ad ualitudinem necessarijs, molli dormitione animal collocandum.

Si talus exeat animalī. Caput .vi.

EX perfrictione nōnunquā aīalibus exit foras talus, qui hac ratione curatur: Scalpello scarificabis, praecipue loca quae uidentur eminētiora, similiaque uesculis, scarificatio digitis exprimitur et decarnatur, puluere salis perfricatur, donec cum sanguine actus humor exiccetur. Post calida & sale fovebis, & deprimendo intus remittis, & continuo reuertetur ad locum unde exierat. Altera intus digitis missis inlita lypparia uel meliloto, donec sanetur. Quod uitium si ferro tangere dubitas, hoc medicamento curabis quotidie: Castorei uncias tres, salis triti pondera duo, salis armeniaci lib. unā, sinapis pontici uncias 6. omnia tusa et cribrata pariter decoques, impones talo, & alligabis quotidie, aut lixiuio calido fovebis, et medela cōtinua usq; ad sanitatem. Potionibus autē thermanticis calefiet egrotū. Alij in hac passionē cū axungia ad manus talos fulciri & reponi oportere dixerūt, postea spongia apponi caudam supra alligando. Si tamen diebus aliquot fuerit cura neglecta, prius foueri ad sex ex lixiuio, uel sale & urina calenti, & sic reliqua curationibus impleri.

De dolore

ARTIS VETERINARIAE.
Dedolore renum. Caput .VII.

Dolor renum animalibus sæpe contingit, his proditur signis: nec incedere poterit, nec cubare, ilia eius inflantur et obdurescunt. quorum ista curatio est. Sanguis de utrisq; femoribus emittitur, postea lotiū uetus & putridū in uase supponitur, & lapides molares seruētes mittūtur, animal sēges diligentissime usq; ad ungulas operiatur, ut uapore lotij uenæ testis inludent, post aqua calida consouentur, nitrum & alumen scissum pariter conteres diligenter, & admixto oleo testes perunges fricando. Si molares huiusmodi rei proditur † malentis heminā unā decoquis, admixto uino mortario teres, cipe si folia & q. molliissime pariter trita commiscis, tantundē etiā suille adipis adiunges, unumq; uetus desuper sparges, panno inlinitū testibus apponas, donec sanitas procuretur. Si tardius dabitur sanitas, testes sub testilatis cauterijs urito, uel leuiter scarificato.

Detumore testium. Caput .VIII.

Hordeum cōburito, pulueresq; ex eo trito suille adipi misceto, ex quo medicamento mane et uespere testes illinito. Physicum autē creditur, testes animalium ablutos canino felle sanari. Alij authores aqua calida testes cum dolenti souendos esse duxerunt, suffumigandos etiam uiridis folijs, cypressiq; arboris specialiter mederi testibus creditur. Sed si defuerit testes ardentes nihilominus in aqua calida mitti, & inde suffumigari, post creatas cimolias cū stercore bubulino ex aceto acerrimo calentes induci, & quotidie reuocari, quousq; sanitas subsequatur.

Si natura reuocari non possit. Caput .IX.

Si natura iumento excedit, & reuocari non possit, in aqua frigidissima constituendum est, & ibi souendum, & sublitam manum in anum eius iniicies, & contra uesicam fricabis, post diligenter cooperies ne perfrigescat. Potiones dabis, stercus suillum quotidie ex uino, aut in aqua dulci, donec liberetur.

Si fumentum sanguinem minxerit. Ca. X.

Si iumentum sanguinem minxerit, uel adsellatum fuerit, hac ratione curabitur: De superiori uena sanguis auferatur, aphodilli quoq; herbarum radix teritur

dixeritur. & cum uini albi dulcis duabus cotylis per os infunditur, quæ glutinosa uideatur. Prodest etiam farinam triticeam cum adipe suilla et puluere corticis mali granati decoquere, & non crassas portiones, sed liquidas per os fundere, et non solum à cursibus, sed etiam ab ambulatione abstinendum est, ut glutinetur uena quæ interrupta est. Contingit enim cursu uel saltu, ut intrinsecæ uenæ rumpantur, quapropter rebus stipticis, & his quæ cōsolidationem faciunt curentur. Super renes hoc anacollima oportet imponi; bulbos tascedeas uiuas contusas, allia quinque, anagallici libram, quæ omnia pariter bene trita commiscis, et renibus eius imponis. Quod prodest etiam illis, quibus eualsi uel emoti sunt renes. His autem quibus per nares effluit sanguis, puſca frigidissima caput eius fouebis, modicum salis adijcies, post anacollima in capite & in temporibus oblinis, & in medicamento constrictis uenis fluxum sanguinis reprimis.

De dysenteria.

Caput .XI

Si dysenteria iumentum apprehenderit, reuersatur eius extalis, quæ ut curetur circumsecanda est cautissime, ne intestinū, quod præpositū est extali, frangatur. Procidit intestinū à cōtactu, uitæ periculū facit si tangatur: quod semel nō redit, & sic remanebit, & paululū exit extalis supra.

Si otiosum animal sanguinem mingat. Cap. XII.

Animalibus otiosis & pigris contingit expletura sanguinem mingere, cum hoc quod abundat, erumpendi per urinā inuenit uiam: attenuati & exhausti animalis interdū est in terra sanguinea. Quod accidit, aut ex nimio ascensu, aut labore ponderis, aut nimietate cursus sodalis. Qui ex delitijs aut abundantia contraxerit passionem, de matrice auferunt sanguinem: attenuatis uenas laxare cōtrarium. Vtrisque tamen salutaris est potio, si lac caprinū cum à matricibus obolis, & uitiolaris herbæ succo pastillos facias, ex quibus unum per os frequenter infundas. Certissima quoque ad ipsorum salutem potio prædicatur, si draganti unciam semis, mespili & steracis tres, nucleos pini hos purgatos ducentos decē infundis in uino optimo, ac diutissime, post ad magnitudinem nucis auellane cum apibus attritis et uini sextario resolutos dabis ad cornū, & faucibus digeres per dies continuos septem, quod etiā omnibus prodest cum fabæ magnitudine cum ouo dedisse.

M

Si animal

Si animal sanguinem uomat. Caput .XIII.

SI uero sanguinem uomat, oportet genestæ succum cum uino atq; porri succo lixiuo oleoq; permixto faucibus infundere. Aliquando animalia sanguinē uomūt, q̄bus hac potio succurritur: absynthiū pōticū et spicā nardi equis pōderibus in cacabo nouo cū aqua decoques, & dabis in potu.

Si percussa uena claudī non possit. Cap. XIII.

SI sanguis interdum nimis per uenam cum percussa fuerit ut claudī nō possit crūpat, remediū est, stercus ipsius animalis supponere fluentibus uenis; Aut si perseuerauerit, urere cauterio subtiliter ne nerui lādātur. floccum etiam competenti oleo tinctum uenæ admoueto: etiam assem lineum in uena qua sanguis profluit, ponis, & ligas, præsens est remedium.

De indignatione uesicæ. Caput .XV.

Vesicæ indignatio generatur ex plurimis causis. Quapropter urinae difficultatē, immo præsens discriminē inportat. De qua ualitudine diligēter tractari cōuenit, ut passioni competens medela succurrat: quæ his agnoscitur signis, mingere nō poterit, omnia crura fleētūr, dimittitur uenter ad terram. Et si difficulter mingit dysuria appellatur. Sed quando guttas per uereturū mittit cū labore, strāguria dicitur. Quū in totū non potest mingere dysuria appellatur, & uicinus est mori. Propter quod extēsiōnes & tubercula nascūtur in dorso, & præfocatio circa fauces ex dolore uentris. Cui hac ratione succurris: de pectore uenas pungis, & sanguinē quantum uidebitur detrahis, & sic accipitur lauamentū. Præterea manū tepidam cū oleo in anū mittis, et si qua stercora iueneris intus, quia impedimentū præstant, attrahis. Post cū libra olei, salis triti plenū acetabulū mises, & calefactum iniicies in anū, iumeto in locis pronis posito, ut facilius ad interiora descendat, dulcedo enim sequitur ac solutio uētris, & dolor mitigatur. Quæ remedia si tarde subuenerint, manus & brachia perungito, & cū magno sensu atq; cautela manus inicito, et in partē dextrā et in partē sinistrā, et sic manū plenā leuiter præmito, ut incipias in hac procedere, & sic liberabitur. Valde spina est cōtrariū. Ex his causis passio ita descendit, si iumentū in ope aut cursu magna pte duci cogatur, et urinae facili spaciū denegatur, et a uesicæ meatu usq; ad

usq; ad ueretrū nascitur tumor, & cū dolore egestionis foramē angustatur. Ediuerſo, si iumentū exerceri solitū, diebus plurimis steterit, indigestione nascuntur spurcitie, & humores efferūtur usq; ad uescicā, cōpunctiones etiā et morsus urinali fistula præstant, ex quo stranguria plerūq; cōtingit. Ex perfrictione & indignatione dysuria solet uenire, cum nimio rigore meatus intumuerit. Et ideo calefactionibus diuersis à frigore soluenda est iniuria celeriter. Interdum & indigestione hordei, & cum aquam frigidā auidissime biberint, dolores ueniris animalia patiūtur, & propter uicinatē commota uescica stranguriam sustinent. Aliquando & stercus pullinū, & alia noxia in cibo sumpsa, cum inflationem fecerint, impediunt minctionem. Bestiolæ etiam quæ appellātur uulpestres, araniæ similes, cum deuoratæ fuerint animal præfocant. Aqua quoq; cæno uel limo turbida si bibatur, meatus impedit minctionis. Vermes quoq; uel lumbrici in intestinis cum ex ulcere uenerūt, uescicas ledunt, & dupliciter animalibus discrimen important. Quod his deprehenditur signis: animal quod tardius mingit latra sibi scalpit uel terrā mordet, scias eum uermibus uel lūbricis extorqueri. Cui hac ratione succurris: brassicæ folia subtilissime cōtundis & cōmiscis boni uini cotylas quatuor, et per sinistram narem infundis: laser quoq; syriacū & nitri puluerem cum uino decoquis et per os digeris. Inambulationibus et leni cursu exercebis in loco molli uel herbido, uel ad aquam leuiter abeuntē ad urinam inuitabis. Si ubi aliquod aliud animal minxerit, teneatur, facilius prouocatur. Quæ præmittuntur ut ueniatur ad curas: aqua enim calida diutissime lumbi fouebuntur & renes, tunc hauenam agrestem ex uino dulcissimo duabus cotylis decoquis, & per sinistram narem infundis colatos humores; ficus præterea optimas decoques in aquæ cotylis quatuor, mixtoq; nitri puluere similiter diffundes. Aliū quoq; cum uino decoctū, & per sinistram narem infusum producit urinas. Memineris statim cum in passionē ceciderit, hordeū eis subrahendū penitus & potus, herbas uirides uel farragnes ad sustentandum dandas. Sarmatarū autem equitatus ueteres plurimū ualuerunt, usus inuenit, ut animalia à collo usq; ad pedes inuoluantur de sagis, suppositisq; carbonibus uiuis, addito castoreo, suffumigentur, ut totum uentrem testiculosq; eorum castorei fumus euaporet, & confestim detractis carbonibus cooperti deambulant, & mingunt. Allumen salsum, & sale fricato admixtioque oleo.

M a & melle

Et melle collyrium longum et tenue facito, et in ueretri ipsius foramine inseruo, continuo prouocabitur. In ano panacis quantum digiti minoris extremitas est, dabis. Alij cepas acerrimas et leuiter contusas tres aut quinq; ponunt in anũ, et sic deambulare faciunt. Ad urinas inuentus est qui affirmat et ungulam equi ipsius radi et teri cum uini sextario, et per nares infundi ad celerem mictionem. Si non tali ratione prodesset, betas et malas decoques, et aquam earum calentem cum melle ad unũ sextariũ naribus infundes. Si tempus uirides denegat cibos, foenum mellicrato aspersum praebebis; uel succum ptisanæ hordeaceæ cum mellicrato similiter dabis. Aliquantum rosamarinos decoquunt, et ex ea calida fouent. Alij cimices tritos in nares animalis mittunt, et aliam super naturam qua mingunt cõfricant. certissimum dicitur. Porros decoques, et succum eorum exprimes ad sextarium i. et cũ uini ueteris et hemina olei acetabulũ permisces, et per narem dextrã dabis, deambulãdo ducis. Vulgare et uerũ est remediũ, lutũ de uia ex lotio cuiuscũq; equi factum, uinoq; permixtum et colatum naribus infundas. Apij radices aut mellicrato decoctas praebebis, pulueremq; thuris omninq; crudũ cum uino dulci permixta et calefacta supra renes et ilia inungens consoueabis. Ex melle quoq; decocto et sale collyria longa et tenuia foramini immittuntur quo emanat urina. Musca uiua et loco ipsi immittitur, uel mica thuris apponitur, et de bitumine collo inseritur, ut prouocetur urina.

De fluxu uentris. Caput .XVI.

Quibus modis strictus uenter solui debet saepe prædictum est, Nunc exponendum est quemadmodũ, si solutus, postea restringitur. Et enim hoc animalibus periculosum nimis est, nisi uelox medicina subuenerit, cuius necessitas de experimẽto principali tenendũ est. † Clistere ueniam ex uino austero dabis, caryotas tundis et gallas syriacas, et exinde datur potio salutaris. Talis quoq; subuenit cõpositio: ceræ uncias 2. lardi librã unã, pipervis uncia semis, picule semiuncia diligetissime tundes, cassie uncia semis trita pariter conspergis, offas facies, solito more intinges in cera cũ remissa est. Sic quoq; digeres stercoris ouis libram, et in aceti et mulsæ sextario per cornu dabis, herba rubea restringes, si dederis in uino spongiã. Offam intinges in pice liquida, post cõbãres, farinãq; eius cum uino austero defundes,

defundes, farinæ triticeæ heminas quatuor pariter cōmises & digeres. Nitrum quoq; si potest fieri, uirgineum diligentissime tritum & in puluerem redactum, cum aceti semiuncia diligentissime tritum dabis heminam. Puluis ex pūnice datus cum uino in potu, mox medetur.

De uerrucis.

Caput .XVII.

Alijs quoq; partibus corporis nascuntur aliquando uerrucæ, & uitiū difformitatis important, hac ratione curandæ: lino subtili constringentur ipse uerrucæ, in causticum crudum imponitur & sponte decidunt. ferro etiā præciduntur, & de cauterio leuiter adusta sanantur.

De uitijis coxarum.

Caput .XVIII.

Misera sit coxa, cui de uenis femoris sanguis emittitur, & in uase diligenter excipitur, admiscetur etiam puluis sulphuris, nitri, baccarū lauri, simul tritis, & contra pilos diutissime perfricatur, & per triduum sic permanere permittitur. Aqua etiā, in qua uerbena coctæ sunt tepida (datur in die) sōmētabis: pedes quos sanos habet glante ferreo, uel si de fuerit, sparteæ calceabis, cui lemniscos subijcis, et addita fasciola diligentissime colligabis, & suppositiciam facies parti illi quæ misera est, ut planas ungulas possit ponere, in crisma etiam perunges in sole non minus quam hora, contra incisuras quatuor foraminibus cautere pertunde, & pannos uel lemniscos ex aceto sub cute per foramina traice per triduum, post traumatico illi lemniscos pānos diebus nouem per eadem foramina traicies, uel calida uerbena utaris, et sic lemniscos subijcias. Undecim quoq; lemniscos inducis et in cretas locū ut cutis ad pulpas adhæreat. Cū cicatrices se clauserint, causticū imponunt. Hac ratione emota uel læsa coxa sanabitur. Vel si coxa se læserit, uel à Mulomedicis dicitur filius læsisse, certior & facilior curatio inuenta docetur, & probata. Nā dudū claudū aīal in sole ponūt, uino & oleo calefacto calefaciūt ipsum, hoc est, iuncturas coxæ diutissime confricant, donec sudet. Tunc animal capistro trahunt, & sensim currūt, alius lorū uel funes tenet, lassus sequitur, & subito dum animal currit, recta ad se coxas ipse cum impetu trahit, si sonuerit, scias loco suo redisse, paululumq; cessabis, post sensim deambulando tentabis. Si ad locum suum redierit, retractos pedes ponit, & minus claudicat. Vtius animal non conuexabis, sed per triduum sōmen-

ARTIS VETERINARIAE.

tabis calida uerbenatia, post causticum induces. Quod si prima die iunctura componi non potest, secunda die simili ratione coxas sepius trahis, donec reuertatur ad locum. Quicquid autem uexatum uel remotum fuerit uel icturo tæ, aut quocunq; alio casu, in prioribus uel posterioribus partibus, uel articulis, uel genibus, hoc anacollima constringit & consolidat. Bulbos rufos triginta, cochleas uiuas triginta, anagallici libram 1. plantagnis uiridis manū plenam diligentissime contundis & misces, additis tribus ouis, cū stuppa imponis, & colligas. laxata constringet, & tumefacta sedabit.

De laccis gambarum. Caput .XIX.

Si iumento laccæ enatæ fuerint in gambis, his agnoscitur signis: Dextra ac sinistra ad similitudinē uescicæ inflabitur cutis. Curādū est aut hac rōne qua flegma in genibus diximus oportere curari. Est & alia medicina. Lentes quæ supra aquā natāt colligis atq; cū tundis, additāq; ueteri axungia colligabis. Vitiū exicare prohibetur. Si gambā uel armus aliquo loco ex ictu aliquo tumere cœperit, cretā cimoliā & lubricā ex aceto acerrimo miscebis & oblinis.

De gambofo. Caput .XX.

Si gambofum factum fuerit aīal, & recens passio est, de tibia sanguinem emittito, lanā succidā circūligato. Caue ne fomentis aut cauterio tangas, utrūq; enim in tali curatione contrariū est. Malagma cruda uteris, tertio die semper soluis & curas. Cū uideris aīal profecisse, causticū inducis. Si quod iumentū coxā fregerit, aut supragambā, scias nō posse curari. qā paratesiste ligaturas tenere non possunt.

De his quæ læduntur à rotis. Caput .XXI.

Si iumentum aut rotæ, aut axis ictu fuerit elisum, in recenti lanam succidam ex aceto & oleo colligabis per tridū, post ficos duplices & nitrum pariter tritū imposito, die tertio soluito ac renouato. Si nihil profecerit, malagma tetrapharmaci imposito per tridū. Si & ipsa tardauerit, imposito malagnā quæ dicitur meliacinus, usq; dum sanctur.

De Syrmatico. i. quod coxā subito trahit. Ca. XXII.

Syrmaticū iumentū his agnoscitur signis: Prodiēs de equili, uel de loco ubi steterit, coxā trahit, & trāsuersum ungulā inflexis coronis terræ superim

superimponēs ostendit, & syrmaticū (et ragdorū paleis quæ trahūtur) dici-
tur. Sed quāvis alienata horū, uel emota coxa uideatur, si super (tempaueris ^{als. si super ip-}
pedes cessis) compellātur, continuo emēdabitur gressus, & sine claudicatione ^{sum cess.}
rectus incedet. Ex hac autē ratione contingit, si cōmissurā uertibuli ex corru-
ptione corporis, uel perfrictione natus humor intrauerit, tunc se desundit ad
nervos, & eos reddit immobiles, & uelut alienatos. quæ hac ratiōe curātur:
Sāguis ei de subgamba detrahatur copiosus, in quo admisces sal, sulphur, ma-
rinas cochleas, mannā thuris, seclam, nitrū, baccas lauri, æquis pōderibus, cō-
tusa oīa atq; cribrata, uino quoq; ueteri et oleo miscbis cū sanguine ipsius; q̃
unctiōe præpata, post inflationē illinis. coxas calida in qua uerbena decoctæ
sunt, interposito triduo, diutissime cōfuebis, post unctionē renequabis. Si ex
hac re plenā nō recepit sanitatē, uulnus uris cauterio in ipso uertibulo. Simi-
liter scyathicis fieri consueuit. Quæcunq; autē de oxoenis, caterisq; uitij arti-
culorū, uel de ungulis priorū pedū nunc dicta sunt, scias etiā in posterioribus
debere seruari.

De morbo alienato, ex quo infecta animalia moriūt. C. 23

Alienatum morbum auctores uocauerunt, quoties hæc signa proce-
dūt: Patentes oculos animal habet, nec sentit hoīs aduentū, qbus et
labra, & ipsa orificia intumescunt quasi ab aliqua bestiola cōtacta.
Quē morbū alij auctores orabum nūcupauerūt. Est autē nequissima passio.
Primo q̃ pestifero transitu contagionē spargit in plurimos: Deinde q̃ impi-
tos decipit specie sanitatis. Nā resicta et bene curata animalia ex hac passiōe
subito inflata moriūtur. Alienatus autē uocatur q̃ aialibus eripit sensus, Mal-
leus, qđ pestilētiæ internociūū contagiū facit. Plerūq; autē uiscera interius
uermibus cōsumit. Quorum morfu pertuso aqualiculo aīalia suffocata subito
moriūtur. Sed si uelocior medicina succurrat hac ratiōe saluātur: de cervice
sanguinē detrahis, potionē cōponis huiusmodi: Gallici lib. unā, hyssopi librā
1. abrotani librā semis, aristologie rotundæ lib. semis, mānæ succari uncias 3.
trixaginis uncias 3. Quæ omia cōtundito et cernito, ex aqua mulla copiose
decoques, et aīal diebus pluris potionabis egrotū, sed q̃a plerūq; huius agri-
tudinis pestilētia trāsīt in p̃ximos, totū gregē si inciderit, ut aut singulas he-
minas singulis digeras potionare te cōuenit. frequētissimis etiā suffumigatio-
nibus, stagnare p̃iter & curare, sicut in malleo superius constat expositum.

Quibus

Quibus usque adeo mutanda sunt pascua, ut si fieri potest, in alias transmittenda, et labore da sint regiones. Nam qui transeunt in tanis et in ipso anhelitu insciant uniuersa. Velocius autem curabuntur, si separata fuerint atq; translata.

De roborosis. Caput .XXIIII.

Roborosa passio dicitur, quæ animal rigidum facit ad similitudinem ligni, cuius hæc sunt signa: Totum corpus astrictum, extensæ sunt nares, et aures frigide, immobilis ceruix, os constrictum, caput extensum, colligati armi uel crura, pedes etiam constricti ut nulla commissura flectatur, cuius caput si erigere uolueris, non poteris, oculi præcluduntur, spina prærigida, et ideo difficile erigit caudam, ut eam flectere et mouere non possit, dura illa, astricti sunt renes, cubare penitus non potest. Cõtingit autem hæc passio ex nimia perfrictione uel spasmu nervorum, uel tremore, unde contenti dicti sunt. Plerumq; in hanc uoletudinem incidunt, qui cum ab igne castrati fuerint negliguntur, et inambulantes frigore leduntur. Quorum nervi recenti dolore et frigore compelluntur, et spasmus patiuntur, et obdurefcunt in robur. Ediuerso etiam altius quàm expedit in pedibus ista iumentis, uel quocunq; alio loco contactis nervis patiuntur spasmus, et robur incurrunt. Ex nimia quoq; pruina, uel si in nimio frigore sudabunt, uel e calidis stabulis producantur in frigus, fieri adsolent roborosi. Sed si à posteriore parte fuerint comprehensi, ut morbus desinat in lumbos, opisthotoni fiunt, calesfactionibus tamen, unguentisq; curantur. Si quod uero robur à priori parte comprehenderit, ita ut os aperire non possit, desperanda sunt. quia constrictis dentibus, fame perire coguntur. Quæ autem ex toto corpore equaliter periclitantur, ita ut ex aliqua parte os ualeant aperire, tam diu unctionibus calidissimis perfricanda sunt, donec sudent, coopertaq; sags copiosissime, loco calido statuuntur, ignisq; iuxta ea fieri consuevit sine fumo ut amplius sudet. Surculos quoq; laureos ualidiores in os eorum inter malas mittito, ut rodendo eos exagrent maxillas et calefiant. Fabas quoq; solidas cum baccis lauri mixtas ieiuno dabis. Aquam quoq; calidam offeres ad potandum. Ventrẽ ipsis cum mulsis calidis, admixto castoreo, clystere purgabis; oleum quoq; optimum cũ succo ptisanæ mixtum per narem sinistram defundis. hordeũ emollium cum surfuribus admixtum dabis ad substantiam, donec sanetur. Ali-

quantū dixerunt oportere eos aere candenti, in arena fluminali uel martina colligatos obrui, ita ut caput eorum extet & nares, & tam diu deteneri donec sudet. Sed ex superscripta cura sæpe plures constat esse sanatos. Quod si ex hac re non profecerint, ures eius ceruicem dextera sinistraq; decussatim, saccellationem ex furfuribus supra totum tergum calidum imponis per triduum, & hac unctione quotidie uteris in sole si caluerit, uel in calidissimo loco; Cere libram, affronitri libram, resinæ terbetinæ selibrā, galbani librā, castorei selibrā, opopanax libram, piperis unciam, medullæ ceruinæ uncias duas, olci ueteris uncias duas, & semis, uini ueteris optimi quantum opus fuerit admisces & uteris. Præsens tamen experimento remedium est, si picem liquidam cum oleo & uino ueteri decoquis, calētīq; medicamine iumentum perungis. Ex qua unctione & auriculas cum oleo tepesfacto oportet infundi, ut sanitas matura proueniat. Sed ut ueræ eorū calefiant intrinsecus, & conceptum frigus exudet, necessaria potio est, quæ roborosos, tetanicos, & epistotonos salubriter curat, clabi ⁊ seminis uncias 2. cimini alexandrini uncias duas, agallici, castorei, abrotani uncias singulas, trixagnis uncias duas, manne croci unciam unam, succari unciam, hyssopi unciam unā, piperis albi semiunciam, quæ omnia diligenter tusa atq; cribrata redigantur in puluerem, ex quo bina cochlearia lassus & periculose se habentibus cum succo ptisanæ tepidæ propinatur: forcioribus uero cum uini ueteris calida hemina defunditur in os, nunquā tamē sine oleo propter leniendā potio nis austeritatem, & cannalem faucium mitigandum. Alij auctores eiusmodi passionem hac dicunt ratione curandam: De temporibus sanguinem detrahes, excipiesq; diligenter, iniecto nitri puluere, sale, atq; castoreo, animalia perfricari, & loco calido statui oportere, atq; hanc offerri potionem: lac caprinum, rutam, baccas lauri, piper album, oleum, et sabbas solutas: hordeūq; etiam datur ut agitet edēdo maxillas, die tertio de cauda sanguinem tollunt, & renes calidis unctionibus fouent. Interdum etiam in balnea intromittunt animalia, ut diligentius conualescant. Dant etiam quotidie potiones sustes quoq; uel de salice, uel de robore in os mittunt, ne maxillariū usus indormiat. Si melius habere cœperit, post duodecim dies coopertū exercebis ut sudet. Si ista non ualuerint, uteris superius declaratis. Pleriq; asseuerant, ficulneas frondes roborosis oportere præberi, quæ naturaliter calent. Potionem

quoq; per os dandā: opopanacis uncias 2. storacis uncias 3. gēlianæ uncias 3. mānæ succari uncias 3. myrrhæ scrupulū 1. piperis lōgī scrupulos 2. cum uino ueteri tepido, atq; ad cornu digerere. Hac etiā unctione ad curandū robur uel expellēdum frigus utuntur: Cere librā, resina terbenīna uncias 8. opopanacis uncias duas, medullæ ceruinæ uncias duas, storacis uncias quatuor, baccarum lauri selibram, olei pini prout opus fuerit: quæ omnia in unum adiecta in aqua decoquunt, & perfricantes inungunt.

Dehydropicis. Caput .XXV.

Hydrops nō leuius animalia quā homines frequēter infestat. In talibus namq; uitijis cū digestio ciborū plena non prouenit, humor noxius perniciē corporis, tumorēq; cōsueuit inferre. Quā ualitudinē hac signa demonstrāt: Turget uenter & crura, testiculi, scapula, latera et tergus inflātur usq; eo, ut nec ī capite eius apareāt uenæ. Cui cū sublinguā tetigeris subtuſſiet. Hunc ambulationibus breuib; operitū grauioribus sagis donec fudet exercebis in sole, et aduersum pilos per totū corpus postmodū cōfricabis. Cibū daturus radices cū folijs suis, quia & purgationē faciunt & uitio medentur: scēnūq; cōpersum aqua nitrog; præbebis, die ac nocte maceratos lupinos in aqua, rursumq; siccatos, præbebis in cibo. Radicē quoq; cucumeris syluatici uel folia, quæ uentrē moueant, eidē dabis ut purges. Quæ curatio si tardauerit sanicatem, euocandus est humor. Quatuor itaq; diguis ab umbilico ad ueretrū uersus sagitta pungis, & periconiū ipsum pungas, sed caue ne intestina tangas, et animalia perimas, subiycis fistulā centimaiē et patieris humorē currere quantiū estimaueris necessariū, quē in uase excipies. Cum fistulam abſuleris duo uel tria grana salis in plagā inseris, ne claudatur. Insuper & pastillos imponis. Alia uel tertia die apoforesim quasi facturus, denuo fistulā appones, humorē eijcies, donec partes totas exiccet. tunc uulnus curādū solēniter, potiōesq; catharticas pōdabis frequēter. Inter diu usq; dū fudet exercebis. Quāto fortius esse cœpit, tāto diligentius est curādū, et semper abstinendū a potu, ut tepidū et modicū ad sustēnationē bibat tantū.

De sarcostis. Caput .XXVI.

Sarcostis quoq; talis est passio: Iumentū cū biberit inflatur & sufflat. hac eum ratione curabis: cineris uel lixiuij sextariū unū, seminis plātaginis unncias 5. cōteres & cum uino dabis & oleo celeriter, usq; quo resideat in

flatio. Alij auctores asserunt ab umbilico duobus digitis cōtra pectus plagā fieri debere, & fistulā poni, & educi humorē uel aquā noxiā usq; ad sextarios tres, uel amplius si maior est tumor. Sed cautius est per partes sepe tollere, ne repētina exiccatio periculū faciāt. Potionibus utēdum esse dicunt, quæ urinas moueāt, frequēter etiā cōfricandū esse ut sudet, pro sceno gramen accipiet & pro hordeo ciceres infundi. Prodesse etiam dicunt si inter pigmentarios frequentissime deambulet animal: quia diuersi odores latenter pulmonibus prosunt. Potionem etiam huiusmodi dant: Petroselinum & mala grana cōtundunt, et cum uino ueteri per os digerunt. Apium quoq; quantū appetere uolueris offeres ad edendū. Asparagi syluestris radices uncias 2. cū uini ueteris sextario decoquis, ut ad tertiā redeāt, et ad heminā p̄ os digeres. † alij apponere

De tympaniticis. Caput XXVII.

Tympaniticus quoq; hydropico similis est, sed alijs agnoscitur signis: uenter quidē eius crescit ut hydropici, & ceruix fit rigidior, sed nec testiculi, nec crura intumescūt. Cōuenit itaq; tympanitico calidū cine rem cū liquamine optimo in panno, uel linteolo umbilico uel uentri subponere, & fascijs colligare, sed à pluribus aīal tenendū est ne luctādo moueat ligaturas. Radicē panacis sil. gallicū pariter cōteres, et cū oleo uinoq; tepescito p̄ cornu faucibus digeres. Pretereā tymū syluestre & etargū in uino decoques, et singulas heminas per triduū dabis. Tympaniticū hæc signa demōstrāt: ciborū bibēdiq; fastidiū, exiguus somnus aut nullus, si p̄ nares mucus experint emitte desperandū est, si mūdās nares habuerint hac ratiōe curabis: cremorē ptisanæ et defruti binos cyathos p̄ triduū dabis tepidos. Pretereā hyssopi uncias 4. alei uiridis manū plenā, palmas numero uiginti, fœnigreci cyathos sex, aquam cisterninam & uinum odoratum uetus pariter mīscēs, diligentissime decoques, & in potionem per triduum dabis.

Delienosis. Caput XXVIII.

Lienosi ut manifestū est periculum, ita manifesta sunt signa. Nam oculi inuertuntur & suffusi sunt sanguine, tardius ambulant, collum habent exiēsū et fit deterius et rigidius. Quæ passio principiū indicat roborosi, quorū latera intumescūt, siue ceruicis media spina ad similitudinē aluci sit cōcqua, astringūtur aliquādo maxille, quod uicū cōsuevit inferri

ARTIS VETERINARIAE

ex nimia perfrictione, cū animalis dorsum aut frigore, aut pluuiā; aut grā
dine cæditur, aut nubibus. Cuius ista curatio est: De cauda parum sangui
nis demis. Nam si amplius tuleris infrigescet, & rigori additur rigor, admi
sces in eum merum, & oleum, & calefacies, & statim hac dorsum & cerui
cem perunges, sacellum quoq; ex fursure calidum impones, ut totam spinā
tenere possit & lūbos, altera die extergebis diligenter & unctione eadē per
fricabis, supra quam similiter cum fursure calentem sacellum imponis, hoc
usus unguento: medullæ ceruinæ libram unam, manna thuris uncias qua
tuor, depli uncias tres, castorei uncias tres, opopanacis uncias tres, resinæ
frixæ uncias 3. apoximæ uncias 3. resinæ terbeninæ uncias 2. ceræ librā
semis, olei laurini uncias 8. (sepi caprini libram) olei glaucini sextariū 1. ex
(olei cyprini) his sicca quæ fuerint tundis & cribras, cætera super carbones soluis, quibus
cretā admisces, & leuiter decoquis in uase nouo, uncturus cū necessitas po
stulauerit, reponis ac seruas. Hac quoq; potione intrinsecus curabis: absyn
tij unciam 1. aristologiæ uncias 3. betonicæ uncias 2. petrosilini uncia 1. et se
mis, trixagnis uncia 1. thuris masculi uncias 3. castorei uncias 2. mānæ suc
cari uncias 2. contundis piter et cernis, et ex aqua mulsā et oleo diffunde p
fauces, absq; dubitatiōe curabis. Alij auctores asserūt sanguinē de brachio
lis auferendū, et aīal abstinendū ab hordeo, oleū, nitrū, marrubiū, sanguinē
de brachiolis æquis ponderibus tritū cum absynthio pontico & uino auste
ro per os dandū, & cum biberit deābulet, & spongijs calidis foueatur, &
pressa manu diutius perfricetur. Si uentris permanferit tumor, pectus cau
terijs inurendum est. Post quinq; dies ternos digitos subijcis hac atq; illac
inurendum est iterum, obseruabis autem ne uenas forte comburas.

De implecticis. Caput .XXIX.

Implecticus autem quia similem sustinet passionem, perfricandus est un
ctione superius memorata, & si necessitas postulauerit inurendus.

De phragmatico. Caput .XXX.

Si phragmaticum erit iumentū, his agnoscitur signis: febricitabit, oculo
los introrsum reducet, aures tensas habebit & rigidas, terram pedi
bus tundet, quod hac ratione curabis: Sanguinem detrahas de matrice,
adiunctoq; oleo & uino tepescies, totumq; iumentum contra pilos diligen
tissime confricabis, loco tepido statues, & curasti.

De eo qui aquam timet. Caput .XXXI.

Aliquando iumenta aquas timent, quæ dicuntur, hydrophoba. Signa huius hæc sunt: uenas omnes habebit extensas, sudabit suffusus oculis, tremorem frendorem, quæ patietur, illidet se parietibus; ex qua passione conuertere consuevit in rabiem. Cui hac ratione succurris: Sanguinem ei de femoribus detrahes, à cibarijs abstinebis, in loco sic clauso ut lumen uidere non possit constitues, magno silentio aquam in situla uel alueo ita apponis ut non audiat sonitum, manipulum rutæ deterito, et baccas lauri xv. olei rosati librā, aceti unciam i. commisceto, caput et nares diligentissime perunges, et sanabitur.

De Spasmo. Caput .XXXII.

Spasmus certum est animalia sustinere, quæ necessitas his declaratur indicijs: Subito concident, et articuli eorum extensi sunt, et toto corpore palpitant, aliquando etiam de ore spumam emittunt. Quibus escam dabis pusca nitroque conspersam, cucumeris quoque syluatici puluerem, et nitrum trium per septem dies in potionem dabis ut purget. Sanguinis quoque marine te fluidinis dimidiam cotylam, aceti tantundem, laseris aliquantulum pariter mices, et suffundis in nares. Vtile dicitur terga eorum oleo et aceto et nitro frequenterissime confricari.

De Epilepsia. Caput .XXXIII.

Quadam ratione lunari animalia sicut homines frequenter corruunt, et intermoriuntur. Quorum ista sunt signa: iacentia contremiscunt, saliuæ per os desluunt, desperata pro morituris (frequenter) consurgunt, et pabula appetunt. Cartilaginem naribus eorum digito tentabis, quanto frigidiores inueneris, tanto plus casurum scias. Si minus frigida fuerit, rarius cadet. Cuius ista curatio est: De ceruice eius copiosum sanguinem tolles, post quintum diem de temporibus, loco calido tenebrosoque constitues, totum corpus thermantice confricabis unguentis, cerebrum quoque eius et auriculas pice liquida cum oleo laurino admixto largius perunges, et mittes intrinsecus, caput etiam aluto et cerebellari communies, potionem autem cathartice dabis eiusmodi: Radicis uncias 2. panacis radicis unciam i. diagridij unciam i. cum cucumeris syluestris unciam. quæ omnia bene trita commisces, cum mellis sextario i. decoques,

ex quo cochleare plenum in aqua calida sextariū, et olei drachmas 3, mittis
 & per os defundis. Caput quoq; eius sæpius curabis. Radicē dianariā, id est
 herbe artemisiæ, in puluere rediges, et p fistulā naribus insufflabis. Radicem
 quoq; laseris tunjam si naribus defuderis, eadē ratione proderit. Si aut passio
 perdurauerit, caput eius ures, ut apioso fieri consuevit.

De eo qui aquam reuomit. Caput .XXXIIII.

Animalia sæpe aquam reuoment quam biberant. Quæ passio è nimia
 perfrictione descendit, cū stomachus paralytim ex frigore sustinuit.
 Sed hac ratione curantur. Sanguis de ceruice detrahatur, potiones
 thermanicæ propinantur, unctionibus calidissimis arui pectusq; confrican-
 tur, purgatur p nares caput, & si necessitas postulauerit, etiam sinapizantur.

De Sideratitio. Caput .XXXV.

Sideratitia iumenta dicuntur, cum uenas uacuas percusserit frigus, aut
 æstus, aut impleuerit cruditas, aut ieiuna bulmū fecerit. Redditur enim
 stupidum animal, & titubans ambulat. Quod mollibus cibarijs, leni-
 busq; potionibus curari oportebit, ita, laseris unciā 1. & heminā mulsæ, suc-
 cumq; ptisanæ miscebis. Et si ex frigore causa est, cum uino & oleo tepido da-
 bis. Si ex æstu, cum rosato præbebis. Si ex cruditate, abstinebis à cibo. Si de
 bulimo, ciceres offeres largiores.

De percussio à sole. Caput .XXXVI.

Sol quoq; canicularis ardentior, animalia pcutit in cerebro, quibus de
 temporibus sanguis emititur, & simili ratione curantur. His aut ostē-
 ditur signis, quia deiectum caput portare coguntur.

De Cruditate. Caput .XXXVII.

Cruditas iumentis generat ægritudinem, quæ hac ratione dinoscitur:
 modo in unā partē, modo in aliā ambulātes inclinant. Quorū ista est
 medicina: Sanguis eis de ceruice detrahatur, à potu et cibarijs abstine-
 alis (cōpellēte) tur. Si æstas est, refrigeratorias accipiat potiones, nō parū natura cōpellitur.

De Bulimo. Caput .XXXVIII.

Bulimum animalia sustinent frequenter ex fame, frequenter ex lassitu-
 dine

dine. Cuius ista sunt signa: Anterius fugiunt, incertus effusus, tremebit. Quae hac ratione curanda sunt. In primo omnium defricetur ex uino oleoq; tepesfacto, cum t̄ mūdīs mollem partem uino infundis, & cū eodē confricabis. Si ilion fecerit, per cornu digeres & reparabitur. Quod si permanserit bulimus, si mīle heminas cū sextario uini infundes, & per cornu digeres. Quod iter t̄ a gerit inciderit bulimus, ubi necessaria desunt, terram faucibus infundes, aut offas facies, & per os digeres.

De Anhelitu. Caput .XXXIX.

Quod si ex anhelitu inflationes cōtigerint, cuius causae rationes reddi non possunt, puscā calidā cum spongia cerebro eius apponis & pectori, in aures eius oleū laurini mīttēs, frigidissimo loco eū cōstitues, nares quoq; titillabis ut frequētius sternuat. quo factō, statim exhilaratur.

De aestu. Caput .XL.

Si aestuauerit animal & defectionem patietur, brassicae folia cum apio cōtundes, & cū uini sextario permiscebis, & per narē sinistram infundis.

Si uero fortius aestuauerit, petrosilini, daucij, (silis) gallici, abrotani, spī- als (similis)
ca nardi, sinoantis, æquis ponderibus tunduntur, & cū aqua mulsā data, aestū releuant. Quod si his ita membra defecerint ut cōcidant, quibusdā placet abstinere eos à potu, et sitiētes in aqua frigida una hora stare, et cōtinuo repari. Alij dixerūt hordeaceā farinā cū uino p̄ cornu faucibus infundi. Pleriq; expti sunt triticeā farinā cū aqua frigida datā continuo profuisse. Vel certe tria oua cruda cū pulegio & pusca, oleoq; permixto, faucibus infundunt.

De Paralytico. Caput .XLI.

Paralytici ad similitudinem hominum iumenta patiuntur, quae his ostenditur signis: Ambulabit (pronus) in latere ad similitudinem cancri, cer- als (prauus)
uicē incuruabit ut solent habere quibus fractae sunt, rectos pedes nō ponēt (sic egri parietibus se illidūt) cibū et potū nō recusant. Hordeū aut ipsius udu semper apparet. Hac ratioe curabitur: Sanguis ei de temporibus pte cōtraria nō qua contractus est tollitur, unctionibus hermauticis p̄fricatur, ceruicesq; eius constringuntur usq; eo, ut cretellis ex lignis impositis constricta ceruice prauitas dirigatur. Loco autem calido stabulatur sicut roborosus. Cutipsa

ARTIS VETERINARIAE

cui ipsæ potiones dantur. Si parum in totum ista medelarū adiumenta profecerint, ceruices eorū uruntur, non quia contractus est, sed ex parte contraria de cauterio accipit palmas ab armo usq; ad ceruicē, auriculæ et in tēpore uritur ad mensuram semissis. In alia autem parte temporis quasi stellam paruum cauterio facies, & in parte renum usq; ad mediam spinam uirgulas dabis solemnitè, & curasti.

De intrinsecus rupto. Caput. XLII.

Iumenta nimio saltu, uel cursu aut ruina, cum aliquid ruperint, uulsant, quorum ista sunt signa: Stranguriam patientur, excreabunt etiam purulentum, & quoties uolutata fuerint non reuoluuntur, nec se excutiant. Si recens raptura fuerit, sanguinem magis excreabit quàm pus. Quæ curantur glutinosi & leuibus cibis. Talem etiam accipiunt frequentissime potionē: Thuris masculi uncia 1. opij uncia 1. heliotropij uncia, quod intybum agrestem uocamus, rutæ uncia 1. quæ oīa diligenter trita cū uino austero quatuor mensuras adijcies, & per dies singulos dabis ad cornu, donec quæ intus rupta sunt glutinentur.

De Infania. Caput. XLIII.

Sed animal nonnunquam inuadit infania, ut præsepium frangat, seseq; morsu laceret, impetus etiam in homines faciat, auribus micat, oculis attentis & splendidis, & ex ore egerit spumam, quem caute ne medentem ledat, diligenterq; cōstringito. Sanguinē ei de ceruice & de cruribus trahito, rursumq; in tenebris contineto, donec appetat cibum. Cum cœperit ad patientiam reuocari, succum cicutæ uno acetabulo, & aquæ unā heminā admisces, & per os defundis. Post rutam conterito, & supra cerebrum ponito, caputq; lanata pelle constringito et curato, et cū profecerit calide stabuletur. Talis quoq; potio equis subuenit rabiosis: baccas lauri nouem, & alei purgati grana uiginti & unū, diligenter conteres, & cum uino ueteri candido pnam sinistram injicies.

De Pletura ex hordeo. Cap. XLIIII.

Si animalia dum sudant hordeum comederint, uel ipsum hordeū nouū fuerit, quia uehementius calet, uel copiosius quàm oportet ociosa pascuntur, absq; dubio indigestio & pletura comitabitur. Quæ passio his agnoscitur

scitur signis: Sudabit, ligati erunt armi, ambulabit incertum: Sanguinem ei de ceruice detrahes, aceto oleoq; permixtis totum corpus diligentissime cōfricabis, leuibus ambulationibus exercendum est, & ab hordeo penitus abstinendum. Cui eiusmodi subuenit potio: brassicæ folia cōtundis, succumq; ex primis, & myrrhæ puluerem, & parum liquaminis, & uinum uetus optimum misces, quod per triduum per os desundes, ita digestio & sanitas consequetur. Aliquantū præcantatione tentant afferre remedia, quæ uanitas ab amiculis solis diligenda est: cum animalia sicut homines non inanibus uerbis, sed certa medendi arte curentur.

De passione pulmonis. Caput .XLV.

Pulmone ut integri præstant substantiam uitæ, ita uitiati periculum afferunt mortis, quorum dolor manifestis declaratur indicijis: steriet, tussiet grauitè, et excreabit purulentū. Si ægritudo longior fuerit, de prioribus claudicat pedibus, grauem fœtorem naribus expellit, difficile se collocat, sed febriens præsepio incumbit, corruptum assellabit. Aliquando in corpore ipsius similia furunculis tubercula nascuntur. Quorum ægritudo difficilis est, sed hac potione curanda: thuris masculi uncias tres, hyssopi uncias 2. folij uncia 1. mannæ croci uncia 1. murræ uncias 2. diligenter tundis et cribras, ex quo puluere unū cochlear cum tribus ouis & aqua temperabis et diffundis per os. Si cibum non appetit, pro aqua lac caprinum miscebis, & addito mellis cochleario propinabis. Succum quoq; pisanæ cum oleo rosatio, & puluerem superius comprehensum cū ouis per os dabis ad cornu. Offas quoq; ex duobus sextarijs farinæ triticeæ, & uno sextario erui pollinis facies, quibus admiscebis ex superscripto puluere quinq; cochlearia. Sed septenas offulas diebus singulis digeras, quas quotidie ad substantiam dabis, donec cibos tentet appetere. Cui omnem escam propter fastidium uiridem oportet offerri, et contrario, lenticulam cum tritico uel hordeo torrefacto, cum palea dabis, ut quicquid ex diuersitate ciborum uoluerit eligat. Lac tamē recens cotidie ei conuenit dare. Deambulet plurimum, ubi coeperit conuale scere ad exercitium reuocandū est. lac si defuerit, aquā in qua eruum prius lotum die ac nocte permāserit dabis in potu. In causa pulmonum de ceruice uel de palato his sanguis aufertur, quibus (nec) fastidium euenit, sed fortiora sunt corpora. Cineres quoq; ulmi loti & infusi aqua cum uino ueteri optimo

○ odorato

odorato heminis singulas mices et dabis. Quod si uehementius uexatū et
gritudine, trāsīuit in morbū; Radicis lētisci drachmā, thuris uncias 2. murræ
drachmā, succari semiunciam, cōtere diligēter, et cū uino suffunde. Sūt et ista
remidia: Vua albā in os equi frequēter exprimatur, semen radice datur in ui
no, amygdale frixæ cū aqua offeruntur. Sed est alia efficacior potio: Carda
moni uncias 2. castæ unciam, storacis unciam 1. quæ omnia si ualidior et sine se
bre erit cum uino, si febriciens cum succo ptisanæ per os dabis.

De orthopnoico. i. plagio rigido. Cap. .XLVI.

O Rtholstophicum iumentū his agnoscitur signis: etiamsi trahatur an
bulare detrectat, anhelat grauitèr, frequēter suspirat, rūchos ducit,
illā suspendit, dū manducat tuſit. Ex quo uitio difficile liberabitur,
licet in longū protrahat uitā. Pulmo enim eorū contrahēdo se cōburit, unde
et macies cū morte insequi consueuit. In recenti tamen hanc curā festināter
adhibebis: Sanguinē de pectore detrahes, et mero oleoq; p̄mixtū atq; cale
factū pungen. Lixiuū quoq; cineris diligētissime cretū, cum oleo optimo tem
perabis, et per nares diebus quinque cōtinuus eidē digeres. Potiōnē quoq; da
bis postmodū: Sinapis alexandrini frixi, et sulphuris uiui, et murræ carda
als (attico) moni species, æquis ponderibus contundis et cernis, et cū melle (optimo) de
coquis. Ex quo medicamēto ad magnitudinem nucis cū uino nigro calido di
lues, et quotidie per os potionabis. Alij uero myrrhæ uncias 2. sulphuris un
ciam 1. nitrī semiunciam, picis liq̄dæ pusillū deterūt, additoq; melle et uino uetere
odorato, candido, p̄ nares sæpius infundūt. Curabis autē ne algeat, tempabis
exercitatioibus ut sudet: et nō solū in potiōe, sed etiā in foeno nitrū cū melli
crato aspersum semp̄ accipiat.

De Epistotono. Caput .XLVII.

E Pistotoni quoq; similis passio declaratur. Orthotonicus qui totus est ri
gidus, Epistotonus cui in posterioribus partibus morbus infederit. Cu
als (frigidas) ius ista sunt signa: Aures (rigidas) habebit, collū extēsum, oculos mino
res, tensa pellis in facie, labia grauiā, ut oscitare et apire uix possit, cibū po
tūq; fastidiet, cauda rigida, gressus incertus, mēbra distēsa, difficile progredi
tur, et frequēter in posteriōrē piē cōcidit, unde Epistotonus noiatur. Qd̄ genus
passionis hyeme curare difficile est, estate autē si diligentior fueris obūnebis.

Quæ passio p̄ æstatē his nascitur causis, si iumentū ardētissio fuerit sole p̄cus-
sum, uel si in itinere priore claudicās pede, coactū fuerit ambulare uel curre-
re, & uehementius sudauerit, et ex sudore uel armū læserit, uel supra ipsum
iacuerit ut armus indormiat. Hyeme aut̄ cū de itinere uel de exercitatione ue-
nerit, et cū sudore steterit sub diuo in frigore, aut in loco (recenti) uel humecto
aut marmorato, aut tessellato, uel si frigore maxillæ obdormierint, tūc ista æ-
gritudo cōtrahitur. Cui hac ratione tentabis succurrere: Adipis porcinae ue-
teris lib. 2. resinae terbeninae selib. piperis triti drachmā, cere librā, olei ueteris
sextarios 2. piter decoques, et calidissime totū aīal perūges. Multi cruum
decoquūt, calentēq; aquā capiti ipsius languētis imponūt. Alij in stercore ip-
soru calido obruūt egrotātes, ut lāguor exudet. Pleriq; colligatis iumentis cō-
modū credūt renes sole feruenti benē cooperiri. Hæc quoq; potior traditur sa-
lutaris: Piperis triti grana xx. cedri pōdus denarij, nitri uncia 1. mixtura la-
seris tyrrhenici globulū ad magnitudinē fabæ, trita atq; permixta, addita li-
quaminis floris hemina, & uini ueteris summi sextariū bis in die per os dige-
res. Exptū dicitur, sanguinē bubulinū calidū et fumantē, sed moderate p̄ cor-
nu faucibus infundis. Quod si forte defuerit, thuris cribrati & salis triti ter-
nas uncias cū uino optimo prodesse dixerūt. Calidis medicamentis aīal expe-
dit dum sanetur perungi. Adipis quoq; porcinae recentis coctæ quantū existi-
maueris cum oleo optimo & uino summo & melle commiscēs, & ad carbo-
nes semper decoques, ac per nares infundes. Malagma quoq; de calidis spe-
ciebus in carbonibus cum oleo cyprino uel communi, sed ueteri, abluitur, &
perungitur. Post curam operitur sagis, & in sole calido exercetur ā seffore,
& repedens dum sudet. Post sabanis ualidioribus abstergetur, & denuo un-
ctum operitur, pice quoq; liquida admixto oleo perungendum, nō tamen ni-
mia pix sit, ne corium lædat. Nōnulliā ualidioribus de ceruice sanguinē de-
trahūt. Pleriq; in balneū ducunt, calidissimis potionibus curāt, id est, lasare
& cymino, aniso, oleo, baccis lauri, ex quibus quotidie aliquid cū uino mini-
strant. Vnctionibus quoq; istis utuntur: Cere lib. resinae uncias 4. opopana-
cis unc. 2. medulle ceruinæ uncias 3. olei storacini uncias 3. olei lauri unc. 4.
quæ oīa decoquūt, et in sole aut in loco calido perungūt. Alia quoq; unguēti
compositio talis est: Baccarū lauri sextariū 1. cymini sextarios 2. sulphuris
uini unc. 3. resinae unc. 1. galbani unc. 3. olei sextar. 2. q̄ oīa decoques et ueteris.

Delethargico. Caput .XLVIII.

Lethargici quoque iumentis ista sunt signa: lacebit semper & dormiet, neque cibum appetit neque potum, cum excitatum fuerit continuo aggravatur, & se proijcit, & macescit, & quancunque ei dederis potionem tanquam dormiens uix suscipit: quem hac ratione curabis: substernito instabulo ubi stat, ut bibat ibi, cui caput fomentabis ex calida pulegio decocta, postmodum perunges oleo cum adarte trito, ita ut caput eius et aures infundas, ea ususur potione: camomillam illyricam, (idem nos trace) & herbam artemisiam in aqua decoquis, ex qua quotidie ei binas cotylas propinabis. Cui & pedes priores frequenter fomentabis calida. Solet enim hac passio adstrictius ad rectum pedem contingere. Est quidem periculosa passio atque curatio: cuius ista sunt signa: Oculi eius lachrymabunt quasi lippiant, in praescipio dormitans incumbit, à posterioribus ambulans nutat, & totum grauatatur. Cui sanguinem detrahes de pede priori dextro, & de femore sinistro, ex quo eum perunges. Herbam artemisiam contundes, & cribratam dabis cum lixiuij sextario, & olei cyathis duobus, per triduum. quarta die intermites. Quod si cibaria non appetit, (bolū ex melle) & aqua tepida comedat, & aquam bibat. Si minus profecerit, lini semen cum aqua in olla decoques, & heminas singulas per dies singulos dabis ad cornu, addito melle quantum sufficiat. Quae potio etiam febricitantibus prodest. Lethargicū animal frequenti exercitatione prohibendum constat à somno. Assidua quoque iniungenda est deambulatio si anteriores pedes eius miseris in fomentum. Nam furfures sale et aceto permisces, & calentes ungulis imponis. farinam quoque triticeam cum tritis salibus & pusca sextario uno, faucibus infundes, herbam artemisiam tunsam cum oleo & modico lixiuijo dabis ad cornu, abstinebis ab hordeo, fabae solidae sextarium porrigis ut uigilet, donec duriores edomet eibos. De ceruice sanguinem ei detrahes. Depletum hac ratione curabis: Afronutri uncias tres, gallae syriaticae uncias duas, spicae nardi uncias 2. radicis capparis uncias duas, tunsam & cribratam permisces, et terna cochlearia in sextario aquae tepidae dabis in potu. Nunquam frigidam nec nimium calidam, sed tepidam ad bibendum semper accipiat. Assidue flagello excitandum aut uoce, ut uitium timore deponat.

De morbo

Demorbo Regio. Caput .XLIX.

SI quod iumentum morbum regium habuerit, his agnoscitur signis: *Surig; oculi uirides sunt, & ceruicem inclinatam habebit, dextra par- te & pede dextro (etiā sinistro) uidebitur claudicare. Cuius curatio est ista: loco tnebroso, ubi lumen uidere non possit, clauditur, et operitur sagis ita, ne oculi eius aperiātur in die, oleo et uino tepido ungetur atq; fricabitur, lapides molares nō minus pondera quinq; in ignē imponuntur, animalis ca put copulatur ad pedes, cum bene cāduerint, sub eius naribus apponuntur, persusi oleo suffumigatur os, nares, & oculi, ut morbi uirus exudet. Quod per septem dies cōtinue est faciendum. Tali etiam ratione succurrimus: sāt guine caprino et lacte ouillo, anagallico, costo, oleoq; pariter admixto po- tio conficitur, quæ per dies duodecim datur.*

De bili, idest, coleribus. Caput .L.

Sed interdum biles, quæ coleræ appellantur uulgo, solent iumenta uexa re. Quæ passio his declaratur indicij: cōmouetur ac uoluitatur ut stro phosus. Sanguinē de ceruice emittis: Daturus eiusmodi cōtinuo potio nem: herbæ trixagnis nigræ uncia semis, mannæ succari uncia unam, nūtri uncias duas, aliæ uncias 2. uini optimi sextarium unum, conteres, ex aqua mulsā heminam unam per sinistram narem infundes.

De bili arida. Caput .LI.

Quod si aridam bilem habuerit, myrtum agrestem cum uino contri tam per narem dextram deffundis, pro hordeo far triticeū dabis. Potionem ipsam temperabis ex aqua.

De coli passione. Caput .LII.

Coli passio grauissimos cruciatus iumētis cōsuevit inferre, ita ut car- diaci aut strophosi esse credātur, sed his agnoscitur signis: Cū stat re pente cōcidit ut arreptū putes, si satis suspensum fuerit dolor subse- quitur, & iacet nōnunquā: cum frigida aquā acceperit tremit, sudat, anhe lat. Cui hac ratione succurritur. Anisi pontici uncia 1. petrosilini uncia 1. fe niculi seminis unciam, piperis nigri uncias 2. marrubij uncia 1. abrotani un- ciam 1. anethi uncias 3. libistici 3. 4. centaureæ minoris et maioris uncias 2. (cametris semiuncia) eupatoris 3. 4. gingiberis uncia semis, pulegij semiun-

ARTIS VETERINARIAE

ciā, rutæ unciā, apij unciā semis, pariter cōtūdes et cernes. tūc mellis optimi pōdera duo cocta et despumata cū oībus misces, ex quo medicamento ad magnitudinē nucis auellane cū aquæ tepidæ sextario dilues, et per os infundes, *als(piperis)* certissima medicina est. Qd si dolor pseuerauerit, feniculi seminis cochlearia v. bene trita cū uino syncero sed cibario sextariū dabis. Prætreā (panis) aliquantulū et pellicula de uentre pulli siccata in furno et trita cū uino dabis.

Deuomica. Caput .LIII.

Vomica plerūq; animalibus nascūtur intrinsecus. Cuius passionis signa sunt ista: cū accubuerit difficile surgit, os ei grauitèr olebit, incūbet in eo loco à quo uexabitur, tussiet, et purulētū excreabit interdū. *thuris unciās 2. aristologæ unciās 2. in uno cū uino tepesfacto per nares digereres.* Item sulphuris uiui unciās 2. aristologæ unciā semis similiter dabis, abo autē maxime sustētandū est ut habeat corporis nutrimentū, et cū rupit uomicam cauterijs circa pectus aduris, ut facilius prouocatus humor emanet.

De cortagine. Caput .LIIII.

Passio quā græci ecedermiā uocant, latini coriaginē appellant. Cuius ista sunt signa: macescit, et sine febre nō erit, coriū illius adhærebit costis, spina fit durior, in dorso eius nōnunq; furunculi exire cōsuecrūt, magis etiā quā adsuauerat appetit cibos. Cuius ista curatio est: thymū & sales cum uino rubro cōteris, & tubera, si qua in eo sunt, cōfricas. Parabis etiā aliā unctionē: picē, cerā, resinā cabialē, & thuris pollinē ex oleo ueteri temperabis ac decoques, totū animal cōfricando diutissime perūges. Sed parum est unctione corio mederi, nisi potionibus & intrinseca curentur: piperis alibi triginta grana, myrrhæ semiunciā, uini odorati ueteris cotylā, olei uiridis cyathū unū admiscebis & per os digeres. Itē fasciculos rutæ uiridis atq; purgatæ opopanacis & cotylā uini & olei uiridis cyathum admisces et dabis in potu. Quod uitium ex perfrictionis iniuria, aut ex coactione alicuius necessitatis descendit. Aliquantis suis nō uetula sed nouella sanguinē uino permixto ad cornu faucibus digerunt, ignorantes si plus sanguinis fuerit cōtinuo animal interire. Cautius est hac magis potione curare: cepas germanas et semen rutæ pariter admisces, & deteris, ex quo unciās tres, cum uini cotylā per dies singulos dabis, usus curacionibus quæ conueniunt roborosis.

De stomacho

Destomachico. Caput LV.

Syntaxin animalia patiuntur & homines: quæ ualitudo his declaratur
 indicij: cotidie tenuatur, et macie ossa eminet, multum manducatia esu-
 riunt semper, quicquid inuenerit tentat fame cogere corrodere, durum stercus
 emittit, trahit longa ac miserabile uitam, ut nec surgere ualeant. Sed iacetia
 fatigata, multumque manducatia fame moriuntur. Omnis enim esca quam sum-
 perint ad stercus, & omnis potus conuertitur in urinam, nullus ex his succus,
 nullum alimentum peruenit ad medullas. Propterea quod stomachus eorum ni-
 mio rigore perstrictus, nec coquere poterit, nec epati aliquid propinare, in
 quo tota uirtus ad nutriendum corpus per dispensationem ciborum sanguis
 preparatur. Tabescit semper, iecurque eius minuitur ad similitudinem arboris,
 quæ radicibus ex maiori parte præcis, cum à paruulis aliquandiu sustenta-
 ta portauerit frondes, celeriter exarescit. Quorum manifesto periculo hac
 ratione tentatur occurrere. Inter principia facies unctionem, ceræ libras duas,
 resinae terbinthinae libram, medullæ ceruinæ libram, axungia ueteris sine sa-
 le libram, propulegij selibram, irisillyricæ libram, samsuci libram, olei lauri
 ni quantum satis fuerit, decoques carbonibus lentis, & ad ceroti molliciem
 perlocabis, cui adhuc tepenti mîsces puluerem irisillyricæ & cretæ cimoleæ,
 donec infrigescat agitabis. Ex quo medicamento totum iumentum perunges,
 & mulierum manibus confricabis, donec calefiat & sudet. Quod interposi-
 to triduo conuenit fieri, ita ut coopertum animal sit, & cotidie paulatim exer-
 ceatur, ut digerat. Cui hæc preparabitur potio: abrotani uncias 4. santoni-
 ci uncias 4. trixaginis uncias 4. campepitos uncias 4. gentianæ uncias duas,
 murrhæ uncias 2. opopanacis uncias 2. eiusdem radicis, succari semiunciam, ru-
 te aliquatulum, oia bene tundis & cribras, ex quibus duo cochlearia in uino
 ueteri decocta cum succo pisanæ in qua (atro) decoctum est, admiscebis, adiungis
 ges etiam erui pollinis cochlearia duo, quæ cum per nouem dies continuos dederis,
 intermittis aliquandiu ut uires colligat, et resumat, et per singulos (periodos) alia
 alternis curabis. Nec cessabis donec sanitas redeat. Diebus autem uacuis of-
 fas ex farina triticea in lacte conspersa ad substantiam digeris, surfures quoque
 triticeos & paleas dabis, hordeum non dederis nisi fortassis infusum, dene-
 gabis etiam herbam uiridem donec reparare coeperit corpus.

De icterico

De Ictérico. Caput .LVI.

Icterici ista sunt signa: Oculi uirides, de quibus profluet lippitudo, ad similitudinem sabæ indurefcit corium, fit horridum pilis, insequitur fatigatio, ambulans genibus claudicabit. His sanabitur medelis: Panacis syriatici et apij seminis singulas libras contundito atq; cribrato, & cum mellis attici libra misceto, tunc aquæ, in qua lupini crudi fuerint decocti, sextario, ex medicamento superius descripto, quatuor cochlearia miscebis, & in potione dabis per dies v. Si tardius adiuuat, uini sextarios 3. in pultario nouo, canini stercoreis albi uncias tres admisceto, & ponito sub diuo, ex qua potione quinque diebus per os digeres. Præterea aquam in qua ciceres decocti fuerint, & ster cus caninum simili ratione præbebis.

De Stropho. Caput .LVII.

Strophus diuersæ causæ, & diuersæ sunt curæ. cuius ista sunt signa: Volutatur, patitur torsiones, ilia sibi respicit, ster cus durum assellat, terram pedibus tundit dolore cogente, intermissis horis refrigerationē sentit & requiem. Hac potione curandū est: acori, anisi, opopanacis singulas libras pariter contundis & cernis, ex quo puluere duo cochlearia in uini ueteris sextario & olei pondo semis admisces, & tepidum per os dabis triduo. Si strophosus fuerit & non facit uentrem, caudā inter coxas suas mittet, & ad uentrem suum conuersus attendet. cui puluerem de semine rutæ syluaticæ cū uino per os dabis. Præterea cepas decem ueteres, ficus siccæ 2 8. nitri scrupulos 1. stercoreis colūbini scrupulos 4. ex quibus addita urina collyria facies, & bina uel terna in anum immittes. Si uero fortius uenter induruit, conuenit adhibere clysterium, sed prius uentrem aqua calida persoueabis. Tunc succum (cantabricum) in quo fuerint bletæ maluæq; decoctæ, cum nitro & hemina olei, & columbini stercoreis quatuor scrupulis, prouum constitues, & per anū iniicies iumento, ita ut post clysterem inambulet aliquantulū. Alij finum leporis cum nouem cochlearibus mellis, & quindecim granis piperis addito caulium succo per os salubriter defundunt.

De dolore iecoris. Caput .LVIII.

Iecoris dolor solet infestare iumenta, cuius ista deprehenduntur indicia: Ibi fastidium, potus appetentia, uentris inflatio, macies. Cui primo cremo
rem ptia

ris pſana ſextariū .i. cū olei roſatij tribus cyathis per os digeres . Si paſſio permanet, alia potione curabitur. Apij ſeminis uncias 3. hyſſopi uncias tres, abrotani uncia .i. olei uiridis quantū ſufficit, uel ſucci paulominus. Si uiridē abnegat tempus, ex uino optimo ad tertias decoques, per aliquot dies potionē dabis. Similis quoq; huius paſſionis eſt ratio. Sine febre enim animal nō erit, nec facile cibū conficiet, teſticulus dexter tumebit et indureſcet, cui iſta ſubuenit medicina: ſoenigræci cyathos quatuor mittis in aquæ fontanæ ſextarios quatuor (.i. grana triginta) & decoques ad terciā partē. hemina per os data potione curabis. Nōnulli turis drachmas 2. tritas, cum uino quantum ſufficit miſcent, & inde totum corpus multorum perfricatur manibus, ſaccie cooperiunt ut ſudet.

De inflatione uentris. Caput .LIX.

INflatio uentris interdū iumenta (ſine dolore) conturbat. Cuius paſſionis iſta ſunt ſigna: teſtes eorū ſudabunt, alternis pedibus terrā tundunt, ſubito inde alterna parte ſe cōuertūt, caput ad ilia ſua ponūt tanquā qui locū doloris oſtendāt, gemitus interdū & tremor totius corporis inſequitur. Hunc paulatim deambulare facies, manum unctam in anum mittes, & ſtercus extrahes. deinde ſale & melle miſtis in anum infundes, ut aſſellandi augeat uoluntatem. Si hyems fuerit, oleo & pice liquida lumbos & auriculas illius ſaturabis, hanc daturus potionem: Laurum uiridem uel baccas ipſius, pipper & cuminum, petroſilini & feniculi ſemen, ſemen agrij & nitri, quæ pariter admixta, tunſa & cribrata cum uino, & oleo tepido, & calide aquæ paruula portione potionabis, & deambulare compellis moderate, donec dolor ceſſet.

De inteſtini uexatione. Caput .LX.

INteſtini quoq; uexatio, quod colon uocatur, & inflationes et dolores cōſuevit inferre. Quæ his agnoſcitur ſignis. Cum ambulare cœperit, prioribus pedibus tranſuariat & dolores ſubglutit, & crebras deambulationes & calores ſtabuli, ſi diligenter etiam operiatur diligere conſuevit. Cui per nares ſuffundes laſer & cyriacum in uino tepido ſolutum.

De tuſſi. Caput .LXI.

FRequēter omni genere deſorme uitium, eo q; maxime aīali ū parti acci
P dit, tuſſis eſt

ARTIS VETERINARIAE

dit, tussis est, quæ interdum sponte desinit, interdum medicamentorum ratione curatur, interdum insanabilis penitus inuenitur. Difficultas autem curationis emergit, quia causæ ex quibus tussis euenerit, à medicis nec discernuntur, nec intelliguntur interdum. Quam passionem uniuersis authoribus euolutis, quamto crebrius accidit, tanto studiosius credimus exponendam.

De tussi quæ uenit si quid faucibus hæserit. Ca. LXII.

Exasperatio, aut iniuria faucium grauissimam commouet tussim, quoties aut puluis, aut arista, aut os, aut surculus, aut lapillæ, aut aliquid inhæserit gutturi. Quæ res adeo periculosa est, ut nisi celeriter subueniatur, aliter per impatienciâ doloris insaniam generet. In sole igitur diligenter inspicito, si quid hæserit euellito. Ex tepida etiâ, addito niri puluere, infusa spongia ter guto. Deinde oleo rosatio tepido cum lana obturato locum qui indagationem sustinet. Post diem tertium lanam eijcies, eadem ex aqua calida fouebis et tale medicamentum imponis: succari 3. 4. aluminis colati 3. i. ex tepido in no infundis, et sic exasperata sanabis.

De tussi ex perfrictione. Caput .LXIII.

Ex perfrictione quoque nascitur tussis. Cuius ista sunt signa: cum tussierit, caput deorsum mittit usque ad terram, et cum biberit, aqua ei per nares currit. Quam hac ratione curabis: Machinam ori inseres, manum planam iniicies, coperies in parte superiore quasi uesiculam, quam unguitibus rumpis. Deinde tres pillulas bene cotusa axungia mollissimas facies, quos in subtilissimo lomento, hoc est, farina fabacea, conuolues, et per os digeres.

Deinde per triduum (uenaculo) et sale perfricabis, et pastillos cum speciebus calidis et uino in potionibus dabis.

De tussi à colibus. Caput .LXIII.

Tussis à colibus si fuerit, his signis agnoscitur: coles iniuriæ pleni sunt, ac tenebunt, dum bibunt continuo ruminant. Ouum in aceto acerrimo mittis, resolutaque testa, ita ut integra membrana permaneat, picem liquida perunges, et faucibus digeres. Post alumen, axungiam, salem in uino coteres, offas facies, et ex melle deiicies, ita ut aqua calida, et si faculta suppetit, cum euisco decocta assidue fomentare non desinas. Hanc quoque potionem adijcies

adijces: myrrhæ uncias 2. piperis albi semiunciam, nuclei pini purgati sextarium semis, uuxæ passæ sextarium semis, mellis uncias tres, pastinacæ unciam unā, cariotæ uiridis sēlibrā, decoques pariter ex aqua, & adduo uino tepido quinq; uel sex diebus potionare non desinas.

De tussi ab interioribus. Caput LXV.

AB interioribus grauior & penē insanibilis tussis est, quæ hac ratione dinoscitur: nares iumentis præcludit, ut spiritum readere non possit, tūc illa ei inspiciet, quæ si spissis pulsibus duxerit, scito esse tussim ex causa iecinoris, pulmonis, uel præcordiorum, uel (recentem) si lentis pulsibus illa duxerit & uentrem, indicat tussim de interioribus, hoc est, de his locis, in quibus intestina lumentorum ligantur, quorū tensione & iniuria cōpelluntur tussire. Nā si cursu nimio uel latiore saltu cōuexata illa fuerint hæc nascitur causa. Ex nimio quoq; aestu, uel intolerabili frigore interiora uitiantur, & faciunt tussicos. Vnde uulsi appellātur. Siue igitur ex suprascriptis, siue ex alijs causis interioribus nata fuerint uulnera, etiā si post sanitatē duxerint cicatrices, strictius tamen cōtrahendo se et asperitatē faciūt, & assidua trāllatiōe ppetuā excitāt tussim. Quæ causæ lenissimis medicamētis adiuuari uel suspēdi aliquatenus possunt, p̄sanari omnino nō possūt. Hinc est quod in herba uiridi uel pascuis uulforū uitia celātur. Sed omni tēpore hæc cōpositio est salutaris: scēnigræci heminā, seminis lini heminā, tragani unciam 1. huris masculi uncia 1. myrrhæ un. 1. succari, erui pollinis añ uncia 1. tunsa et cribrata in calida infusa permaneant, altera die ex aqua tepida singulas cotylas dabis ad cornu, cyatho olei rosati permixto, per plurimos dies. Ex qua cōpositione recens causa sanabitur, uetus sentiet leuamētum. Ad quæ uitia nunquam dederis austeriorem potionem, ne exasperet & decidat: sed leuem & simplicem, & refrigeratōriam. Cauendum etiam est ne in tali passione unquam sanguinem detrahas. Plerunque tracanton ex oleo debere dari per biduum. Tercio dei decoctos raphanos atque contusos propinare cum uino, refrigeratōrium pastillum addentes in æstate. Ad tussim diuersæ sunt potiones, quas proprie omnes inferere necessarium duximus, ut pro qualitate passionū, medentis arbitrio remedia cōmodentur. Farinæ fabæ frictæ sextarios 2. infundis in passi sextarijs 3. et in mortario diutissime cōteres. piperis triti grana triginta, sepi hircini libras 3. pariter amisces & omnia

ARTIS VETERINARIAE

tusa & cribrata per os ad cornu per triduum dabis. Nonnulli uero duobus sextarijs, coditi fabae frixae hemina ante triduum fundunt, post deterunt diligenter, & aequatis partibus per triduum digerunt. Alijs placet farinae sabaceae sextarium unum, tribus sextarijs, uini ueteris infundere, additaq; olei optimi libra pariter deterere, ac dare per cornu. Si tuſis ex ruptura uel uulſione prouenerit, anagallicum primo tundes, post herbam paritariam pro duabus partibus teneram admisceſ, adiunctaq; axungia ueteri conteres diligenter, & palis (experta) stillos facies, quos impari numero & imparibus diebus cum resoluto butyro ac melle diffundes. Ad leuem tuſim uictoria sunt (expeditaq;) remedia, porcos decoquere, & cum herba paretaria bene trita miscere, factisq; pastillis in oſo resoluto & oleo roſeo, ne non & passo & melle conuoluere per triduum deſiccare, succu ipsius iuris in quo decocti sunt porri, in super dare per cornu. Itē laſer. i. opiu ſyrenicu ad magnitudinē fabae, cū uino ueteri deteres et p cornu dabis. Tuſi et grauedini capitis medebitur oleum roſeu uel certe simplex & uiride cum aqua calida per narē dextrum per triduum diffuſum.

De uulſis. Caput .LXVI.

Vulſis glutinare creditur, si draganti uncias 2. pridie infundas in calida, ſeeni quoq; greci beminā, lini ſeminis heminā, ſeparatim infundas, die poſtero in cacabo decoquas & pariter teras, poſt medullae ceruinæ uncias 2. ſepi hircini librā, radicis tracontiae uncia 1. gentianæ uncia 1. centauræ uncia 1. ſepi taurini uncia 1. cōtundes, & illis quæ prius parata ſunt addas; quæ oīa in mortariū mittes, & diutiſſime cōteres. Ad ultimū paſſi ſextarios tres & aquā in qua ſcenigrecū uel ſemen lini fuerat infuſum adijcies & decoques, ac per triduum ad cornu dabis. Grauitur tuſientes & uulſi hac potioe recreantur. De maſculo pinguis porcinus acro decoquitur, do nec omnis caro ſoluatur, abiectisq; oſibus uniuerſis cū iure quo deſerbuerat & tribus ſextarijs (paſſi) ſuccidi. Deinde rursus in cacabū mittis glutis taurini ſemiunciam, aceti acerrimi hemina dimidia cōiungitur et feruet ut quilon fiat, traganti uncias 3. lini ſeminis et ſcenigraeci unciae ſingulae decoquuntur extrinſecus et teruntur; adiuges etiam medullae ceruinæ et ſepi hircini uncias 1. quæ ad ultimū cū omnia pariter calefacta fuerint & colata, facies potione, ex qua per cornu dabis animalibus diebus ſeptem, aut nouem curaturus, aut tepefactam digeras ut inſpiſſentur, adiecto paſſo & aquæ illius copia in qua

qua cocta sunt semina. Præterea aliquāti caput agninum tam diu decoquūt, donec omnis cōpago soluatur, abiectisq; ossibus terunt, adiectoq; ad ius ipsius melle, diebus septē ad cornu digerunt. Quod si tussis ex faucibus ueniat, myrrhæ uncias 3, cardamomi uncia 1, nuclei sextariū, uue passæ sextariū, deteres diligenter, additoq; melle agitando lentis carbonibus decoques, cum intepuerit, pastillos ad nucis magnitudinē facies, quos ternos cum butyro diebus quinq; uel septem digeres. Item si ex faucibus causa est, occisum pullum palpitantem aperies, & tollis eius uentriculum, quē cum suo stercore calentem & integrum in melle conuolues, & per cānalē digeres. certissimū ac uerum remedium est. Si exasperatio gutteris mouerit tussim, murrhæ uncias 2. piperris uncias 2. seminis lini frixi & contusi sextarium, cardamomi ꝑmiunciam, uue passæ sextariū, nuclei sextariū, mellis pondo duo, diligenter trita cōmiscēs ac decoquis, pastillos ad nucis magnitudinē facies, ternos in die digeres.

De tussi quæ generat̃ ex humoris acerbitate. Ca. LXVII.

TUssi quæ ex acerbitate humorum prouenit, tali ratione succurritur: In primis purgandum est corpus tussientis. Cucumerem itaq; syluaticum uel radices eius cum nitro Alexandrino conteres, adiunctoq; uino uetere per os dabis ad cornu. Quæ potio cum laxauerit uentrem, post diē tertium squallē ualidioris 3 quatuor contundes, & optimi laseris quantum fabæ patitur magnitudo commiscēs, uiniq; odorati sextarium, & olei ueteris librā addis, & cum diligenter omnia cribaueris, triduo per os defundes ad cornu. Item alia. Istis quoq; suffumētis nō minus quā potioibus adiuuabis: Sandarici uncias 3, asphalti uncias 3, alij & ceparum uncias 3, quæ cum pariter triueris, in tres partes æqualiter diuidēs, & per triduum cooperto ori uel capiti subiectis carbonibus suffumiges, ut odor impleat nares. cuius tamē oculos prius ligabis ne medicamenti acerbitate ledantur. Herbæ quoq; marrubij fasciculum quā magnum uolueris deteres, et cum ouo & uino succido admiscēs, addita adipe ceruina, uel si defuerit, uerbenaceam cum cera resoluis, & cum tepida ad cornu digeris. Grauiissimæ subuenit tussi si pillulas cypressi decoquas, & purges diligenter, addita axungia, & argallico, & folijs tenerioribus herbæ paritaria, cōtundas in pila, et pastillos ad nucis magnitudinē facias, quos quotidie impares cum melle & oleo et uino passo, ouis intinctos deijcies. Si placet pro pillulis etiam folia cypressi cōtusa miscere cum omni-

bus suprascrip̃tis poteris, picis liq̃dæ facere potionē, et dare p̃ cornu. Ad oēs
tussēs talē dedere pleriq; potionē: draganti, myrrhæ, spicæ nardi añ uncia 1.
decriuere sollerter, & cū duobus sextarijs passi per triduum diffudere.

Ad tussim siccam, uel suspirium. Ca. LXVIII.

AD arteriam exasperatam, et ad spasmū: hyssopi librā, scenigracise
librā, seminis lini, tracanti, anagallici, rutæ uiridis singulas selibras,
salis heminam dimidiam conteres, & usq; ad tertiam decoques cum
passo, tussienti per triduum, uulso per nouem dies dabis. Alij petroselinū mace
donici unciam 1. semis, dauci unciam 1. myrrhæ, spicæ nardi, costi, tracanti,
singulas uncias, prius in mulsā tepida diffusas, acori, pipis, succari añ uncia 1.
gattæ armeniacæ uncias 2. cassiæ uncia 1. pariter deterunt, pastillos ex mul
sa faciunt, post cū passo deiciunt tediāti. Ad tussim ueterē, & ad suspiriū, ul
anhelitū, & ad synanchen, Si mox dederis storacis rubæ uncias 3. myrrhæ
trogloditis uncias 2. opopanacis unc. 2. irisillyricæ uncias 2. galbani unc. 2.
resinæ terbentinæ uncias 3. herbæ simponiacæ uncia 1. pariter commisces &
deteris, pastillos facies cū melle. Præterea axungie librā semis, caricas quā
al's (raueam) decim (pineam) combustā, et in puluerem redactā, liquaminis optimi hemi
nam, mellis librā cum cauliculis excōctis, offas faciūt & cum passo digerūt.
Aliquantī hederæ folia, itē populi albi folia, æquo pondere deterūt, et cū uino
albo per nares defundunt. Alij rutæ folia cū melle deterūt, et cū uino optimo
p̃ nares defundūt. Alia. Cucumeris syluatici folia fœno miscēt, radicēq; ipsius
contundūt, & cū lini semine & hordeo cōmixta offerunt. Experimento pro
batū est tussim suspiriūq; sanare. Alia. Sulphur uiuū & rosmarinū cū melle
et uino ueteri per sinistram narē digeris. Aliquantī panacis radicē detritant
cū uini optimi hemina, et tribus cyathis olei, per cauernas naris sinistra in
fundunt. Præterea rosmarini 3. 4. myrrhæ scrupulos 2. cū uini ueteris sexta
rio, olei hemina, per nares triduo defundūt, ita ut in die detur hemina. Aneti
acetabulum, irisillyricæ acetabulū, rutæ scrupulū 1. olei heminā dimidiā per
os digerūt. Suspirium quoq; ac tussim releuat, si radicis mori scrup. 1. herbæ
heliotropij uncias 3. diligenter cōteras, & cū hemina uini candidi per os de
fundas. Recens quoq; tussis expimēto curationis sedatur. Lentis sextariū se
mis emolis, farināq; mollissimā facies, ex qua singulas heminas cum singulis
heminis aquæ per os per triduum digeres. Vetus aut tussis aboleri creditur, si

cyathis

cyathos tres ex succo porri cum hemina olei pluribus diebus per fauces de-
fundis. Tussientes ac uulsi hac potione curantur: panacis radices uncias 2. sul-
phuris uiui uncia 1. thuris masculi uncias 2. myrrhe trigloditis uncia 1. com-
mixta in puluerem rediges, ex quo duo cochlearia cum duobus ouis, addita ui-
ni ueteris hemina, diebus quinque uel septem per os dabis. Expertum dicitur, ulmi
cinerem leuissimum. i. fauillam aqua tepentem miscere, et olei boni equam mensuram
addere, iunctisque tribus ouis, diebus quot uolueris dare per fauces.

Ad uomicam & tussim. Caput .LXIX.

Validissima contra tussim & uomicas compositio est: succi marrubij
expressi heminam, caricis siccas xxv. mellis attici uel Symini sextar-
ium semis, in olla noua ad medium decoques, post myrrhe & trigloditis
uncias 2. dauci uncia 1. casie fistule uncia semis, cinnami semunc. thuris mas-
culi uncia, aristologie uncias 2. opopanacis uncia, irisillyricae uncia semis, ra-
dicis panacis uncia, uniuersa coterito atque cribrato, et supra medicamentum in
quo mel et ficus coxeris mittito, et studiose agitando seruire facito paulatim car-
bonibus lentis, post in pixide plumea uel lignea condito, ex qua bina cochlea-
ria cum hemina uini per os quotidie digeres. Vulsis uel tussientibus prodest singu-
los sextarios lentis, foenigræci, et lini seminis frigere separatim et puluerem
facere, et de singulis speciebus singula cochlearia cum succo anagallici, et succo
plantaginis quantum uolueris addito uino per os dare.

Diuersae potiones uulsoꝝ & tussientiu. Cap. LXX.

Vt diuersae causae sunt, ita et difficiles curae. Quapropter studiose quae
expimentis nostris uel aliorum probata cognouimus intimamus. Ad unum
itaque aial talis potio praeparatur: fabae frigidae sextarium sine sale cum aqua
decoqs quemadmodum hominibus consuevit apponi. praeterea foenigræci sextarium
separatim mittis in cacabum, et cum seruire coepit primam aquam fundes, post addis
aquae sextar. v. caricis xx. ligritiae unc. 2. tantum ferueat donec 4. sextarii re-
maneant, tunc fabam istam coctam, et foenigræcum, cum caricis uel ligritia in mortario
diligenter deteris, addis insuper butyri, sepi hircini an unc. 2. ad calorem diligenter
resolutas, quae cum omnia miscueris, addito iure in quo foenigræca decoxeris tepescit
per cornu plus quam singulas heminas diebus singulis faucibus digeris. Quae si spissiore ui-
deris potionem, tantum passim addis ut possit per cornu exire. Barbarorum usus ad-
uersus tussim inue-

inuenit salutare remedium. Radicē herbæ, cui nomē est enula, quā cāpanam pleriq; appellant, colliges, in umbra siccabis, postea deteres, in puluerem rediges, ex quo terna maiora cochlearia in singulos sextarios uini ueteris pridie infundis, & cum bene agitaueris claudes, ne odor herbæ salutaris exhalet, per os triduo, uel quot uolueris diebus digeres. Item alia. Lentis alexandrina, scenigræci, lini seminis heminas singulas decoquis, addisq; ei tragantū uncia semis, pridie in tepida infundis, & anagallici uncias 3. diligentissime resolutas, quæ cum omnia in mortario triueris, in cacabo nouo cū tribus aquæ sextarijs decoqs, exinde tertiā partē cum sextario passi tepidū per os dabis triduo. continuo sanare creditur uulsos. Si iumentum ex uulneribus fauciū tussis urget, irisillyricæ uncia 1. piperis nigri semiunciam, succari 3. 1. myrrha troglitis semiuncia, thuris pollinis semiuncia, traganti prius infusi & triti uncia 1. oua quinq; cum passi sextario cōmises, & triduo per fauces digeres ad cornu. Post mel, butyrum, axungia, salem & piculam cōmises, offas facies, & in passo intinctas digeras. Si ab internis tussierit, succi pisanæ hemina, defruti cyathū mises, & per triduū dabis. Si grauius tussierit animal, sabbæ frixæ & coctæ sextariū, seui hircini uncias 3. alijs capita tria pariter decoquis, & in mortario deteris, & cum passo dabis. Curat aut uulsos & ruptos, scenigræci sextariū 1. cum xx. caricis, fasciculo apij, & fasciculo rutæ in aqua ad mediū decoquis, ita ut postmodum traganti resolut uncias tres, & anagallici contusi uncias 3. alijs tres addatur, & oia cōterantur, ossulisq; ad nucis magnitudinē factis, ternæ, quæ, septenæ p triduū digerūtur

De Scabie. Caput .LXXI.

Scabies iumentis deformē passionē, et interdum periculum generat. Contagiosa nanq; est, et transit in plures. Cui nascenti medicamentis nō oportet occurrere, ne præclusa cute in uisceribus residens cōuertatur in morbum. Sed ut eruperit foras, primo purgatio uentris adhibetur, si puluerē ex radice cucumeris syluatici cum uino faucibus atalis infundis, uel certe si radicem cōcisam copiose cum hordeo subministras. Quod cum ex ratione processerit, interposito triduo, aliquātulum sanguinis, si caput et collum scabies infestat, de ceruice detrahes. Si uero scapuli uel armi aut pectus in causa est, de brachiolis sanguis emittitur. Cum spinā, uel lumbos, aut coxas pabulis aestuans contagio peruasferit, de femorū uenis sanguis emittitur, Asphaltum, sulphur

Sulphur uiuū, picem liquidam in butyrum aquis pōderibus pariter deteris, & in sole diutissime cōfricans totū iumentū corpus perungis, aceti acris sextariū, piculæ uncias 4. cedrinæ unc. 4. pariter decoquis, scabiosum aīal ex lotio humano et calida permixta diligentissime perfricaturus, tunc penicillo in fuste ligato medicamentū inducis in sole, asphaltū et sulfū equaliter conteris addita adipe porcina, & olei ueteris tantundē, quæ cū decoxeris, perunges in sole. Adipis librā, sulphuris uiui uncias 2. bituminis uncia 1. olei selibrā, picis liquidæ cyathos 2. omnia conteris & decoquis, & perungis sicut supra scriptum est. Lotij ueteris humani fecis 3. 4. stercoreis ouilli selibrā, olei hemina, sulphuris uiui uncias 3. picis liquidæ cyathos 3. oīa contere & decoque & in sole calido animal semel in die perunge. Bituminis pondo duo, sulphuris uiui selibrā, ceræ librā, mānethuris selibrā cōmiscēs in oleo in quo prius fasciculus aricus & decoctus est, & perungis in sole. Alia. si minus habeat integras uires, Ranas in aqua decoquis, unctamq; earū colligis, & cum polline lenticulæ, adipe et oleo permiscēs, tepēfacto perungis. Itē alia. cucumeris syluatici radices lauas & tundis in cacabo nouo cum oleo quātum sufficit decoquis et uteris. Sulphur quoq; cū uino decoctū similiter iuuat. Si uetustate scabies occalluit, prius obradenda ferro uel testis ad uiuū est, insuper humano lotio cū aqua marina uel salsa mixto confricandum est, post sulphuris, bituminis, picis liquidæ, axungie ueteris, sepi caprini, ceræ, aluminis spissi singulas libras contūdis, miscēs, & decoquis, & sic aīal perungis in sole. Folia de rodedafnes cum oleo uetere decoques, addita piceliquida, & aceto, et cera, certum est de experimento remedium. Memineris tamen in omni unctione, contra pilum iumentum in sole diutissime confricandum.

Si animal scæno malo lædatur. Caput .LXXII.

Viciatum aliquoties uel modicum scænū ad similitudinem ueneri aīalibus nocet, quorum ista sunt signa: Oculos habebunt uagos & semper micantes, ipse gradus eorū erit incertus. His de matrice auferendus est sanguis, de brachiolis flebotomandi sunt, & potionandi ita, Caricis in uino odorato decoctis, rursum detritis, abstinendi ab hordeo & scæno. dandæ etiam duritiæ potiones.

Si hordeo malo lædatur. Caput .LXXIII.

Simili obseruatione curatur, quæ nimio hordeo aut malo leduntur. Sed

Q

hæc etiam

hec etiam in aqua frigida aduersus torrentem diutissime detinentur. Vtriq;
remedium est, pelliculam de uentre pulli siccatā fumo deterere, additisq; octo
scrupulis piperis, & quatuor cochlearibus mellis, & uncia pollinis ex thu
re, cum sextario uini ueteris tepefacto per os dare.

Ad Fascinum. Caput .LXXIII.

Fascinatum animal triste est, grauatur incesu, macescit, & nisi subuene
ris incidet in morbum. Bituminis igitur & sulphuris parū cū granis
lauri ex aqua defundis p nares. Præterea coriandrū uel semē ipsius cū
sulphure & steda carbonibus circūferes, ex aqua feruenti animal consperges
suffumigabit. V niuersis quadrupedibus remediū præstat ista suffumigatio, cu
rat atq; morbis resistit.

Remedium contra omnes morbos. Ca. LXXV.

Aduersus uniuersas infirmitates & morbos equorū uel boū, ubi pri
mū cœperint egrotare potio ista succurrit: Radix scyllæ, radices po
puli, quæ græce appellatur rhamnos (nā est fuscior & nubellula) &
sales cōmunes quātū sufficit mittes in aquā, eāq; aīalibus usq; ad sanitatē da
bis in potu. Quod si desperatas ualetudines præoccupare uolueris, ne unq; ac
cidāt aīalibus tuis, incipiēte uere hāc illis preparabis potionem, & per xiiij
dies continuos dabis in potu.

Si aīal lædatur cū accipit potionē. Cap. LXXVI.

Osten dendū aut est potiōes ipsas oportere curatione defundi. Siqdem
frequēter euenit, ut dū aīalia potionātur tussiant (sudēt) grauitur, et
timorē musculorū oīm patiantur, folliētes, & submisso capite se
sustinere uix possunt. Quā accidit si quando per imperitiā artis danis, potio
in arterias & spirituales partes pulmonis resilierit, unde fit & piculū præ
sens. Quare obseruandū est ne tussienti iumēto et pendenti adijcias potionē,
sed statim eū soluas, paululūq; deambulet, & magis ei alia potione subuenias:
aqua tepida oleū rosatū cōmises & agitas, & per os sæpius dabis. Pusca
quoq; pileiata nares eius fouebis, & emendabitur culpa. Obseruandū quoq;
est, ut subtracto hordeo, & negato potu digerit animal potiones.

Si aīal mordeatur à uenenatis bestiolis. Ca. LXXVII.

Plurimū

Plerumq; à nociuis aialibus. i. à colubris, scorpis, sphalangijs, & muribus cecis aialia feriuntur, & in periculū ueniunt. Cuius ista sunt signa: fastidium ciborū, pedes trahuntur, & cū producantur succūbunt ad singulos gressus, per nares defluet sanies, grauedo nascitur capitis, ita ut deijciatur ad terrā, ad surgendum uel incedendū deficiūt corporis uires. Generaliter curatio ista succurrit: Locus qui percussus est ante oīa fumigandus est succensis testis ouorū gallinæ, quæ prius infundes in aceto, a lido etiā cornu ceruino uel galbano. Post fōmentū loca ipsa scarificabis, & sanguinē ex his emittis, Vel certe candenti ferro comburis loca uenenata quæ pistis attigit. Obseruare autē debes, ne aut supra articulos aut neruosis in locis in quacūq; passione unquam cauterium imponas. Aduſtis enim neruis uel articulis, perpetua debilitas consequetur. Sed dilige uer considera, ut aut superius aut inferius pusillum quā nerui aut articuli sunt, cū neceſſitas fuerit, apponas cauteria. Animal autē quod uenenata bestiola tetigerit expedit ut sudet et calidis coopertorijs inuolutū deambulet, & farinā hordeaceā in cibo sumat, additis frondibus fraxineis & uiribus albis. (credo) in plaga autē mel atticum uel cyminiū in uino ueteri mixtum calefactū oportet imponi. Nōnulli stercus suillum recens & mel atticū cum uino miscent, et calefactum quasi cataplasma inducunt, addentes urinam humanam.

Si bustrepem aial comederit in fœno. Ca. LXXVIII.

Equus si bustrepē comederit in fœno uel in pabulo, hæc signa statim sequuntur: Venter ei inflatur, à cibis resilit, & stercora minutatim et frequenter reddit: qui statim sternendus est, et cogenus ad cursum. Post ei uena tangenda est de palato leuiter, ut sanguinē suū defluentē tranſglutiat, assidue deambulet, triticum cum passo infusum & porros adſeres ad cibandum. Vinum autem tepesactum cum uua passa diligenter conuſitum ad cornu dabis etidem in potu.

Si uipera animal percusserit. Cap. LXXIX.

Vipera si momorderit iumentum, ex morſu eius pus conueuit exire. Nam si prægnans erit, totum rūpiat corpus. Ad morſum tamen uiperæ, uel sphalāgij, aut muris aranei, cōe remediū est, terrā fornicarum cū uino mīſcere et dare per fauces: Vel certe de ipsa terra frequēſ me

uulnū cōfricare. Ad quas causas etiā terra talparū creditur posse prodesse. Quod si in itinere aut in locis ubi desit copia fumētorū necessitas ipsa contin-
 git, piperis grana .xxx cum sextario uini ueteris tepifacto faucibus digeres,
 & herbam thymū tritam cum uino si dederis prodesse creditur. Morsus ui-
 peræ uel cuiuscunq; serpētis ostenditur, si humor putidus de plaga incipit cur-
 rere. Præsens remedium est, si hedum uel gallum uel agnum in recenti occide-
 ris, & calentes pulmones eius cum sanguine, uel corde, uel iecore uulnēri ap-
 posueris, diligenterq; constrinxeris ut omne uirus educat. daturus continuo
 potionem: acori pontici semiunciam tritā cum uini ueteris sextario, salis tritā
 heminā pariter misces, & tepesactum faucibus digeris. Si perseverat tumor,
 uitē albā syluestrem copiose comburito, et ex cineribus eius lixiuū facito,
 & in potionem triduo ad unum sextariū dato. Cinerem quoq; ipsum cū ace-
 to in modū cataplasmatidis uulnēri imposito. Si nihil profecerit, cauterijs uria-
 to, uisā solenniter curato. Farinam quoq; hordeaceā cū uino & sale, oleoq;
 decoctā in cicatricem oportet imponi.

Si araneum comederit. Caput .LXXX.

Iumentum si in pabulo araneum comederit, hæc erunt signa: Totum cor-
 pus tumebit, sed circa auriculas, & oculos, & nares inflatio cū indigna-
 tione maior apparet, cui hac ratiōe subuenis: De palato sanguinem tollas,
 eumq; exceptū cū sextario aceti & hemina salis miscebis, et circa plagā uel
 loca tumētia punges, diligēterq; operies ut sudet. hac rōne sanabitur.

Si sphalangius percusserit. Caput .LXXXI.

Siphalangius iumentum percusserit, his apparebit indicijs: Stat ei ue-
 retrum præ dolore, & uidebis uelle mingere, cui ista ratiōe subuenies:
 piperis unciam i. piretri unciam, uuæ syluaticæ unciam, terito, & cum
 uino ueteri per fauces dato.

De mure araneo. Caput .LXXXII.

Mus araneus pestis uenenata, & tam equis quā bobus noxia, atq;
 ideo cum captus fuerit mersus necabitur in oleo, ibiq; in putredinē
 uertitur, ex quo medicamento cum animal mordetur, plagā liniatur,
 & curatur animal. Vel si inuentus non fuerit, cyminum tritū cum pice li-
 quida.

quida axungiaq; miscetur, ad spissitudinē malagmatis coquitur, impositūq;
 à periculo liberat & sanat. Quod si in suppurationē fuerit plaga conuersa,
 lamina ferrea candenti aperiēda est, & quicquid uīosum est inurendū, atq;
 ita pice liquida uel oleo curā dum. Ne autē mus araneus aīal mordeat, ipsum
 animal uiuū de creta circumdabitur, quæ cum indurauerit, suspēditur in col-
 lum, & non contingetur à morsu ceriūssimum est. Aduersus morsum com-
 probatur, allium tritum cum nitro, & si nitrū defuerit, cum sale et cymino
 permiscere, atq; ex eo puluere loca, quæ morsu contacta sunt, cōficare. Qd
 si eruperint uulnera uenenata, hordeum combustū in puluerem rediges, &
 diluto aceto uulneri inspergis, & hac ratione sola curabis. dat;rus potionē,
 pollinem tritici, hordeū, cedriam, & uini sextariū per fauces digeres. Quod
 si prægnaus mus araneus fuerit qui percusserit, his agnoscitur signis: Pustu-
 le per totum corpus exeunt, sed simili, ut supra scriptū est, ratione curabitur.

Ad ictum scorpionis. Caput .LXXXIII.

S Corpius si iumentum percusserit, his agnoscitur signis: Genua contra-
 huntur, claudicat, non manducat, de naribus fluent pituitæ uirides, ut
 accumbit uix resurget. Simili ratione curatur sicut serpētis ac uiperæ
 morsus: ster custamen a sininū uelocius in plagam oportet imponi.

De morsu canis rabidi. Cap. LXXXIII.

C Anis rabiosi morsus & iumentis, & hominibus exitium inferre con-
 suevit, usq; eo ut ipsi qui contacti fuerint hydrophobos faciat, & con-
 uertat in rabiem: qui hac ratione curatur: Locus qui morsus est, fer-
 reus, uel quod utilius est, cuprinis cauterijs urito, in loco tenebroso cum cōsti-
 tuito. Sic etiam cum adligabis in tenebris ne quicquam uideat. Quod si canē
 ipsum occidere poteris, iecur eius decoctum dabis ad manducandum, uel de-
 tritum faucibus digeres. Fœni quoq; flores combures, & cum axūgia ueteri
 deteres, & ad morsum appones, salutare remedium est. Sed specialiter pro-
 dest, si radicē cynorhodon, id est, herbæ quæ appellatur rosa canina, effode-
 ris, & lotam prius atq; cōtusam diligenter, siue homini siue animali, quod ra-
 biosus canis momorderit, in plaga apposueris, contritamq; cum uino ueteri
 propinaueris quotidie ad bibēdum. Hac enim sola ratione nec hydrophobus
 fiet, & imminens crimen euadet. Canis rabidi morsibus subuenit, si tres ani-

ARTIS VETERIN. VEGETII LIBER III.

tri, iudaici bituminis scrupulum unū tritum cum hemina uini ueteris tepentis triduo per os digerat. Samfuci quoque grana uel succū de folijs aut de cortice exprimes, et cum uino ueteri dabis in potu. Sed tunc efficax est hæc potio, si de eosa mſuco dederis, quæ nō in terra, sed in aliā arbore fuerit innata.

Si stercus gallinæ animal comederit. Ca. LXXXV.

Si fimum gallinarum animal in hordeo comederit, uel œno sumpserit, quasi à uenenatis bestiis percussum cruciatur continuo, internorum dolor et inflatio subsequitur, ad similitudinem quoque strophii et uoluntatio et tuſis asperissima. Aduersus quā necessitatem, apij seminis deteris uncias 2. et cum cani ueteris sextario, et hemina mellis temperas, et per os defundis, et tam diu deambulare cōpelles, donec potio uentrem moueat. Quod si nimis dolor etiam obroboratione fuerit subsecuta, baccarū lauri librā, nitri selenitram, acetii sextarios duos, olei sextariū, diligenter trita permisces, et ad focum calefacies, et in loco calido per triduum unges, et contra pilum diligenter fricabis, certissimū daturus ex sudore remedium. Aduersus huiusmodi casum physicū remedium experientia docuerunt; Pullum si occideris uel gallinam, uentremque eius crudum et adhuc calentem cum stercore suo equo uel mulo inuolutum melle digerere per fauces, optimum creditur. Tres pillulas gipsi cum uino ueteri deterere, et tepidum per os dare, eadem optime sanare firmatur. Lixiuum quoque de arbore ulmi, uel cuiuscūque generis ligni cinerem, diuino modo bene cretam, cum oleo miscere, ac liquidum et tepidū defundere per fauces, physicū et salutare laudatur.

FINIS LIBRI TERTII.

VEGETII RENA

TI ASTIS VETERINARIAE LI.

BER. QVARTVS.

DE NUMERO ET POSITIONE

offium. Caput primum.



VMENTVM IGITVR HABET

in capite ossa duo, à fronte usq; ad nares alia duo, maxillaria inferior a duo, dentes quadraginta. i. molares xxiiij. caninos iij. rapaces xij. In ceruice autem sunt spondili viij. spatula renū sunt octo. à renibus usq; ad anum septem, muscarium habet commissuras duodecim. In armis prioribus sunt sagule duæ. Ab armis usque ad brachiola duo. A brachiolis usq; ad genua duo. In genibus parastaticæ duæ. à tibia usque ad articulos duo, bases quæ appellantur numero duæ, usq; ad pumices ungulæ ossa minuta sedecim, in pectore unum, Costæ tamen in interioribus triginta sex. Item à posterioribus à (cumulari) usq; ad molaria duo, à molaribus usque ad uertebrae duo, costales duo. Ab acrocolesio usque ad gambam duo, à gamba usq; ad cirros tibiales duo, minuta usque ad ungulas sedecim. Et sunt ossa omnia centum septuaginta.

al's (columellari)

De numero & qualitate membrorum. Ca. II.

Nunc mensuras numerūq; membrorū oportet exponi. In palato gradus sunt xij. longitudo linguae habet pedem semis, labrū superius habet uncias sex, inferius uncias quinq; maxilla singulae uncias denas, à cirro frontis ad nares habet pedē, auricula singulae continent uncias senas. In oculis autē singulis uncia quaternæ. à cirro ubi desinit ceruix usq; ad mercurium continetur calculi octo, Spina continet subter spatulas triginti duas, à commissura renū (quod cumulare dicitur) usq; ad unū muscariū cōmissuræ sunt xij. Sagule longicia uncias xij. ab armis usq; ad brachiolū uncias vi. à brachiolis

ARTIS VETERINARIAE

brachiolis usq; ad gēua longitudo cōtinet pedem. Ab articulis usq; ad ungulas uncias 4. In longitudinem uel prolixitatem pedes sex. Hæc eumetria equi conuenit stature honestæ ac mediæ. Cæterum non dubitatur in buricis minora ista, & in primæ formæ equis esse maiora.

De numero & qualitate neruorum. Cap. III.

Neruorum quoq; numerus, qualitas, ac mensura pandenda est. A' medijs naribus per caput, ceruicem, ac mediam spinam, usq; ad imum muscarium descendit filum duplex, quod continet pedes duodecim. Duo nerui in ceruice palmarij continent pedes quatuor. Ab armis usq; ad geniculum nerui duo. à geniculo usq; ad basim uerui quatuor. In prioribus sunt nerui decem, in posterioribus decē. A' renibus usque ad testes nerui quatuor. fiunt in se omnes nerui trigintaquatuor.

De qualitate uenarum. Caput .IIII.

Consequenter uenarum quoq; indicandus est numerus. In palato uenæ sunt duæ, suboculares duæ, in pectore duæ, de brachiolis duæ, de subcirris quatuor, de talis duæ, de coronis quatuor, de feminibus quatuor, de femoribus uero duæ, de subgambis duæ, de muscario una, uenæ maxillares in ceruicibus duæ. fiunt pariter uenæ xxix.

De indicijs & ætate equorum. Cap. V.

Aetatem iumentorum ex dentibus alijsq; signis oportet agnoscere, ne uel lamentis imperitiæ subeamus incōmodum, uel curantes ægrotantis ignoremus ætatem. Quia sicut hominibus, ita & equis, aliud conuenit, cum iumenta sunt feruida, aliud cum senectute iam frigida. Manifestum est autem notas corporis cum ætate mutari. Pullis enim bimis & sex mensium medij dentes superiores cadunt, quos lactantes uocant. Cum aut quartū annum agere coeperint, decidētibus his qui canini appellātur, alios supponēt. Deinde intra sextum annū molares cadunt. Sexto anno quos primo mutauit exæquat. Septimo omnes explentur æqualiter, & ex eo cauatos habere incipiunt dētes, nec postea quot annorum sint scire ad fidē nullus potest, nisi signis alijs, quæ usus edocuit. Decimo namq; anno tempora cauari incipiūt, & supercilia nonnunquā canescere. Duodecimo anno nigredo in medietate dentium

dentium apparet. Pleriq; adserunt, domitis et freno assuetis animalibus rugas, quæ in labris sunt superioribus computandas, ita ut ab angulo ubi cœperit morsus incipientes, usq; ad extremū labrum perueniamus. quia annorū numerū, rugarum ostendit. Postremo, rugarum multitudine, tristitia frontis, deiectione ceruicis, pigricia totius corporis, stupore oculorū, palpebrarumq; caluicie senectus ipsa se prodit.

De signis quibus cognoscitur patria. Cap. VI.

IN permutandis equis uel detrahendis, maximam fraudem patriæ solet asserre mendaciū. Volentes enim charius uendere, generosissimos fingūt. Quæ res cōpulit nos, qui per tam diuersas et longinquas peregrinationes equorū genera uniuersa cognoscimus, et in nostris stabulis sæpe nutrimus, uniuscuiusq; nationis explicare signa uel merita. Nam ut uiliora ministeria taceamus, equestribus usibus uel maxime necessarios cōstat prælijs circeis, uel ad bellum hunniscorum longe primo docetur utilitas patientiæ, laboris, frigoris, famis. Toringos deinde et Burgundiones iniuriæ tolerantes. Tertio loco Frigiscos, non minus uelocitate quàm cōtinuatione cursus inuictos. Postea Epirotas, Samaricos, ac Dalmatas, licet contumaces ad frenacules, armis ac bellis asseuerant cruribus. Capadocū gloriosa nobilitas Hispanorū par uel proxima in circo creditur palma. Nec inferiores propè Sicilia exhibet circo, quamuis Aphrica hispani sanguinis uelocissimos præstare cōsuevit ad usum sellæ. Persis prouincijs omnibus præstat equos patrimoniorū censibus æstimatedos, tam ad uehendum molles et pios incessibus, nobilitate pretiosos, sequuntur Armeni atq; Saphareni, in qua nec Epirotas Siculosq; despexeris, si mores ac pulchritudo nō deserat. Hunniscis grande et aduncū caput, extantes oculi, angustæ nares, latæ maxillæ, robusta ceruix et rigida, iubæ ultra genua pendentes, maiores costæ, incurua spina, cauda syluosa, ualidissimæ tibie, paruæ bases, plenæ ac diffusæ ungulæ, ilia cauata, totumq; corpus angulosum, nulla in clunibus aruina, nulli in musculis thoris in longitudine magis quàm in altitudine statura, propensior uenter exhaustus, ossa grandia, macies grata, et quibus pulchritudinem præstet ipsa deformitas, animus moderatus et prudens, et uulnerū patiens. Persis et statura, et positione à cæteris equorū generibus nō plurimum differt, sed solius ambula

turæ quædam gratia discernuntur à ceteris, gradus est minutus et creber, et qui sedentem delectet et erigat, nec arte doceatur, sed naturæ ueluti iure præstetur. Inter colatorios enim, et eos quos totonarios uulgus appellat, ambulatura eorum media est, et cum neutri sint similes, habere aliquid creduntur ab utrisque commune sicut probatum est. In breui amplius gratiæ, in prolixo itinere senior patientia, animus superbus, et nisi labore subiugatus, assidue aduersum equitem contumax mens, tumens, prudens, et quod mirum est, in tanto seruire cautiissime decoris est obseruantior, incuruata in arcum ceruix, ut recumbere uideatur in pectore.

De temporibus uitæ. Cap. VII.

Aetas longæua Persis, Hunnicis, Epirotis, ac Siculis: breuior Hispanis ac Numidis. Frequens opinio est Barbaricis nulla adhibenda medicamina, quod usque adeo naturæ beneficio ægroti cōualescant, ut eis nocitura sit cura. Sed falsa erat ista persuasio. Nam quanto fortiora membra sunt, tanto diutius uiuunt, si ex aëre uenientibus medela non desit. Spadonibus tamen inter auctores constitit sanguinem de matrice nunquam, nisi forte ex nimia et extrema necessitate, tollendum: propterea quod calor maximam partem cum testibus amiserunt. De palato tamen si non impediatur negligētia, omnibus prope mensibus tam spadonibus, quam testiculatis, minuendus est sanguis. Admissarij uero si cohibeantur à uenere, ubi dematricati fuerint, cecari sepe dicuntur. Quamuis eo anno quo admissum faciunt, non sit eis uena laxanda, ne generationi intentum corpus cura geminæ necessitatis exhauriat. Studiosis equorum, quæ cura stabuli, qui alimentorum cultus, quæ obseruationis sollicitudo præstanda sit, primus ac secundus indicat liber. Nunc decursis omnibus his, quæ huius artis doctrina possidet, ad compositiones necessariorum potionum medicamentorumque descendimus, in quibus et explorata congestimus, et ea quæ non tam ad utilitatem curandi, quam ob caritatem emendi Mulomedicorum cupiditas instaurat submouimus. Constat namque non tam multis neque pretiosis speciebus, sed paucis, et ad causam de qua agitur accommodis posse sanari. Primum igitur ut pingua sint iumenta tam in currilibus quam in sellaribus decet, deinde ut sana permaneant, post ut ægroti curentur, confectiones (ut dictum est) medicaminum proferemus electas

electas ex autoribus multis, de experimentis manifestissimis approbatas.

Potio ad reficienda animalia. Ca. VIII.

T Raditur Chiron ad reficienda iumenta uel curanda, hanc edidisse portionem, qua internos extergeat morbos, qua tussim reprimat, uulso ac tussicos curet: Pisanæ sextarium, lini seminis heminam, croci unciam unam, intestinum porcinum recens, quod longanone uocant, prius diligenter lotum, uel acronem; quæ si in præsentia forte non suppetunt, hednum caput cum pedibus et intestinis ac uentre, et diligenter quasi ad hominum usus curatum, in cacabum mittis, addes superioribus hyssopi fascem duos cochleas germanas purgatas quindecim, bulbos quindecim, ficus dyptamides uiginti, rutæ fasciculum unum, baccarum lauri sextarium unum tritum, dactylos uiginti, allij purgati capita tria, sepi caprini uncias sex, pulegij sicci fasciculum. Quæ omnia trita decoquis in aqua cisternina uel coelesti, donec liquefacta carne defluant ossa: sed aquam sæpius adicies, ne medicamentum ustura constringat. Sed cum spissum uideris, colabis, abiectisq; excrementis et ossibus, tracanti uncias tres pridie calida infusas ut inturgescat et solui possit, adicies, passi sextarios tres, oua cruda sex, olei rosati oua plena sex, buryri resoluti uncias tres, anagallici uncias tres, amili uncias tres, pulueris quadrigarij uncias tres, lomenti fabæ. i. farinæ sextarium: hæc omnia ita temperabis, ut per cornu defluant, et sextarios singulos ieiunis animalibus per triiduum dabis. Et si uolueris septem diebus interpositis repetis et das à capite potione. Iumenta à morbis uindicat et custodit: Gentianæ, aristologiæ rotundæ, myrrhæ trogloditis, rasuræ eboris, et baccarum lauri æquis ponderibus puluis immixtus, ex quo grade cochleare plenum sumis, Adde hyssopi triti scrupulos quatuor, mellis uel passi uncias tres, uini sextarium, gigni resoluti pastillum unum, post cursum siue post laborem conditi bene (piperati) heminam adicies, æstate roris uel absinthij tantundem, et per os dabis ad cornu. Si æstu animal fatigatur, puscam cum pulegio trito mîsces, naræque et faciem consuebis, oua quoque trita cum hemina uini ueteris optimi faucibus infundis, ut per oui refrigerium uini uirtus accrescat. Maciæ languoremq; depellit, si semiunciam sulphuris cum myrrhæ scrupulis 4. in puluere resolutis ouum crudum et uini ueteris sextarius addatur, frequenterq; p fauces detur.

atq; (præparati)

ARTIS VETERINARIAE

Diapenton est (ut supra retulimus) necessarium pluribus causis ac morbis, & semper diligenti cofectione seruandum. Gentiane, aristologie rotundae, myrrhæ, rasuræ eboris, & baccarum lauri, de recentibus speciebus in unum redactis minutissimus puluis, ex hoc febrientibus plenum cochleare cum tribus uncijis mellis, & aquæ tepidæ sextario, in qua radices iunci, & apium sufficiens decoctum fuerit, per os dabis, ita ut triduo similiter cura procedat. Idem puluis si ultra cochlearium cum sextario uini ueteris, & olei uiridis hemina detur, animal à quibuslibet uenenis, uel serpentum, aut bestiolarum morsibus liberat. Cui si piperis atque pulegij, necnon etiã cimini pulueris aliud cochleare addideris, & cum uini ueteris sextario dederis, omne frigus expellit.

Ad tussim & uulsos. Caput .IX.

Tussim quoque insanabilem curat cum hemina passi, & tribus uncijis olei & ouo crudo, si per triduum defundis faucibus, addito fabæ polline, & foenigræco binis cochlearibus. Præterea ualde tussientibus prodest, fabæ frigæ sextarius sine sale coctus, sepi caprini uncia 3. alij purgati capita 3. decocta cum succo ptisanæ, data per triduum. Quo medicamento ualidius creditur: ficus siccae pondera 2. foenigræci sextarium, tracanti uncia, pridie in calida infusa, anagallici uncia, ruta uiridis fasciculus, apij fasciculos tres, pariter in aqua diutissime decoques, & faucibus per triduum defundes. Curare etiã uulsos creditur, si septem uncias cineris mundissimi colligas, addasque olei uncias tres, bulbos tritos vij. anagallici uncia, butyri uncia, sepi caprini uncia, mellis uncias 3. plantaginis uiridis tritæ uncias 3. passi heminam, ptisanam uel lini seminis heminam: quæ ita temperata ut per cornu defluant, per triduum, uel ut necessitas cogit per plures dies, ieiunis singulos sextarios dabis. Desperatam tussim sæpe curauit potio uilis ac facilis: pulueris ex faba uncias sex, pulueris ex foenigræco uncias sex, enulæ tunsæ siccae pulueris uncias 6. pulueris anagallici tussi uncias 3. butyri uncias 6. quæ omnia cum tribus boni uini sextarijs additoque passi sextario uno semis, pariter agutabis, & uni equo ieiuno ante lucem bina cornua per os dabis, donec omnem ebibat potionem. Curam quoque non parum profuisse experimenta docuerunt, hac ratione composita: fabæ frigæ sextarium sine sale decoques, addesque sepi hircini resoluti uncias 3. butyri uncias 3. in mortario deteres uniuersa, Præterea foenigræci sextarium bene purgatum seruere

feruere facies, primamq; aquā inter initia feruores effundes, addesq; aquæ sextarios v. pinguiſſimas caricas xx. & liquiritiæ uncias 4. pariter decoquas donec aqua ad tres sextarios redigatur, in mortario deteris ſoenigræcū, liquiritiam & caricas, miſcesq; cū ſaba, ſupfundis etiam calidā in qua carica cū cæteris coctæ ſunt; cōparatisq; oībus ſi liquor ſpiſſior fuerit, tantū paſſi addis ut per cornu facile poſſit exire. diebus plurimis ex eo per os ſingulos sextarios tuſſientibus dabis.

Ad coſſos, uermes, uel tineas. Ca. x.

Coſſos, uermes, uel tineas, cæteraq; animalia uentris extinguit, ſi hemina cineris ex oliuæ ligno arido collecti, cū hemina olei uiridis tri-
duū dabis ad cornu. Alia quoq; conſectio, ſed quæ ſæpe exiſtera liberat paſſionē: pulueris ſantonici, itemq; abſynthij ponici, necnō lupini crudi, & herbæ centaureæ, & erui pollinis, et ſeminis raphani binas uncias mit-
tis, addisq; cornu ceruini uncia, ſinopidis pontici paſtillos tres, opopanacis ſemiuncia, uini tenetani uel alterius auſteri sextarios 2. olei uiridis sextariū, quæ tepefacta ita aīali deſundis, ut per os cornu accipiat, in cliuo conſtitutū, quatenus ſuccus facilius ad interiora pueniat. Poſtero die idem aīal prorum
conſtituatur in cliuo, & per clyſterē illius tepidæ potionis sextariū ingera-
tur, quatenus alternis diebus ex utraq; parte iniecta potio, coagulare qd ap-
pellatur, poſſit infundere, in quo ille noxiæ beſtiolæ ozuntur, & pertuſo uē-
triculo ex cruciata doloribus aīalia pereunt. Eſt et tertia conſectio nō minus
ualida: Radicis capparis ſiculi, uel baccas cū ſolijs ad unā librā deteris pa-
riterq; cōmiſces, addisq; aceti sextarios 2. Quod medicamentū interdū per
os (ſicut ſuperius dictum eſt) interdum per inteſtinū inijcis animali, ut inter-
nos hoſtes potionis auſteritate conſumas.

Aduerſum omnia genera morborum. Ca. xi.

Aduerſum oīa genera morborū ſalutaris conſectio præparada eſt, ut
inter ipſa initia ex cōditis poſſit occurrī. (Cauſa) enim medicinae que
renda eſt: Myrrhæ librā, thuris maſculi librā, mali punici corij tun-
ſi lib. pipis uncias 3. croci uncias 3. acatiæ ruſæ ſelibrā (cathiniæ) butirois ſe-
librā, reſinæ uſtæ ſelibrā, abſynthij pontici ſelibrā, pulueris ſerpilli ſelibrā,
betonice ſelibrā, centaureæ ſelibram, ſagapini ſelib. ſaxifragæ ſelib. peucedæ
al's (Caffia etc.)
al's (caſmiæ)

R 3 ni ſelib.

ni selib. quæ omnia bene tussa & cribrata in mellis optimi 3. sextarijs misces, et ad carbonem leuiter paululū coquis, post in uase stagnæo uel uitreo condita seruas, ex qua confectiōe morbidis si febrūnt ad diē singula cochlearia maiora cumulatā cum hēmina aquæ tepidæ & olei floris tribus uncijis dabis. Quod si absq; febre sunt morbidī, uel conualescere etiā cœperint, cum uino & oleo plurimis diebus dabis, donec animal liberetur. quā ualidissimā & approbatā noueris potionem.

Confectio suffimentorum salutaris. Cap. XII.

Suffimentorum compositio fascinum pellit, lustrat animal, fugat demones, submouet morbos. Olor nanq; sumi ac spiritus per os ac nares ingreditur, penetrat ad ulcerum omnes recessus, ac curat sæpius loca quæ potiones non potuerunt curare. Etiam in hominibus suffimentorum uapōr præcipue sequitur. Deniq; desperatos & periculosissimos morbos, aut sicut Mulomedici adserunt, non ex pabulo aut aquarum uitio, sed aëris corruptione descendētes. Et ideo facilius languorem quem pestilens morbus ingessit, suffimenti salubris huius curat adflatu. Ac talis compositio suffimentorum: Sulphuris uiui librā, bituminis iudaici librā, opopanax uncia, galbani selibrā, castorei selibrā, (ciceris) crudi selibrā, albitis selibrā, salis armoniaci unc. 3. rasuræ cornu ceruini unc. 3. sinopidis unc. 3. gagatis foetæ unc. 3. lapidis gagatis unc. 3. lapidis ematitidis unc. 1. lapidis sideritis unc. 1. lapidis argeritis unc. 1. caballiones marinos 7. stellas marinas 4. pallas marinas 7. caudas marinas 7. ungues marinos 7. uuae marinæ unc. 3. modulle tede pineæ pōdera 3. cedriæ pond. 3. picis liquidæ pond. 3. ossa sepiæ 7. hæc siccata piter deterrūt atq; miscētur, ex quibus unū cochleare, cū opus fuerit, uiuis carbōibus aspergis, et coopto capite, ut fumū per os naresq; suscipiat aīal suffis. Qd suffimentū præter curam iumentorum, sanat incurrentes hoīm passiones, grandinemq; depellit, demones abigit & laruas.

Compositio pulueris quadrigarij. Ca. XIII.

Quadrigariū puluerē uocāt, q ex diuerso pigmentorū genere mixtus et per se adiuuat aīalia, et alijs potionibus pro modo uel curatiōe miscetur. Huius Chiron talē cōpositionē saluberrimā credit: Tracanti pōdera 3. aloës unc. 6. myrrhæ unc. 6. et 3. costi unc. 1. et 3. armoniaci un. 1. & scrup

7. cassie unc. 1. 7. gentiane lib. 1. aristologie lib. 1. cetaure lib. 1. betonica
 lib. 1. saxifraga lib. 1. samfuci lib. 1. opij lib. 1. abrotani lib. 1. eupatorii unc. 6. carda
 momi unc. 6. folij unc. 3. spica nardi unc. 3. spica celtica unc. 6. asari lib. 1. dauci
 unc. 3. castorij unc. 6. opoponacis unc. 6. galbani unc. 6. strutij unc. 6. panacis
 radice unc. 6. ligritie unc. 6. absynthij fāsces 3. succi herbe peristeri sicca et
 cribrata unc. 5. hæc oīa pariter cōteres, et diligentissime in uase uitreo uel sta
 gneo seruabis. Pelagonius uero quadrigarij pulueris eiusmodi cōposuit cō
 jectiōē: Cinnamomi, spica syriacæ, spica indicæ, croci siculi, myrrha troglo
 ditis, sciēni, pipis nigri, piperis longi, mannæ croci, betonica, catia nigra, tri
 xaginis, folij, nardi lentici. i. cepe indici, nardi, storacis, acori ponti i, thuris
 masculi, irisillyrica, thymi cretici, pipis albi, calami aromatici, c. n. pōnci,
 petroselinū, mannæ croci, mali terreni, gētiāne, rosæ arida, cassia fistula, enu
 la, oīa æquis ponderibus pro modo aīaliū misces, conteris, cribras, in pixide
 uel uitreo dolio cōdis, et cū opus fuerit, singula cochlearia, uel amplius, si ui
 res patiūtur iumentis singulis dabis, addito uino et oleo. Interdū alijs potiōi
 bus misces, si ratio artis uel cura mādauerit. Absirtus quadrigariū pulue
 rem hac ratione cōposuit: Folij, spica nardi, crocus, piper album, piper lon
 gum, piper nigrum, opoponacis radix, cassia nidafantis, cassia marmalitīs,
 cassia nardina, irisillyrica, apij semen, malum terre, peucedanū, sauina, gen
 tiana, herba rosina, thymium, myrrha, trixago, costum, thus masculum, gesse
 mantium, malum punicum, calamum aromaticum, rosæ sicca, ruta agrestis,
 petroselinum, aristologia longa, amomum, calamum syriacum, herba arte
 misia; hæc omnia pro numero animalium præparas æquis ponderibus inter
 misces 7. tun dis, cribrasque, 7. seruabis, aduersus passiones usus.

Compositio Caustici. Cap. XIII.

Caustricum humectata siccatur, laxata constringit, luxata parat, lesa cō
 firmat. Huius Chiron talem compositionem demonstrat: Bitumi
 nis iudaici pondera duo, bituminis apollonij pondera duo, mannæ
 thuris uncias sex, bdellij arabici uncias duas, medullæ cruinæ pondera
 duo, propulei uncias duas, galbani uncias duas, guttæ storacis uncias duas,
 cere communis pondera duo, resinæ cabialis libram unam, uisci italici un
 cias 3, apoxime unc. duas, succi hyssopi unc. 2. guttæ armoniacæ unc. 2. picis
 brutæ

ARTIS VETERINARIAE

brittiæ librā. Pelagōnius causticū, quod suffusiones uescicasq; siccaret in genibus uel articulis, hac ratione cōposuit: Ceræ punice librā, resinæ pondera duo & semis, galbani uncias 3, asphalti iudaici pondera 2. myrrhæ secundariæ pondera 2. bituminis librā, armonici uncias 6. costi uncias 6. Verū cetera de coquis in cacabo fictili nouo, qui cum refrixerit, addis asphaltum et armonia cum et costū pro mēsurā, qua scriptū est, tritum ad modum farinæ, & agita bis, & iterū coques ut sit una substantia, quō uteris aduersum uenas & uesticas & suffusiones, quæ nascūtur in genibus, aut in tibijs, aut inter nodos, aut in articulis, usq; eo ut ossulaginē curare credantur. Malagma quoq; causticum hac uoluit ratione componi: Picis pondera duo, ceræ pondera 2. galbani uncias 3. resinæ librā, adipis taurinæ pondera 2. bdellij uncias 7. thuris polinis uncias 3. resinæ terbentinae uncias sex, uisci pondera 2. glutis uncias 3.

Absirtus huiusmodi causticum hac ratione composuit, glandularis resinæ frixæ uncias 3. picis duræ uncias 3. bituminis iudaici uncias 3. euisci uncias 3. galbani uncias 3. bituminis græci uncias 3. hæc omnia in uino decoquis. Bitumen uero contundis & superimmittis.

Compositio malagmæ. Ca. xv.

Compositio malagmæ ad tumores duros & ueteres: Galbani uncias duas, resinæ librā, armoniaci selibrā, picis britiæ selibrā, ceræ librā, olei quod temperare possit. Item malagma ad tumores duros & ueteres. Galbani libras 2. armoniaci selibrā, resinæ terbentinae selibrā, opopanacis librā, storacis librā, ceræ rusæ librā, bdellij lib. piperis albi unc. 1. baccæ lauri lib. piperis lōgi unc. 1. picis britiæ selib. olei irini quantū sufficit.

Compositio Collyrii fistularis. Ca. xvi.

Collyrium fistulare, quod conficitur ut mittatur in fistulas uulnērum quæ ab initio curata fuerint negligenter. Formatur aut ad mēsuram ipsius fistulæ, ut cū immissum fuerit eadē possit implere, ut celerius iā consumpta duricia, caro uiua ducat solidam cicatricē: Misi librā, seculæ lib. eruginis lib. calcitis librā, cymini uncias sex, teres cū aceto, et collyria facies.

Item aliter componitur collyrium fistulare: Misi, eruginis, calcitis, lib. sin
als (lactis) gulas, mellis unc. sex (Zungitis) pondera 2. coquas ex uino ueteri, pastillosq; inde facies fistulis inserendos.

Compositio

Compositio malagmæ crudæ. Cap. XVII.

Calcis uiuæ libras 2. sinopidis alexandrinilibrā, ficus siccæ uncias 6.
axungie quantum sufficit, immisces, contundis, & uteris.

Compositio syncrismæ. Ca. XVIII.

Ceræ rufæ pondera duo, resinae fricæ pond. 2. olei laurini librā, sepi-
taurini librā, axungie libram, medulle ceruinæ lib. olei cyprini, eru-
ginis, hyssopi, axungie ueteris libras singulas: hæc omnia pariter ad
carbones decoquis & uteris.

Compositio Traumatici. Cap. XIX.

Traumaticum medicamentū curationi uulnerū ualde cōuenit. Nā ab-
sumpta putredine, uiuā carnē ad sanitatē reducit. Huius talis est com-
positio: Misi librā, calcitis pondera 2. eruginis librā, pariter colabis,
& supra tegulam in ignē pones, et coques ut rubeū fiat. Post in mortario te-
res, & ad similitudinē farinæ puluerē facies. Deinde duos sextarios mellis in
olla noua coquis cū uino, & cū feruere coeperit, puluerē superscriptum agi-
tabis, & pariter decoques, refrigeratōq; ad cancrumatas plagas, ad fami-
cem & cicatrices reducendas uteris. Traumaticum quoq; hac ratione com-
ponitur: Misi, cathimie, aloes (acori) libras singulas, eruginis libras 2. calci-
tis librā, mellis lib. 2. in olla noua decoques, refrigeratōq; uteris.

Compositio malagmæ Basilicæ. Ca. XX.

Malagmæ quoq; istiusmodi compositio approbata est: Mellis librā,
galbani, storacis, bdellij, piperis albi singulas libras, armoniaci pon-
dera duo, medullæ ceruinæ, baccarū lauri aſi libram, thuris pollinis
uncias 2. sepi caprini uncias 1.

Compositio alia malagmæ. Cap. XXI.

Malagmæ quoq; medicamentū hac ratione componitur: Armoniaci
uncias tres, ceræ librā, nitri floris unc. 2. resinae terbetinæ pōdera
duo, storacis uncias 3. baccarū lauri unc. 6. olei cyprini unc. 3. olei
laurini uncias 3. medulle ceruinæ unc. 6. olei rosati uncias 3. adipis anserinæ
uncias 6. hyssopi unc. 4. adipis ceruinæ unc. 6. opopanax unc. 6. piperis al-

S bi unc.

bi uncias 2. galbani uncias tres, axungiae ueteris libram, aceti acerrimi heni nam, thuris masculi uncias 4.

Compositio prima anacollimatis. Ca. XXII.

Absirtus compositione anacollimatis eiusmodi composuit et prodidit: Floris nitri sextarium, opopanax uncias tres, croci siculi unc. 2. pipis albi unciam, pollinis thuris unc. 3. cochleas cotusas x. bulbos xx. auellanas xx. quae omnia contusa et permixta, si aceto temperaris, diuulsa coniungis. Efficacius tamen est, si locis dolorosis emissum sanguinem ipsius animalis addideris. Compositio syncrismæ. Storacis uncias 4. armoniaci unc. tres, madyllæ ceruinæ unc. 2. olei glaucini unc. 6. olei cyprini unc. 3. seu itaurini unc. 3. resinæ terbentine uncias 4. adipis ursinæ uncias 3. adipis leoninæ uncias 4. propulei unc. 3. olei ueteris uncias 6. axungiae ueteris librā, olei saurensis lib. opopanax, galbani unc. 3. hæc ad carbones lentis uaporibus decoquantur, et unctionem saluberrimam præstant.

Compositio malagmæ crudæ. Ca. XXIII.

Compositio malagmæ crudæ talis est: ceræ punicæ selibrā, armoniaci selibrā, bdellij unc. 3. storacis uncias 2. sagapini unc. 4. thuris pollinis unc. 6. olei ueteris unc. 4. propulei uncias 2. medullæ ceruinæ unc. 6. sepi taurini unc. 2. resinæ frixæ unc. 2. adipis ursinæ unc. 2. adipis leonis uncias 2. opopanax, baccarū lauri añ unc. 2. olei cyprini unc. 4. gentianæ unc. tres, resinæ colophonie unc. 6. galbani uncias 6. Itē alia compositio malagmæ: Ceræ, armoniaci añ lib. storacis unc. 6. sagapini unc. 3. thuris pollinis uncias 3. medullæ ceruinæ unc. 4. opij hispani unc. 2. propulei uncias 4. sepi caprini uncias 6. galbani uncias 6. picis britiæ unc. 4. resinæ terbentine unc. 3. resinæ frixæ uncias 4. aceti acerrimi un. 4. olei lentiscini unc. 6. olei irini un. 4.

Compositio malagmæ ad uligines. Ca. XXIII.

Compositio malagmæ ad uligines. Salis asri lib. 1. bulbi libram, sulphuris libram 1. mīsi libras 2. olei lib. his coctis diligenter, uteris.

Compositio malagmæ ad neruos. Ca. XXV.

Sulphuris uiui, aluminis, resinæ, picis britiæ añ lib. 1. ceræ pond. 2. medullæ ceruinæ lib. 1. hæc omnia pariter diu agitas aut uerberas.

Compositio Traumatici. Cap. XXVI.

Compositio traumatici. Galle unc. 4. æris usi unc. 3. corticis mali punici unc. 3. misî unc. 4. uini unc. 1. aceti unc. 3. in olla noua excoquis et

Compositio Collyriorum. Ca. XXVII. (uteris.

Ompositiones collyriorū Absirti, Pelagonij, Chironisq; subieciimus.

Ad album enim de oculis tollendū & abstergeḃdum Absirtus tradidit: nuces auellanas combustas donec redigantur in cineres, in mortario deteres, addesq; mannæ thuris idē pondus, quæ diutissime trita, & melle optimo adiecto cōprehendātur, & sic inungatur aīal. Idem Absirtus eiusmodi collyriū laudat. Piperis albi grana 8. mellis attici unc. 2. croci unc. 3. sepiæ marinæ (diligenter statissim) & rutæ unc. 2. balsami unc. 1. Pelagonius tale collyrium monstrat (propter). Oleū, sal, resinam, cerusam, opobalsamū, addito melle deteris atq; cōponis, alternis diebus inducis usq; ad sanitatē. Nardinū quoq; collyriū hac ratione composuit. Violæ unc. 1. spicæ nardi uncia semis, cassiæ, myrrhæ unc. 3. croci unc. 3. olei cyprini unc. 6. pipis albi unc. 2. cymini unc. 3. Item alia collyria cōposuit. opobalsami, croci, myrrhæ, salis hispani, lepidis, ossis sepiæ singulas uncias, cathimix unc. 2. afronitri unc. 1. mellis attici librā. Chiron etiā uetera glaucomata hac collyrij indicat confectione purgari. Cornu bubulini extremū ubi solidū est cōbures, ac thuris masculi puluerē, stercoris quoq; humani cōbusti & salis armoniaci pari mēsurā puluerem facies, piper longū, ossa sepiæ, flos eruḡnis, uetus uinū, crocus, ruta, pariter detrita cōmiscet, addito optimo melle qđ sufficit, & inungis. Aliud quoq; collyriū simile cōposuit. Ossa sepiæ marinæ, crocus, myrrha, trogloditis; item sal ac stercus crocodili, hæc oīa pariter ac diutissime deteruntur, & bene trita cernuntur, additoq; optimo melle unctionis utilitatē aīalibus præstat. Licet parua & propē nulla de his, quæ diuersi authores retulerūt (præterissent) doceamus, tamen quæcūq; uidebantur probata conscripsimus. Verum ne longior liber confusionem magis legentibus, quā instructionē uideretur afferre, modū plenum credimus faciendum. Aliud iterum uerūq; commonentes, ut diligenti cura passionum occurratur exordijs. Nā etiam incurabiles egritudines, si presentes fuerint ui, medentis arte uincuntur. In ueteratas causas etiam faciles, curari sæpe nō posse legi.

Alia quaedam medicamentorum genera.

Cephalicum, quod facit ad omnia uulnera difficilia claudenda et sup-
plenda: Herbae panacis radices, thus masculum, myrrham, pollinē crui, ro-
se folia arida bene trita et cribrata. hic pulvis cōfectus difficilia uulnera clau-
dit ac curat. Nunc etiā si melle decocto, & huic medicamēto mixto collyriū
facias, et altis sub uulneribus fistulae subijcias, citius supplere et sanare cogit.

Medicamentum consuetum, in usu quotidiano necessarium,
propter compendium & moras ita facies: Eruginem, chalcitem, aris florē,
as ustū; haec bene trita et cribrata aequo pondere catastaticum faciūt, quod
carnē supererescens comedendo effouet. Hoc idem cum aceto & melle de-
coctum ad mellis crassitudinem, facies medicamentū, quod facit ad omnia uul-
nera & canēros elympidanda, & ossa scabrosa.

Chlora medicamentum, quod facit ad omnia uulnera complete
lympidanda, uel sine difficultate claudenda: cerā punicā, resinam terbentinā
medullam ceruicā, eruginem, oleum, ita conficies quantum sufficit.

Tetrapharmacum, quod facit ad omnia uulnera elympidanda, &
uelocius curanda († ualde per hoc medicamentum cataloticum) Adipē tau-
rinā, cerā, picem, oleū. Igitur medicamentū, quod supra dixi cataloticū est.

Glicium, quod facit ad omnia uulnera sordida et canerosa: Amurcā,
salem, acetum: his mixtis quantum uolueris ad crassitudinē mellis uteris.

Ossoclare medicamentum, qđ facit ad oīa ossicula, et († darscus
quo loco factum si deiiciendum uolueris) Picem liquidam, axungiam ueterē,
eruginem bene tritam & admixtam, colas bene coctum, post decoctionē su-
pra scripta purgat uulnera diligenter.

Stypticum, quod facit ad omnia uulnera humecta, et fongos exiccan-
dos: Alumen scissum, gallas minores, cortices mali granati, subcorticem de
ipsa arbore. haec oīa trita, pulvis ipsius uulneribus exiccādis ualde prodest.

Medicamentum quod facit ad omnia uulnera claudenda: Absyn-
thium, sinopidem, lepidam haec tria bene commixta faciunt medicamentum
siccum, quod ad omnia uulnera prodest.

Implectoricum medicamētum, quod facit ad omnia caua sup-
plenda: Pollinem thuris, pollinem herbi, lepidam. haec bene trita medicamen-
tum

tum faciunt ad supplenda uel elympidanda uulnera.

Ad oculorum rupturas & tuniculas seruandas prodest, si sel caprinum lacti caprino miscetur, & sic penna nigra oculi inungantur. Ad oculorum album siue glaucomata sic facies: uini sextarios 4. gariofloris sextarium unum, mellis uncias 4. pariter decoquis et uteris. Ad (uecentē) oculi larem percussum: Croci, myrrhæ, thuris masculi, gummi, medullæ ueruecinæ, anagallici succi, mellis, cardami, binas uncias.

Syncrisma: Cereus pondera 2. axungie pondera 4. opopanax uncias 2. olei ueteris pond. 2. galbani unc. 3. myrrhæ pond. 4. armoniæ pō. 3. olei cyprini pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 2. hyssopi pond. 2. storacis pōd. 4. olei lentiscini pondera 4.

Syncrisma ad alia genera: Galbani pond. 2. opopanax pond. 1. cereus pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 3. thuris masculi pond. 2. piperis albi pondus 1. resinæ terbenitinæ pond. 3. storacis pond. 1. adipis anserinæ pond. semis, euforbiæ uncias 6. adipis leoninæ, mellis, castorei, libras singulas, olei myrrhæ lib. 2. olei lentiscini pond. 2. olei syriaci lib. 2. olei ueteris lib. 2. olei mellini pondera 2. olei storacis pond. 2. opij pond. 3.

Lipparia sic facies: Spumæ argenti pondus 1. cerusæ uncias 2. uini sextarios 3. olei pondus 1. & semis, omnia conficies, & sic uteris.

Lipparia alio genere sic facies: Spumam argenti, cerusam, thus masculum, acetum album, oleum, hæc omnia in unum conteres, & cum uino mellinocrato admisces, & sic uteris.

Traumaticum sic facies: Chalcitidis pond. 1. misfi pond. 1. semis, erugenis uncia 1. stercoris columbini pond. 1. adarcis uncias 3. & scrupulos 3. decoquis una, et sic uteris. Item alio genere ad flegmonas tollendas: Sinapis alexandrinæ unc. 6. fici asæ unc. 3. axungie ueteris uncias 6. aceti scrup. 3.

Item Traumaticum alio genere ad uerrucas tollendas: Floris chalcitis uncias 2. nutri uncias 2. lasari uncias 3. aceti hemina. Item alio genere ad suffraginosos: Eruginis, aluminis aſi pond. 5. herbæ syderitis, ferrariæ pond. 1. aceti acris sextarium unum.

Ad flegmonas discutiendas: Radicis, erui, axungie, aceti acris, linis linteo, & sic uteris.

Causticum ad neruos crassos, uel quæcūq; in notitia sunt: Galbani,

ARTIS VETERINARIAE

opopanacis, medulle ceruinæ, resinæ terbetinæ, armoniaci, propulei, uiolæ, thuris pollinis, binā pondera, resinæ fricæ pondera 5. bituminis pond. 3. picis duræ pond. 5. resinæ pituinæ pond. 5. cere pond. 5. olei cerini pōd. 3. in comij pond. 2. storacis pond. 2. uisci pond. 2.

Causticum ad neruorū dolores: Galbani, storacis, uiolæ, propulei, resinæ singula pond. colophonie uncias sex, resinæ terbetinæ pond. 6. opopanacis pond. 1. thuris pollinis, hyssopi, armoniaci, bacce lauri singula pond. picis britiæ pond. 1. et semis, uini (inei) pond. 1. semis, resinæ bituminis pond. 1. hæc omnia in uno cacabo coques, in linteolo induces calida.

Malagmam cocticam sic facies: Cere albæ, galbani uncias singulas, resinæ terbetinæ pond. 2. adipis taurinæ pond. 3. hyssopi pond. 2. bdellij pondus 1. semis, irisillyricæ pond. 2. adipis anserinæ pond. 1. hæc omnia decoquis & uteris.

Malagma ad neruorum dolorem, Cere unc. 6. adipis ceruinæ unc. 3. galbani, piperis, armoniaci, resinæ terbetinæ uncias ternas, tracæti uncias 5. singula contundis, permisces, & uteris.

Malagma ad neruos uexatos, Mentæ, galbani, rubricæ, storacis, uiolæ aſi pond. 6. similaginis pond. 4. hæc omnia cum similagine & uino decoques in cacabo, & liquida facies, deinde similaginem & uinū in unū permiscebis, inlinis in linteolo, & alligabis feruentia.

Malagma ad tumores sic facies: Cere uncias 6. adipis ceruinæ uncias 3. galbani uncias 3. uiolæ, piperis albi uncias ternas, armoniaci unciam, resinæ terbetinæ unc. 3. storacis unc. 3. gentianæ unc. 1. singula contundis, postea permisces in uino, & sic uteris.

Emplastrum, Cere uiridis pond. 1. et semis, olei cyprini unc. 9. olei myrthini uncias 2. adipis anserinæ uncias 2. thuris pollinis unc. 2. hæc oīa in cacabum mittis, coquis, & linteolis inlinis.

Cerotum ad ulcera, (strumenta) pond. 2. cere rusæ pond. x. olei myrthini pond. 6. olei ueteris pōdera 8. aluminis pond. 9. olei cyprini pond. decem, calcis pond. quinq.

Fomentum ad tumores siue ad duriciam quālibet sic facies: eniscum ex uino decoctum conteris cū axungia, & sic uteris. Si minus, herbāsa uinam cōteris, et ex rosatio concoquis, & sic uteris ad sanitatem.

Compositio

Compositio ad colices, Asari pontici, petroselini, feniculi uncias singulas, piperis nigri uncias 2. marrubij mas. unc. 1. abrotani uncia semis, mellis optimi pond. 2. coques & despumabis, & hæc omnia contundes et cer nes, & sic in melle commiscebis, inde figuram facies nucis auellane, & ex aqua dabis, et aque congruū 1. in potū. Item diebus quibus eo morbo tenetur, feniculi seminis cum uino cochlearia tria aut quatuor fricabis in mortario, adij cies uini cibarij sextariū 1. mittes in ampullam aut cornu, & dabis ut bibat, & cum sagis bene munies.

Malagma ad neruos claudos, Sepi hircini libram, mollicidene selibram, resinae libram, eruginis selibram.

Compositio ad genua. Aceti hircini, salis pusillum, eris usti seli bram, sinopidis quod satis est.

Potio hyemalis. Croci, cor ris masculi, tracanti, cymini a gulas, uini & olei quod sufficit. omnia pe ptisanæ, cui immittis palmas xxv. abos xxv. hyss pes catulum breuem uiuum mittis quem cum madefac exiccabis, & adijcies olei quod sufficit, tūc illa oia per

Potio æstiuæ. Traganti, croci, abrotani, catroselini macedonici binas uncias, gingiberis unc. 1. hæc dare cœperis, mittis quotidie heminas singulas singul ri sectui, porcel sil gallici, thus, apiū, olei afri hemin sufficit & uteris. Sed hæc uide lib. 1. cap. 17.

F I N I S.

XXVIIA

BASILEAE. ANNO. M. D.

TABER

EXCVDEBAT IOANNES

EMMEVS IULIACENSIS